

Information für Patientinnen und Patienten

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, denn sie enthält wichtige Informationen.

Dieses Arzneimittel haben Sie entweder persönlich von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin verschrieben erhalten oder Sie haben es ohne ärztliche Verschreibung in der Apotheke oder Drogerie bezogen. Wenden Sie das Arzneimittel gemäss Packungsbeilage beziehungsweise nach Anweisung des Arztes, Apothekers oder Drogisten bzw. der Ärztin, der Apothekerin oder der Drogistin an, um den grössten Nutzen zu haben. Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

Oralpädon® Erdbeere

Spirig HealthCare AG

Was ist Oralpädon Erdbeere und wann wird es angewendet?

Oralpädon Erdbeere ist ein Traubenzucker-Mineralsalz-Gemisch, das den Salz- und Wasserverlust bei Durchfallerkrankungen ausgleicht.

Oralpädon Erdbeere dient als erste Massnahme zur Behandlung von Durchfallerkrankungen im Säuglings- und Kindesalter, eine der häufigsten Erkrankungen in diesem Alter, sowie bei Reisedurchfall.

Was sollte dazu beachtet werden?

Die Schwere der Durchfallerkrankung ist ausschlaggebend, ob dem Kind in der ersten Zeit neben Oralpädon Erdbeere auch feste Nahrung, möglichst Heilnahrung, gegeben werden kann.

Wann darf Oralpädon Erdbeere nicht angewendet werden?

Bei Nierenfunktionsstörungen, Harnverhalten, Störungen der Zuckeraufnahme, anhaltendem Erbrechen, schweren Bewusstseinsstörungen, Schock.

Wann ist bei der Einnahme von Oralpädon Erdbeere Vorsicht geboten?

Für die Anwendung bei Kindern unter 3 Jahren ist ein Arzt oder eine Ärztin zu konsultieren.

Bitte nehmen Sie Oralpädon Erdbeere erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt bzw. Ihrer Ärztin ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

Wenn der Durchfall von Fieber begleitet ist und wenn Blut im Stuhl festgestellt wird, ist ein Arzt oder eine Ärztin zu konsultieren.

Auch in den folgenden Fällen sollte Oralpädon Erdbeere nur nach Rücksprache mit einem Arzt oder einer Ärztin angewendet werden:

- Bei wiederkehrendem oder anhaltendem Durchfall
- Wenn Sie an einer Erkrankung der Leber oder der Niere leiden
- Wenn Sie eine kalium- oder natriumarme Diät befolgen
- Wenn Ihr Blut einen niedrigen Kalium- oder Natriumspiegel aufweist

Oralpädon Erdbeere darf nur mit der angegebenen Menge Wasser zubereitet werden. Wenn mehr Wasser als empfohlen verwendet wird, liegen die Salze nicht in einer optimalen Konzentration vor und wenn weniger Wasser als empfohlen verwendet wird, kann dies zu einem Anstieg des Ungleichgewichts der Mineralsalze im Blut führen.

Wenn die Durchfallerkrankung länger als 24 bis 36 Stunden andauert, sollten Sie einen Arzt oder eine Ärztin aufsuchen.

Falls die Durchfallerkrankung mit Übelkeit oder Erbrechen verbunden ist, sollten Sie zu Beginn kleine aber häufige Schlucke einnehmen.

Dieses Arzneimittel enthält 156.9 mg Kalium pro 1 Beutel. Wenn Sie an eingeschränkter Nierenfunktion leiden oder eine kontrollierte Kalium-Diät (Diät mit niedrigem Kaliumgehalt) einhalten müssen, sollten Sie dies berücksichtigen.



Dieses Arzneimittel enthält 278 mg Natrium (Hauptbestandteil von Kochsalz/Speisesalz) pro 1 Beutel. Dies entspricht 16 % der für eine oder einen Erwachsenen empfohlenen maximalen täglichen Natriumaufnahme mit der Nahrung.

Dieses Arzneimittel enthält 60 mg Aspartam pro Beutel entsprechend 30 mg / 100 ml gebrauchsfertige Lösung. Aspartam ist eine Quelle für Phenylalanin. Es kann schädlich sein, wenn Sie oder Ihr Kind eine Phenylketonurie (PKU) haben, eine seltene angeborene Erkrankung, bei der sich Phenylalanine anreichert, weil der Körper es nicht ausreichend abbauen kann.

Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie

- an anderen Krankheiten leiden,
- Allergien haben oder
- andere Arzneimittel (auch selbstgekaufte!) einnehmen.

Darf Oralpädon Erdbeere während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit eingenommen werden?

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen ist bei bestimmungsgemässer Anwendung kein Risiko für das Kind bekannt. Oralpädon Erdbeere kann während der Schwangerschaft oder in der Stillzeit unter ärztlicher Überwachung eingenommen werden.

Wie verwenden Sie Oralpädon Erdbeere?

Ein Beutel in 200 ml Trinkwasser oder in abgekochtem, abgekühltem Wasser oder ungesüsstem Tee lösen. Die Lösung soll nur unmittelbar vor Gebrauch hergestellt werden. Nicht verbrauchte Lösung nach 1 Stunde nicht mehr verwenden.

Im Kühlschrank ist sie maximal 24 Stunden haltbar. Die fertig zubereitete Lösung nicht kochen.

Bei Erbrechen sollte Oralpädon Erdbeere dem Kind löffelweise gegeben werden. Der Schweregrad der Durchfallerkrankung ist ausschlaggebend, ob zusätzlich zu Oralpädon Erdbeere für die kindliche Ernährung Karottengemüse, Banane, geriebener Apfel, Zwieback und Reisschleim eingesetzt werden können. Ungeeignet ist während einer Durchfallerkrankung die Aufnahme von Milch und jeglichen Fetten, wie z.B. Ei oder Speiseeis.

Soweit nicht anders vom Arzt bzw. von der Ärztin verordnet, wird Oralpädon Erdbeere folgendermassen dosiert:

Säuglinge und Kinder erhalten bei leichten Durchfallerkrankungen 50 ml fertige Lösung pro kg Körpergewicht bzw. bei schwereren Durchfallerkrankungen 100 ml fertige Lösung pro kg Körpergewicht innerhalb der ersten 6 Stunden.

Sollten danach noch Symptome auftreten, kann die Behandlung weitere 4 bis maximal 6 Stunden fortgesetzt werden. Der Richtwert für Erwachsene beträgt 20–40 ml pro kg Körpergewicht.

In der Regel dauert die Oralpädon Erdbeere-Behandlung 6–12 Stunden, maximal 24 Stunden.

Wenn Sie zu grosse Mengen an Oralpädon Erdbeere eingenommen haben, nehmen Sie mit Ihrem Arzt bzw. Ihrer Ärztin Kontakt auf.

Hat sich dann der erwünschte Erfolg nicht eingestellt, muss unverzüglich ein Arzt bzw. eine Ärztin aufgesucht werden. Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt oder von der Ärztin verschriebene Dosierung. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. mit Ihrer Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Welche Nebenwirkungen kann Oralpädon Erdbeere haben?

Folgende Nebenwirkungen können bei der Einnahme von Oralpädon Erdbeere auftreten:

In Einzelfällen kann es zu einer Veränderung der Kochsalzmenge im Körper kommen. Es ist deshalb auf eine ausreichende Zufuhr von Wasser und salzarmen Lösungen zu achten.



Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die hier nicht beschrieben sind, sollten Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin informieren.

Was ist ferner zu beachten?

Nicht über 25 °C lagern, in der Originalverpackung und ausser Reichweite von Kindern aufbewahren. Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit «EXP» bezeichneten Datum verwendet werden. Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker oder Drogist bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin. Diese Personen verfügen über die ausführliche Fachinformation.

Was ist in Oralpädon Erdbeere enthalten?

Wirkstoffe

1 Beutel à 5,129 g Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen enthält: Glucose-Monohydrat 3,56 g (entspricht wasserfreier Glucose 3,24 g), Natriumchlorid 0,47 g (entspricht 0.278 g Natrium), Kaliumchlorid 0,30 g (entspricht 0.157 g Kalium), Dinatriumhydrogencitrat-Sesquihydrat 0,53 g (entspricht Dinatriumhydrogencitrat 0,58 g).

Gesamtosmolarität der gebrauchsfertigen Lösung: 240 mosm/l.

Elektrolytgehalt der fertigen Lösung

- Na^+ 60 mmol/l;
- K^+ 20 mmol/l;
- Cl^- 60 mmol/l;
- Citrat³⁻ 10 mmol/l;
- Glucose 90 mmol/l.

Hilfsstoffe

Rote Bete-Saftkonzentrat, Erdbeearoma, Aspartam (E 951), Apfelsäure, hochdisperses Siliciumdioxid.

Zulassungsnummer

53205 (Swissmedic).

Wo erhalten Sie Oralpädon Erdbeere? Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken und Drogerien, ohne ärztliche Verschreibung.

Packungen zu 10 Beutel.

ZulassungsinhaberIn

Spirig HealthCare AG, 4622 Egerkingen.

Diese Packungsbeilage wurde im Oktober 2024 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

