

Information für Patientinnen und Patienten

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, denn sie enthält wichtige Informationen.

Dieses Arzneimittel haben Sie entweder persönlich von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin verschrieben erhalten oder Sie haben es ohne ärztliche Verschreibung in der Apotheke oder Drogerie bezogen. Wenden Sie das Arzneimittel gemäss Packungsbeilage beziehungsweise nach Anweisung des Arztes, Apothekers oder Drogisten bzw. der Ärztin, der Apothekerin oder der Drogistin an, um den grössten Nutzen zu haben. Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

SIMILASAN Periodenbeschwerden, Globuli

Homöopathisches Arzneimittel

Wann wird *SIMILASAN Periodenbeschwerden* angewendet?

Gemäss homöopathischem Arzneimittelbild kann *SIMILASAN Periodenbeschwerden* bei Periodenstörungen mit Krämpfen; Rhythmisch wiederkehrenden Unterleibsschmerzen kurz vor oder zur Zeit der Menstruation; Ziehenden Schmerzen im Unterbauch mit Ausstrahlung zum Rücken zur Zeit der Menstruation; Krampfartigen, herunterziehenden Schmerzen vom Unterleib zu den Oberschenkeln vor und während der Periodenblutung angewendet werden.

Die Anwendung dieses Arzneimittels im genannten Anwendungsgebiet beruht ausschliesslich auf den Prinzipien einer homöopathischen Therapierichtung.

Was sollte dazu beachtet werden?

Wenn Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin andere Arzneimittel verschrieben hat, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin ob *SIMILASAN Periodenbeschwerden* gleichzeitig eingenommen werden darf.

Wann darf *SIMILASAN Periodenbeschwerden* nicht oder nur mit Vorsicht eingenommen werden?

Similasan Periodenbeschwerden darf bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie

- an anderen Krankheiten leiden,
- Allergien haben oder
- andere Arzneimittel (auch selbst gekaufte!) einnehmen!

Darf *SIMILASAN Periodenbeschwerden* während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit eingenommen werden?

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen ist bei bestimmungsgemässer Anwendung kein Risiko für das Kind bekannt. Systematische wissenschaftliche Untersuchungen wurden aber nie durchgeführt. Vorsichtshalber sollten Sie während der Schwangerschaft und Stillzeit möglichst auf Arzneimittel verzichten oder den Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. die Ärztin, Apothekerin oder Drogistin um Rat fragen.

Wie verwenden Sie *SIMILASAN Periodenbeschwerden*?



Falls vom Arzt oder der Ärztin nicht anders verschrieben:

Jugendliche (ab 12 Jahren) und Erwachsene: 7 Globuli (Kügelchen)

Es ist empfehlenswert, bei den ersten Anzeichen von Menstruationsbeschwerden mit der Einnahme des Präparates zu beginnen.

- **Akute Beschwerden:** Halbstündlich oder stündlich.
- **Zu Beginn der Periodenbeschwerden und nach Abklingen der akuten Beschwerden:** 3 - 6 mal täglich (regelmässig auf den Tag verteilt).

Similasan Periodenbeschwerden darf bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden

Einnahmehinweise:

- Globuli (Kügelchen) im Mund zergehen lassen.
- Dürfen auch auf nüchternen Magen eingenommen werden.

Die Wirkungsdauer einer Arzneimittelgabe kann individuell verschieden sein. Grundsätzlich wird die Einnahme des Präparates bei Nachlassen der Wirkung oder bei Rückkehr der Beschwerden wiederholt.

Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt oder von der Ärztin verschriebene Dosierung. Wenn bei der Behandlung eines Jugendlichen die gewünschte Besserung nicht eintritt, ist mit ihm ein Arzt bzw. eine Ärztin aufzusuchen.

Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. mit Ihrer Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Welche Nebenwirkungen kann *SIMILASAN Periodenbeschwerden* haben?

Bei Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). Bei andauernder Verschlechterung setzen Sie *SIMILASAN Periodenbeschwerden* ab und informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Für *SIMILASAN Periodenbeschwerden* sind bisher bei bestimmungsgemäsem Gebrauch keine Nebenwirkungen beobachtet worden. Wenn Sie dennoch Nebenwirkungen beobachten, informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Was ist ferner zu beachten?

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit „EXP“ bezeichneten Datum verwendet werden.

Lagerungshinweis

Bei Raumtemperatur (15-25°C) lagern.

Ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.

Weitere Hinweise

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker oder Drogist bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.



Was ist in *SIMILASAN Periodenbeschwerden* enthalten?

In 1 g Globuli sind verarbeitet:

Wirkstoffe

Atropa bella-donna (HAB) D6 (Ph.Eur. Hom. 1.1.3) 3.333mg

Potentilla anserina (HAB) D6 3.333mg

Viburnum opulus (HAB) D6 3.333mg

Hilfsstoffe

Calciumcarbonat, Xylit (E 967) 600 mg

1 g entsprechen 70 - 90 Globuli.

Zulassungsnummer

53244 (Swissmedic)

Wo erhalten Sie *SIMILASAN Periodenbeschwerden*? Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken und Drogerien, ohne ärztliche Verschreibung.

Packungsgrössen: 15 g

Zulassungsinhaberin

Similasan AG, CH-8916 Jönen

Diese Packungsbeilage wurde im März 2022 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

