

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

SIMILASAN Règles douloureuses, globules

Médicament homéopathique

Quand *SIMILASAN Règles douloureuses* est-il utilisé ?

Selon la conception homéopathique, *SIMILASAN règles douloureuses* peut être utilisé en cas de Règles perturbées accompagnées de crampes; Douleurs de l'abdomen revenant de façon cyclique peu avant ou pendant la menstruation; Elancements aigus dans le bas-ventre avec irradiations douloureuses dans le dos pendant la menstruation; Douleurs spasmodiques et lancinantes allant de l'abdomen aux cuisses avant ou pendant le flux de sang.

L'utilisation de ce médicament dans le champ d'applications indiqué est basée exclusivement sur les principes de l'homéopathie.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement ?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si *SIMILASAN règles douloureuses* peut être pris simultanément.

Quand *SIMILASAN Règles douloureuses* ne doit-il pas être pris ou seulement avec précaution ?

SIMILASAN règles douloureuses ne doit pas être utilisé chez l'enfant de moins de 12 ans.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments (même en automédication !).

***SIMILASAN Règles douloureuses* peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement ?**

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si ce médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre droguiste.

Comment utiliser *SIMILASAN Règles douloureuses* ?

Sauf prescription contraire du médecin:

Adolescents (à partir de 12 ans) et adultes: 7 globules

Il est recommandé de prendre la préparation dès les premiers signes de menstruations douloureuses.

- Troubles aigus: Toutes les heures ou les demi-heures.
- Au début des règles difficiles et après l'arrêt des douleurs aiguës: 3 à 6 fois par jour (réparties régulièrement dans la journée).



Ne pas utiliser *SIMILASAN règles douloureuses* chez les enfants de moins de 12 ans

Mode d'emploi:

- Laisser fondre les globules dans la bouche.
- Les globules peuvent être pris même si vous êtes à jeun.

Le temps d'action d'un médicament peut varier d'une personne à l'autre. C'est pourquoi il est conseillé d'administrer une nouvelle prise lorsque l'effet de la préparation diminue ou les troubles reviennent.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. En l'absence de l'amélioration escomptée lors d'un traitement d'un adolescent, veuillez consulter un médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires *SIMILASAN Règles douloureuses* peut-il provoquer ?

La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec *SIMILASAN règles douloureuses* et informez-en votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

Aucun effet secondaire de *SIMILASAN règles douloureuses* n'a été constaté à ce jour en cas d'usage conforme à celui auquel le médicament est destiné.

Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

À quoi faut-il encore faire attention ?

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention <EXP> sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15-25°C).

Conserver hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

Que contient *SIMILASAN Règles douloureuses* ?

1 g de globules contient:

Principes actifs

Atropa bella-donna (HAB) D6 (Ph.Eur. Hom. 1.1.3) 3.333mg

Potentilla anserina (HAB) D6 3.333mg

Viburnum opulus (HAB) D6 3.333mg

Excipients

carbonate de calcium, xylite (E 967) 600 mg

1 g correspond à 70-90 globules.



Numéro d'autorisation

53244 (Swissmedic)

Où obtenez-vous *SIMILASAN troubles du sommeil*? Quels sont les emballages à disposition sur le marché ?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Conditionnement: 15 g

Titulaire de l'autorisation

Similasan AG, CH-8916 Jonen

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en mars 2022 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

