

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia (o in drogheria*). Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico o del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

SIMILASAN Disturbi mestruali, globuli

Medicamento omeopatico

Quando si usa *SIMILASAN Disturbi mestruali* ?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici *SIMILASAN Disturbi mestruali* può essere usato in caso di Disturbi mestruali con crampi; Dolori addominali che si manifestano a ritmo regolare poco prima e durante le mestruazioni; Lancinanti dolori addominali che durante le mestruazioni s'irridano fino alla schiena; Crampi e dolori lancinanti che prima e durante le mestruazioni si irridano dall'addome fino alle cosce.

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa esclusivamente sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere *SIMILASAN Disturbi mestruali*.

Quando non si può assumere *SIMILASAN Disturbi mestruali* e quando la sua somministrazione/il suo uso richiede prudenza?

SIMILASAN Disturbi mestruali non deve essere usato nei bambini di età inferiore a 12 anni.

Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa)

Si può assumere *SIMILASAN Disturbi mestruali* durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico o farmacista o droghiere.

Come usare *SIMILASAN Disturbi mestruali*?

Salvo diversa prescrizione medica, attenersi alla seguente posologia:

Adolescenti (dai 12 anni) e adulti: 7 globuli

Si consiglia la somministrazione del preparato non appena si manifestano i primi disturbi mestruali.

- Disturbi acuti: Ogni mezz'ora o ogni ora.
- Non appena compaiono i primi disturbi e una volta superata la fase più acuta:
3 - 6 volte al giorno (a regolare distanza durante della giornata).

Non adatto a bambini di età inferiore a 12 anni.

Avvertenze per l'assunzione:



- Far sciogliere in bocca i globuli.
- L'assunzione può avvenire anche a stomaco vuoto.

La durata dell'effetto varia a seconda del soggetto. In generale si consiglia di ripetere la somministrazione del preparato in caso di riduzione dell'effetto o di ripresa dei sintomi.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se il trattamento di un adolescente, non produce il miglioramento auspicato, consulti un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere *SIMILASAN Disturbi mestruali*?

Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con *SIMILASAN Disturbi mestruali* e informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto di *SIMILASAN Disturbi mestruali*. Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.*

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene *SIMILASAN Disturbi mestruali*?

1 g di globuli contiene:

Principi attivi

Atropa bella-donna (HAB) D6 (Ph.Eur. Hom. 1.1.3) 3.333mg

Potentilla anserina (HAB) D6 3.333mg

Viburnum opulus (HAB) D6 3.333mg

Sostanze ausiliarie

TESTO

carbonato di calcio, xilitolo (E967) 600 mg

1 g corrisponde a 70-90 globuli.

Numero dell'omologazione

53244 (Swissmedic)

Dove è ottenibile *SIMILASAN Disturbi mestruali*? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.



Confezione: 15 g

Titolare dell'omologazione

Similasan AG, CH-8916 Jonen

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel marzo 2022 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

La data «Stato dell'informazione» viene inserita da Swissmedic (per i dettagli cfr. l'all. 1).

(Facoltativo)

Cronistoria delle revisioni

Questa cronistoria delle revisioni serve a fornire una migliore visione d'insieme delle diverse versioni dell'informazione destinata ai pazienti. L'uso della tabella è facoltativo. La presentazione della tabella può essere adattata dal titolare dell'omologazione. Questa tabella non viene pubblicata.

ID domanda	Tappa fondamentale	Data di creazione	Modifica	Iniziali
TESTO	TESTO	DATA	TESTO	TESTO
TESTO	TESTO	DATA	TESTO	TESTO
TESTO	TESTO	DATA	TESTO	TESTO
TESTO	TESTO	DATA	TESTO	TESTO
TESTO	TESTO	DATA	TESTO	TESTO
TESTO	TESTO	DATA	TESTO	TESTO
TESTO	TESTO	DATA	TESTO	TESTO
TESTO	TESTO	DATA	TESTO	TESTO
TESTO	TESTO	DATA	TESTO	TESTO

