

Information für Patientinnen und Patienten

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, denn sie enthält wichtige Informationen.

Dieses Arzneimittel haben Sie entweder persönlich von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin verschrieben erhalten oder Sie haben es ohne ärztliche Verschreibung in der Apotheke oder Drogerie bezogen. Wenden Sie das Arzneimittel gemäss Packungsbeilage beziehungsweise nach Anweisung des Arztes, Apothekers oder Drogisten bzw. der Ärztin, der Apothekerin oder der Drogistin an, um den grössten Nutzen zu haben. Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

Pruri-med Lipolotion® Pruri-med Lipolotion sensitive®

Permamed AG

Was ist Pruri-med Lipolotion / Pruri-med Lipolotion sensitive und wann wird es angewendet?

Pruri-med Lipolotion / Pruri-med Lipolotion sensitive ist eine Emulsion zur Anwendung auf der Haut mit den Wirkstoffen Harnstoff (Urea) und Polidocanol 600 sowie mit hohem Fettgehalt (40 %) zur Behandlung von trockener und juckender Haut.

Pruri-med Lipolotion sensitive und Pruri-med Lipolotion unterscheiden sich darin, dass Pruri-med Lipolotion ein Parfüm enthält.

Harnstoff unterstützt die Feuchtigkeitsregulierung der Haut. Der Wirkstoff Polidocanol 600 wirkt juckreizstillend.

Pruri-med Lipolotion / Pruri-med Lipolotion sensitive konnte bei Patienten mit trockener, juckender Haut oder mit Ekzemen (z.B. Neurodermitis) die Hautraugigkeit wie auch den Juckreiz vermindern. Die fettende Emulsionsgrundlage hilft mit, den Fett- und Feuchtigkeitsgehalt der Haut zu normalisieren, und erleichtert eine grossflächige Anwendung.

Pruri-med Lipolotion / Pruri-med Lipolotion sensitive eignet sich zur Behandlung von trockener und / oder juckender Haut sowie zur unterstützenden Behandlung verschiedener Hauterkrankungen wie z.B. atopischer Dermatitis (Neurodermitis) sowie bei Austrocknungsschäden.

Wann darf Pruri-med Lipolotion / Pruri-med Lipolotion sensitive nicht angewendet werden?

Pruri-med Lipolotion / Pruri-med Lipolotion sensitive darf nicht bei akuten Entzündungen der Haut, auf offene Hautpartien oder Wunden oder bei Überempfindlichkeit auf einen der Inhaltsstoffe angewendet werden.

Wann ist bei der Anwendung von Pruri-med Lipolotion / Pruri-med Lipolotion sensitive Vorsicht geboten?

Die Anwendung von Pruri-med Lipolotion / Pruri-med Lipolotion sensitive bei Kindern unter 12 Jahren ist bisher nicht geprüft worden.

Pruri-med Lipolotion / Pruri-med Lipolotion sensitive darf bei Säuglingen nur nach ärztlicher Rücksprache angewendet werden. Personen, die allergisch reagieren, sollten bei jeder Selbstbehandlung mit neuen Arzneimitteln Vorsicht walten lassen.

Verschlimmert sich der Hautzustand oder vermindert sich der Juckreiz nicht nach einer Woche Behandlung mit Pruri-med Lipolotion / Pruri-med Lipolotion sensitive, sollten Sie einen Arzt, Apotheker oder Drogist bzw. eine Ärztin, Apothekerin oder Drogistin aufsuchen.

Dieses Arzneimittel enthält 75 mg Propylenglycol pro 1 g Emulsion. Kann örtlich begrenzte Hautreizungen (z.B. Kontaktdermatitis) hervorrufen.

Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie an anderen Krankheiten leiden, Allergien haben oder andere Arzneimittel (auch selbst gekaufte!) einnehmen oder äusserlich anwenden.



Darf Pruri-med Lipolotion / Pruri-med Lipolotion sensitive während der Schwangerschaft oder in der Stillzeit angewendet werden?

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen ist bei bestimmungsgemässer Anwendung kein Risiko für das Kind bekannt. Systematische wissenschaftliche Untersuchungen wurden aber nie durchgeführt. Vorsichtshalber sollten Sie während der Schwangerschaft und Stillzeit möglichst auf Arzneimittel verzichten oder den Arzt, den Apotheker oder Drogisten bzw. die Ärztin, die Apothekerin oder die Drogistin um Rat fragen.

Wie verwenden Sie Pruri-med Lipolotion / Pruri-med Lipolotion sensitive?

Soweit vom Arzt/von der Ärztin nicht anders verordnet, wird Pruri-med Lipolotion / Pruri-med Lipolotion sensitive zwei- bis dreimal täglich gleichmässig auf die befallene Haut aufgetragen und leicht eingerieben. Die Dauer der Anwendung richtet sich nach dem Krankheitsbild und beträgt durchschnittlich 4 Wochen. Bei anhaltend trockener Haut kann Pruri-med Lipolotion / Pruri-med Lipolotion sensitive auch über einen längeren Zeitraum angewendet werden. Bei Kombination von Pruri-med Lipolotion / Pruri-med Lipolotion sensitive mit anderen Arzneimitteln für die Haut wie z.B. Kortikoid-Präparaten legt der Arzt bzw. die Ärztin das Behandlungsschema fest.

Die Anwendung von Pruri-med Lipolotion / Pruri-med Lipolotion sensitive ist bei Kindern unter 12 Jahren nicht geprüft worden.

Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt bzw. der Ärztin verschriebene Dosierung. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. mit Ihrer Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Welche Nebenwirkungen kann Pruri-med Lipolotion / Pruri-med Lipolotion sensitive haben?

Folgende Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Pruri-med Lipolotion / Pruri-med Lipolotion sensitive auftreten:

Gelegentlich (betrifft 1 bis 10 von 1000 Behandelten)

Gelegentlich kann es nach dem Auftragen auf entzündeter Haut zu Brennen, Rötung, Juckreiz, Ekzemverstärkung oder anderen Überempfindlichkeitsreaktionen kommen.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin. Dies gilt insbesondere auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Was ist ferner zu beachten?

Haltbarkeit: Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit «EXP» bezeichneten Datum verwendet werden.

Lagerungshinweis: Bei Raumtemperatur (15 – 25 °C) lagern und ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.

Weitere Hinweise: Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker oder Drogist bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin. Diese Personen verfügen über die ausführliche Fachinformation.

Was ist in Pruri-med Lipolotion / Pruri-med Lipolotion sensitive enthalten?

Wirkstoffe: 1 g Pruri-med Lipolotion / Pruri-med Lipolotion sensitive (Emulsion zur Anwendung auf der Haut) enthält 50 mg Harnstoff (Urea) und 30 mg Macrogol-9-laurylether (Polidocanol 600).

Hilfsstoffe Pruri-med Lipolotion: 1 g Emulsion zur Anwendung auf der Haut enthält mittelkettige Triglyceride, Octyldodecanol, Propylenglycol (E 1520), Isopropylpalmitat, Natriummonohydrogenphosphat-Dihydrat, Zitronensäure, Macrogol-23-laurylether, Phenoxyethanol, Carmellose-Natrium, Kaliumsorbat (E 202), fruchtig-blumiges Parfüm und gereinigtes Wasser. Der Fettgehalt beträgt 40 %.

Hilfsstoffe Pruri-med Lipolotion sensitive: 1 g Emulsion zur Anwendung auf der Haut enthält mittelkettige Triglyceride, Octyldodecanol, Propylenglycol (E 1520), Isopropylpalmitat, Natriummonohydrogenphosphat-Dihydrat, Zitronensäure, Macrogol-23-laurylether, Phenoxyethanol, Carmellose-Natrium, Kaliumsorbat (E 202) und gereinigtes Wasser. Der Fettgehalt beträgt 40 %.



Zulassungsnummer

56161 (Swissmedic).

Wo erhalten Sie Pruri-med Lipolotion / Pruri-med Lipolotion sensitive? Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken und Drogerien, ohne ärztliche Verschreibung.

Pruri-med Lipolotion, Emulsion zur Anwendung auf der Haut: Tube à 200 ml und Flasche à 500 ml.

Pruri-med Lipolotion sensitive, Emulsion zur Anwendung auf der Haut: Tube à 200 ml und Flasche à 500 ml.

Zulassungsinhaberin

Permamed AG, 4143 Dornach, Schweiz

Diese Packungsbeilage wurde im Mai 2024 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

