

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications du médecin, du pharmacien ou du droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Pruri-med Lipolotion® Pruri-med Lipolotion sensitive®

Permamed AG

Qu'est-ce que Pruri-med Lipolotion / Pruri-med Lipolotion sensitive et quand doit-il être utilisé?

Pruri-med Lipolotion / Pruri-med Lipolotion sensitive est une émulsion pour application cutanée à base d'urée et de polidocanol 600 (principes actifs), à forte teneur en lipides (40 %). Il est utilisé en cas de peau sèche et de démangeaisons.

À la différence de Pruri-med Lipolotion sensitive, Pruri-med Lipolotion contient un parfum.

L'urée joue un rôle dans la régulation de l'humidité de la peau. Le polidocanol 600 possède des propriétés antiprurigineuses.

Chez des patients à peau sèche et prurigineuse ou atteints d'eczéma (névrodermite par exemple), Pruri-med Lipolotion / Pruri-med Lipolotion sensitive a réduit la rugosité de la peau et apaisé les démangeaisons. La base graissante de l'émulsion contribue à normaliser la teneur en graisse et en eau de la peau et facilite l'application sur des surfaces étendues.

Pruri-med Lipolotion / Pruri-med Lipolotion sensitive convient au traitement des peaux sèches et / ou prurigineuses et peut être utilisé comme traitement d'appoint lors de diverses maladies de la peau, p.ex. la dermatite atopique (névrodermite), ainsi qu'en cas de lésions dues au dessèchement de la peau.

Quand Pruri-med Lipolotion / Pruri-med Lipolotion sensitive ne doit-il pas être utilisé?

Pruri-med Lipolotion / Pruri-med Lipolotion sensitive ne doit pas être utilisé en cas d'inflammations aiguës de la peau, sur des lésions ou plaies ouvertes ou en cas d'hypersensibilité à l'un de ses composants.

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Pruri-med Lipolotion / Pruri-med Lipolotion sensitive?

L'utilisation de Pruri-med Lipolotion / Pruri-med Lipolotion sensitive n'a pas été établie à ce jour pour les enfants de moins de 12 ans.

Pruri-med Lipolotion / Pruri-med Lipolotion sensitive ne peut être administré aux nourrissons qu'après consultation médicale. Les personnes sujettes aux allergies doivent faire preuve de prudence lorsqu'elles utilisent un nouveau produit en automédication.

Si l'état de la peau s'aggrave ou si les démangeaisons persistent après une semaine de traitement avec Pruri-med Lipolotion / Pruri-med Lipolotion sensitive, consultez votre médecin, pharmacien ou droguiste.

Ce médicament contient 75 mg de propylène glycol par gramme d'émulsion. Ce composant peut provoquer des irritations localisées de la peau (p.ex. dermatite de contact).

Veuillez informer votre médecin, pharmacien ou droguiste si vous souffrez d'une autre maladie, si vous êtes allergique ou si vous prenez déjà d'autres médicaments à usage interne ou externe (même en automédication!).

Pruri-med Lipolotion / Pruri-med Lipolotion sensitive peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a



été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments pendant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis du médecin, pharmacien ou droguiste.

Comment utiliser Pruri-med Lipolotion / Pruri-med Lipolotion sensitive?

Sauf prescription contraire du médecin, étaler Pruri-med Lipolotion / Pruri-med Lipolotion sensitive deux à trois fois par jour sur la peau atteinte en massant doucement pour le faire pénétrer. La durée du traitement dépend du tableau clinique; elle est en moyenne de 4 semaines. Si la sécheresse cutanée ne s'améliore pas, Pruri-med Lipolotion / Pruri-med Lipolotion sensitive peut être utilisé sur une période plus longue. S'il est employé en combinaison avec un autre médicament à usage externe, p.ex. un corticostéroïde, c'est au médecin de fixer le schéma thérapeutique.

Pruri-med Lipolotion / Pruri-med Lipolotion sensitive n'a pas été testé chez les enfants de moins de 12 ans.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, pharmacien ou droguiste.

Quels effets secondaires Pruri-med Lipolotion / Pruri-med Lipolotion sensitive peut-il provoquer?

Les effets secondaires suivants peuvent survenir avec l'utilisation de Pruri-med Lipolotion / Pruri-med Lipolotion sensitive:

Occasionnel (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 1000)

Occasionnellement, l'application du produit sur la peau enflammée peut provoquer une sensation de brûlure, une rougeur, des démangeaisons, une exacerbation de l'eczéma ou d'autres réactions d'hypersensibilité.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Cela vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention?

Stabilité: ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Remarques concernant le stockage: conserver à température ambiante (15-25° C) et hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires: pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, pharmacien ou droguiste, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Pruri-med Lipolotion / Pruri-med Lipolotion sensitive?

Principes actifs: 1 g de Pruri-med Lipolotion / Pruri-med Lipolotion sensitive (émulsion pour application cutanée) contient 50 mg d'urée et 30 mg de macrogol 9 lauryléther (polidocanol 600).

Excipients Pruri-med Lipolotion: 1 g d'émulsion pour application cutanée contient les excipients suivants: triglycérides à chaîne moyenne, octyldodécanol, propylène glycol (E 1520), palmitate d'isopropyle, monohydrogénophosphate de sodium dihydraté, acide citrique, macrogol 23 lauryléther, phénoxyéthanol, carmellose sodique, sorbate de potassium (E 202), parfum floral fruité et eau purifiée. La teneur en graisse est de 40 %.

Excipients Pruri-med Lipolotion sensitive: 1 g d'émulsion pour application cutanée contient les excipients suivants: triglycérides à chaîne moyenne, octyldodécanol, propylène glycol (E 1520), palmitate d'isopropyle, monohydrogénophosphate de sodium dihydraté, acide citrique, macrogol 23 lauryléther, phénoxyéthanol, carmellose sodique, sorbate de potassium (E 202) et eau purifiée. La teneur en graisse est de 40 %.

Numéro d'autorisation

56161 (Swissmedic)



Où obtenez-vous Pruri-med Lipolotion / Pruri-med Lipolotion sensitive? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Pruri-med Lipolotion, émulsion pour application cutanée: tube de 200 ml et flacon de 500 ml.

Pruri-med Lipolotion sensitive, émulsion pour application cutanée: tube de 200 ml et flacon de 500 ml.

Titulaire de l'autorisation

Permamed AG, 4143 Dornach, Suisse

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en mai 2024 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

