

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del Suo medico o del Suo farmacista o del Suo droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Pruri-med Lipolotion® Pruri-med Lipolotion sensitive®

Permamed AG

Che cos'è Pruri-med Lipolotion / Pruri-med Lipolotion sensitive e quando si usa?

Pruri-med Lipolotion / Pruri-med Lipolotion sensitive è un'emulsione per uso cutaneo con i principi attivi urea e polidocanolo 600 con elevato tenore di lipidi (40%) per il trattamento della pelle secca e pruriginosa.

Pruri-med Lipolotion sensitive e Pruri-med Lipolotion si differenziano in quanto Pruri-med Lipolotion contiene un profumo.

L'urea coadiuva la regolazione dell'idratazione della pelle. Il principio attivo polidocanolo 600 ha un effetto antipruriginoso.

In pazienti con pelle secca, pruriginosa o con eczemi (per esempio neurodermite) Pruri-med Lipolotion / Pruri-med Lipolotion sensitive è stato in grado di diminuire la ruvidezza della pelle e il prurito. La base untuosa dell'emulsione aiuta a normalizzare il tenore di lipidi della pelle e la sua idratazione e facilita l'uso su superfici estese.

Pruri-med Lipolotion / Pruri-med Lipolotion sensitive è adatto per il trattamento della pelle secca e / o pruriginosa come pure per il trattamento coadiuvante di diverse malattie della pelle, quali per esempio la dermatite atopica (neurodermite), nonché in caso di danni da disidratazione.

Quando non si può usare Pruri-med Lipolotion / Pruri-med Lipolotion sensitive?

Pruri-med Lipolotion / Pruri-med Lipolotion sensitive non si può usare in caso di infiammazioni acute della pelle, su zone di pelle lesa e su ferite o in caso d'ipersensibilità a uno dei suoi costituenti.

Quando è richiesta prudenza nell'uso di Pruri-med Lipolotion / Pruri-med Lipolotion sensitive?

L'uso di Pruri-med Lipolotion / Pruri-med Lipolotion sensitive nei bambini sotto i 12 anni finora non è stato esaminato.

Pruri-med Lipolotion / Pruri-med Lipolotion sensitive può essere somministrato ai neonati solo dopo aver consultato un medico. Le persone che presentano reazioni allergiche dovrebbero essere prudenti con ogni tipo di automedicazione che preveda l'uso di nuovi farmaci.

Se lo stato della pelle peggiora o il prurito non diminuisce dopo una settimana di trattamento con Pruri-med Lipolotion / Pruri-med Lipolotion sensitive consulti un medico, un farmacista o un droghiere.

Questo medicamento contiene 75 mg di glicole propilenico per 1 g di emulsione. Possono verificarsi irritazioni cutanee locali (p. es. dermatite da contatto).

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere nel caso in cui soffre di altre malattie, allergie o assume o applica esternamente altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa!).

Si può usare Pruri-med Lipolotion / Pruri-med Lipolotion sensitive durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono mai state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per precauzione dovrebbe rinunciare nella misura del possibile a usare medicinali durante la gravidanza e l'allattamento o chiedere consiglio al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.



Come usare Pruri-med Lipolotion / Pruri-med Lipolotion sensitive?

Salvo diversa prescrizione del medico, applicare uniformemente Pruri-med Lipolotion / Pruri-med Lipolotion sensitive due o tre volte al giorno sulla zona di pelle da trattare e farlo penetrare frizionando leggermente. La durata dell'uso dipende dal quadro clinico e in media è di 4 settimane. Incaso di pelle secca persistente si può usare Pruri-med Lipolotion / Pruri-med Lipolotion sensitive anche per un periodo più prolungato. In caso di associazione di Pruri-med Lipolotion / Pruri-med Lipolotion sensitive ad altri medicinali per la pelle, come per esempio preparati corticosteroidi, spetta al medico stabilire lo schema di trattamento.

L'uso di Pruri-med Lipolotion / Pruri-med Lipolotion sensitive nei bambini sotto i 12 anni finora non è stato esaminato.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Pruri-med Lipolotion / Pruri-med Lipolotion sensitive?

In seguito all'applicazione di Pruri-med Lipolotion/ Pruri-med Lipolotion sensitive possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali:

Non comune (riguarda da 1 a 10 persone su 1000)

Occasionalmente, dopo l'applicazione sulla pelle infiammata, possono verificarsi bruciore, arrossamento, prurito, aggravamento dell'eczema o altre reazioni d'ipersensibilità.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità: il medicamento non deve essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Precauzione per la conservazione: conservare a temperatura ambiente (15-25 °C) e tenere fuori dalla portata dei bambini.

Altre indicazioni: il medico, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Pruri-med Lipolotion / Pruri-med Lipolotion sensitive?

Principi attivi: 1 g di Pruri-med Lipolotion / Pruri-med Lipolotion sensitive (emulsione per uso cutaneo) contiene 50 mg di urea e 30 mg di macrogol 9 lauril etero (polidocanolo 600).

Sostanze ausiliarie Pruri-med Lipolotion: 1 g di emulsione per uso cutaneo contiene trigliceridi a catena media, ottildodecanolo, glicole propilenico (E 1520), palmitato di isopropile, diidrogenofosfato di sodio, acido citrico, Macrogol 23 lauril etero, fenossietanolo, carmellosa sodica, sorbato di potassio (E 202), profumo fruttato fiorito e acqua purificata. Il tenore di lipidi è del 40%.

Sostanze ausiliarie Pruri-med Lipolotion sensitive: 1 g di emulsione per uso cutaneo contiene trigliceridi a catena media, ottildodecanolo, glicole propilenico (E 1520), palmitato di isopropile, diidrogenofosfato di sodio, acido citrico, Macrogol 23 lauril etero, fenossietanolo, carmellosa sodica, sorbato di potassio (E 202) e acqua purificata. Il tenore di lipidi è del 40%.

Numero dell'omologazione

56161 (Swissmedic).

Dove è ottenibile Pruri-med Lipolotion / Pruri-med Lipolotion sensitive? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Pruri-med Lipolotion, emulsione per uso cutaneo: tubetto da 200 ml e flacone da 500 ml.

Pruri-med Lipolotion sensitive, emulsione per uso cutaneo: tubetto da 200 ml e flacone da 500 ml.



Titolare dell'omologazione

Permamed SA, 4143 Dornach, Svizzera

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel maggio 2024 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

