

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico, del suo farmacista o del suo droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Bilastin-Mepha, compresse

Mepha Pharma AG

Che cos'è Bilastin-Mepha e quando si usa?

Bilastin-Mepha contiene il principio attivo bilastina, ed è un medicamento appartenente alla classe degli antiallergici ad azione prolungata.

Bilastin-Mepha è usato per alleviare i sintomi del raffreddore da fieno (starnuti, prurito, naso che cola o congestione nasale e lacrimazione).

Inoltre, Bilastin-Mepha è usato nel trattamento delle eruzioni cutanee pruriginose (orticaria).

Quando non si può assumere Bilastin-Mepha?

Non deve assumere Bilastin-Mepha compresse se è allergico (ipersensibile) al principio attivo bilastina o ad altri componenti di Bilastin-Mepha compresse.

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione di Bilastin-Mepha?

Bilastin-Mepha compresse non è indicato per il trattamento di bambini sotto i 12 anni di età.

Se soffre di insufficienza renale moderata, si raccomanda cautela nell'uso di Bilastin-Mepha compresse ed è necessario che informi il suo medico. Se soffre di insufficienza renale o epatica grave, non deve far uso di Bilastin-Mepha.

Cosulti il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere prima di prendere Bilastin-Mepha

✎ se ha bassi livelli di potassio, magnesio, calcio nel sangue, se soffre, o ha sofferto, di problemi del ritmo cardiaco o se la sua frequenza cardiaca è molto bassa, se sta assumendo medicinali che possono influenzare il ritmo cardiaco, se ha, o ha avuto, una determinata anomalia del battito cardiaco (nota come prolungamento dell'intervallo QTc all'elettrocardiogramma) che si può manifestare in alcune forme di cardiopatia e sta, inoltre, assumendo altri medicinali

✎ se è incinta, se pianifica una gravidanza o se sta allattando (vedi «Si può assumere Bilastin-Mepha durante la gravidanza o l'allattamento?»).

Non superare la posologia consigliata.

Se i suoi disturbi persistono nonostante il trattamento, si rivolga al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Capacità di condurre veicoli e di utilizzare utensili o macchine

La bilastina (il principio attivo delle compresse di Bilastin-Mepha) è considerato un antiallergico che generalmente non provoca sonnolenza e non compromette la capacità di prestazione e concentrazione. Tuttavia, le reazioni al medicamento possono variare da paziente a paziente. Verifichi quindi la sua reazione a questo medicamento prima di condurre un veicolo o utilizzare macchine.

Interazioni con altri medicinali

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere soprattutto se assume uno dei seguenti medicinali:

✎ chetoconazolo (un medicamento contro le micosi),

✎ eritromicina (un antibiotico),



⚠• diltiazem (un medicamento per il trattamento dell'angina pectoris).

Assunzione di Bilastin-Mepha assieme ad alimenti e bevande

Le compresse di Bilastin-Mepha non vanno assunte assieme al cibo, perché questo può ridurre l'effetto di Bilastin-Mepha.

Le compresse di Bilastin-Mepha non vanno assunte assieme al succo di pompelmo o ad altri succhi di frutta.

Questo medicamento contiene meno di 1 mmol di sodio (23 mg) per compressa, cioè è essenzialmente «senza sodio».

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- ⚠• soffre di altre malattie,
- ⚠• soffre di allergie o
- ⚠• assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa).

Si può assumere Bilastin-Mepha durante la gravidanza o l'allattamento?

Non sono disponibili dati, se non in misura ridotta, sulla bilastina nelle donne in gravidanza e in allattamento e sugli effetti riguardanti la capacità riproduttiva.

Informi il suo medico se è attualmente incinta, se desidera restare incinta o se allatta.

Se è incinta o se allatta, non deve assumere Bilastin-Mepha, a meno che le sia stato espressamente prescritto dal medico. Se usa Bilastin-Mepha, deve interrompere l'allattamento.

Come usare Bilastin-Mepha?

Adulti e ragazzi sopra i 12 anni:

- ⚠• Assumere una compressa al giorno.
- ⚠• Le compresse di Bilastin-Mepha vanno assunte a stomaco vuoto 1 ora prima dell'assunzione di cibo o di succhi di frutta, p.es. al mattino 1 ora prima della colazione. Dopo aver mangiato o bevuto succhi di frutta, dovrebbe aspettare almeno 2 ore prima di prendere Bilastin-Mepha.
- ⚠• Assuma le compresse di Bilastin-Mepha con un bicchiere d'acqua.

Non prenda le compresse di Bilastin-Mepha per più di 10 giorni senza consultare il medico.

Uso nei bambini

L'uso e la sicurezza di Bilastin-Mepha nei bambini sotto i 12 anni finora non sono stati esaminati.

Se ha assunto una quantità di Bilastin-Mepha maggiore di quella prescritta

Se lei o un'altra persona ha assunto un numero eccessivo di compresse di Bilastin-Mepha (più del numero di compresse prescritte), si rivolga *immediatamente* al suo medico o al suo farmacista.

Se ha dimenticato di assumere Bilastin-Mepha

Se ha dimenticato di assumere la compressa di Bilastin-Mepha, non prenda mai una dose doppia per compensare quella saltata. Se si accorge di aver dimenticato l'assunzione giornaliera della compressa di Bilastin-Mepha, prenda la compressa successiva all'orario abituale il giorno seguente, e continui l'assunzione come prescritto o come d'abitudine.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Bilastin-Mepha?

In seguito all'assunzione di Bilastin-Mepha possono comparire i seguenti effetti collaterali:



Comune (riguarda da 1 a 10 persone su 100)

Mal di testa, sonnolenza.

Non comune (riguarda da 1 a 10 persone su 1000)

Valori epatici anomali, anomalie nell'ECG (elettrocardiogramma), disturbi della conduzione cardiaca, disturbi del ritmo cardiaco, capogiro, tinnito (rumori o ronzii nelle orecchie), vertigini (sensazione di instabilità o di movimento rotatorio), dispnea (difficoltà respiratoria), secchezza nasale o sensazione di fastidio al naso, mal di stomaco, dolori addominali, conati di vomito, diarrea, bocca secca, disturbi digestivi, infiammazione della mucosa dello stomaco, prurito, aumento dell'appetito, febbre del labbro (herpes labiale), stanchezza, sete, febbre, debolezza, ansia, insonnia, aumento ponderale, aumento dei valori della creatinina ematica, aumento dei valori dei lipidi ematici.

Frequenza non nota (non può essere definita sulla base dei dati disponibili)

Palpitazioni, battito cardiaco rapido (tachicardia), reazioni allergiche (i sintomi possono comprendere: disturbi respiratori, vertigini rotatorie, collasso o perdita di coscienza, gonfiore del viso, delle labbra, della lingua o della gola e/o gonfiore e arrossamento della pelle. Se compare uno di questi severi effetti collaterali, interrompa l'assunzione e si rivolga immediatamente a un medico), vomito.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Le compresse eventualmente avanzate al termine del trattamento o le compresse scadute devono essere riportate al punto di vendita (medico, farmacista o droghiere) per essere avviate ad un corretto smaltimento.

Istruzioni di conservazione

Conservare nella confezione originale e a temperature non superiori a 30°C. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il suo medico, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Bilastin-Mepha?

Una compressa rotonda biconvessa di colore bianco-biancastro contiene:

Principi attivi

20 mg di bilastina.

Sostanze ausiliarie

Mannitolo, cellulosa microcristallina, carbossimetilamido sodico (tipo A), alluminio magnesio silicato, magnesio stearato, silice colloidale.

Numero dell'omologazione

68002 (Swissmedic).

Dove è ottenibile Bilastin-Mepha? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Bilastin-Mepha 20 mg: confezioni da 10, 30 e 50 compresse.



Titolare dell'omologazione

Mepha Pharma AG, Basel.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel febbraio 2025 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

Numero interno della versione: 5.1

