

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage avant de prendre ou d'utiliser ce médicament. Ce médicament vous a été remis personnellement sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Acétate de Calcium Salmon Pharma 500 mg

Salmon Pharma GmbH

Qu'est-ce que l'Acétate de Calcium Salmon Pharma 500 mg et quand doit-il être utilisé?

Acétate de Calcium Salmon Pharma 500 mg contient de l'acétate de calcium et est utilisé pour le traitement d'un taux élevé de phosphate sanguin lors d'une insuffisance de la fonction rénale.

Selon prescription du médecin.

Quand Acétate de Calcium Salmon Pharma 500 mg ne doit-il pas être pris/utilisé?

En cas de taux sériques de calcium élevés (hypercalcémie), en cas de taux sériques de phosphate diminués (hypophosphatémie), en cas de calculs rénaux contenant du calcium, lors d'un traitement avec la vitamine D₃.

Quelles sont les précautions à observer lors de la prise/de l'utilisation d'Acétate de Calcium Salmon Pharma 500 mg?

L'acétate de calcium peut diminuer la résorption des antibiotiques (par ex. des tétracyclines, des céphalosporines, des quinolones comme la ciprofloxacine et la norfloxacine), des cytostatiques (par ex. les préparations de fluorure et d'estrามustine), des bisphosphonates et des hormones thyroïdiennes ainsi qu'influencer l'efficacité des glycosides cardiotoniques. L'intervalle de temps entre la prise des préparations de ces groupes et de l'acétate de calcium doit être de trois heures.

De même, la résorption de préparations de fer et de kétoconazole administrées par voie orale est inhibée.

Les taux sériques de calcium doivent être contrôlés lors d'un traitement simultané avec la vitamine D et les préparations à base de vitamine D.

Si votre médecin vous a informé(e) que vous avez une intolérance à certains sucres, contactez votre médecin avant de prendre Acétate de Calcium Salmon Pharma 500 mg.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments (même en automédication !).

Acétate de Calcium Salmon Pharma 500 mg peut-il être pris/utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Uniquement sur ordonnance médicale.

Comment utiliser Acétate de Calcium Salmon Pharma 500 mg?

Adultes:

La posologie s'adapte en fonction du taux de phosphate et doit être ajusté individuellement par le médecin. Sauf prescription contraire du médecin, la dose initiale est de 8 comprimés d'Acétate de Calcium Salmon Pharma 500 mg par jour. Le médecin peut ensuite adapter cette dose au taux de phosphate sérique désiré. Les comprimés doivent être répartis sur la journée et être pris sans être mâchés lors des repas.

L'utilisation et la sécurité d'Acétate de Calcium Salmon Pharma 500 mg n'ont pas été établies à ce jour pour les enfants et les adolescents.



Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires Acétate de Calcium Salmon Pharma 500 mg peut-il provoquer?

Les effets secondaires suivants peuvent survenir lors du traitement avec l'acétate de calcium:

Lors d'une prise prolongée d'une dose élevée, le taux de calcium sanguin peut augmenter (avec des symptômes tels que douleurs abdominales, nausées, vomissements, confusion). Le médecin peut déceler ceci lors des contrôles réguliers.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention?

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15-25 °C).

Conserver hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Acétate de Calcium Salmon Pharma 500 mg?

Principes actifs

1 comprimé pelliculé contient 500 mg d'acétate de calcium (*Calcii acetat*).

Excipients

Acétate de Calcium Salmon Pharma 500 mg contient comme autres composants (excipients):

cellulose microcristalline, povidone K 30, crospovidone, stéarate de magnésium, saccharose, hypromellose, macrogol 6000, talc.

Numéro d'autorisation

52'622 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Acétate de Calcium Salmon Pharma 500 mg? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie, sur ordonnance médicale.

Emballage de 100 comprimés pelliculés à 500 mg.

Titulaire de l'autorisation

Salmon Pharma, Bâle.

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en octobre 2017 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

