

Information für Patientinnen und Patienten

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, denn sie enthält wichtige Informationen.

Dieses Arzneimittel haben Sie entweder persönlich von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin verschrieben erhalten oder Sie haben es ohne ärztliche Verschreibung in der Apotheke oder Drogerie bezogen. Wenden Sie das Arzneimittel gemäss Packungsbeilage beziehungsweise nach Anweisung des Arztes, Apothekers oder Drogisten bzw. der Ärztin, der Apothekerin oder der Drogistin an, um den grössten Nutzen zu haben. Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

Biotin-Biomed® forte 5 mg, Tabletten

Biomed AG

Was ist Biotin-Biomed forte 5 mg und wann wird es angewendet?

Das in Biotin-Biomed forte 5 mg enthaltene Biotin gehört zur Gruppe der B-Vitamine.

Biotin ist an lebenswichtigen Vorgängen im Stoffwechselgeschehen beteiligt. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Bildung und Erneuerung der Haut, der Haare und Nägel. Biotin wird dem Körper normalerweise durch die Nahrung zugeführt. Einseitige Ernährung oder Störungen der Aufnahme von Biotin aus dem Magen-Darm-Trakt können zu einem Biotinmangel führen. Biotin-Biomed forte 5 mg verwenden Sie bei Biotinmangelzuständen, die sich vor allem als Haar- und Nagelwachstumsstörungen äussern.

Auf Empfehlung des Arztes oder Apothekers bzw. der Ärztin oder Apothekerin kann Biotin-Biomed forte 5 mg auch bei seborrhoischen Hauterkrankungen beim Säugling angewendet werden.

Was sollte dazu beachtet werden?

Beim Kind soll eine adäquate Hautpflege durchgeführt werden. Lassen Sie sich dazu vom Arzt oder Apotheker bzw. von der Ärztin oder Apothekerin beraten.

Hinweis für Diabetiker: Biotin-Biomed forte enthält pro Tablette weniger als 0.1 g verwertbare Kohlenhydrate. Das Arzneimittel ist für Diabetiker geeignet.

Wann darf Biotin-Biomed forte 5 mg nicht eingenommen werden?

Bis heute sind keine Anwendungseinschränkungen bekannt.

Wann ist bei der Einnahme von Biotin-Biomed forte 5 mg Vorsicht geboten?

Es bestehen Hinweise, dass krampflindernde Mittel zur Behandlung von Epilepsie die Wirkung von Biotin erniedrigen.

Falls Sie Laboruntersuchungen machen müssen und Biotin einnehmen, informieren Sie bitte Ihren Arzt bzw. Ihre Ärztin. Biotin kann die Ergebnisse beeinflussen.

Gleichzeitige übermässige Einnahme von rohem Eiereiweiss sollte vermieden werden, da dadurch die Wirkung von Biotin-Biomed forte 5 mg beeinträchtigt wird.

Bitte nehmen Sie Biotin-Biomed forte 5 mg erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt bzw. Ihrer Ärztin ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie

- an anderen Krankheiten leiden,
- Allergien haben oder
- andere Arzneimittel (auch selbst gekaufte!) einnehmen!

Darf Biotin-Biomed forte 5 mg während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit eingenommen werden?

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen ist bei bestimmungsgemässer Anwendung kein Risiko für das Kind bekannt. Systematische wissenschaftliche Untersuchungen wurden aber nie durchgeführt. Vorsichtshalber sollten Sie während der Schwangerschaft und Stillzeit möglichst auf Arzneimittel verzichten oder den Arzt,



Apotheker oder Drogisten bzw. die Ärztin, Apothekerin oder Drogistin um Rat fragen.

Wie verwenden Sie Biotin-Biomed forte 5 mg?

Haar- und Nagelwachstumsstörungen

Soweit nicht anders verordnet, täglich 1 Tablette Biotin-Biomed forte 5 mg vor dem Essen mit Flüssigkeit einnehmen. Bei gewissen Mangelzuständen kann Ihr Arzt bzw. Ihre Ärztin die Tagesdosis auf 2 Tabletten Biotin-Biomed forte 5 mg erhöhen.

Durch Biotinmangel verursachte seborrhoische Hauterkrankung beim Säugling

Säuglinge, die künstlich ernährt werden, erhalten 1–2 zerriebene Tabletten Biotin-Biomed forte 5 mg täglich mit Flüssigkeit (im Schoppen). Bei Brustkindern erhält die Mutter morgens und abends je 1 Tablette Biotin-Biomed forte 5 mg während 1–2 Wochen. Es ist zu empfehlen, dass die Mutter gleichzeitig ein Vitamin-B-Komplex-Präparat während 7–14 Tagen einnimmt.

Die Zierrille von Biotin-Biomed forte 5 mg ist nicht zum Teilen der Tabletten geeignet.

Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt oder der Ärztin verschriebene Dosierung. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. mit Ihrer Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Welche Nebenwirkungen kann Biotin-Biomed forte 5 mg haben?

In sehr seltenen Fällen können allergische Reaktionen der Haut (Hautausschlag, Juckreiz, Nesselsucht, Hautrötung) oder leichte Magen-Darm-Beschwerden (z.B. Bauchschmerzen) auftreten.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten oder Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin. Dies gilt insbesondere auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Was ist ferner zu beachten?

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit «EXP» bezeichneten Datum verwendet werden.

Lagerungshinweis

Biotin-Biomed forte 5 mg ist trocken und bei Raumtemperatur (15-25 °C) zu lagern.

Ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.

Weitere Hinweise

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker oder Drogist bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin. Diese Personen verfügen über die ausführliche Fachinformation.

Was ist in Biotin-Biomed forte 5 mg enthalten?

1 Tablette Biotin-Biomed forte 5 mg enthält:

Wirkstoffe

Biotin 5 mg

Hilfsstoffe

Lactose-Monohydrat, Mikrokristalline Cellulose, Crospovidon, Magnesiumstearat, Povidon K30.

Zulassungsnummer

34149 (Swissmedic).

Wo erhalten Sie Biotin-Biomed forte 5 mg? Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken und Drogerien, ohne ärztliche Verschreibung.

Packungen zu 30 und 90 Tabletten (mit Zierrille).



Zulassungsinhaberin

Biomed AG, CH-8600 Dübendorf.

Diese Packungsbeilage wurde im Dezember 2023 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

