

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico, del suo farmacista o del suo droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Pretuval® influenza e raffreddore C

Bayer (Schweiz) AG

Che cos'è Pretuval influenza e raffreddore C e quando si usa?

Pretuval influenza e raffreddore C è un preparato che allevia i sintomi dell'influenza e del raffreddamento con i principi attivi paracetamolo, destrometorfano, pseudoefedrina e vitamina C.

Il destrometorfano calma lo stimolo eccessivo della tosse. Alle posologie raccomandate, la sua azione dura generalmente 6 ore o più.

La pseudoefedrina ferma il gocciolio del naso e facilita la respirazione. Decongestiona le mucose nasali e bronchiali e riduce l'eccessiva produzione di muco.

Il paracetamolo abbassa la febbre e allevia il mal di testa e i dolori agli arti.

L'aggiunta di vitamina C in Pretuval influenza e raffreddore C copre l'aumentato fabbisogno di vitamina C in corso di infezioni.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Questo medicamento può portare a dipendenza. Pertanto il trattamento dovrà essere di breve durata. Il consumo di tabacco favorisce la tosse («tosse dei fumatori»). Rinunciando al fumo, può sostenere l'effetto antitussivo di Pretuval influenza e raffreddore C.

Come tutti i medicinali contro la febbre e i dolori, anche Pretuval influenza e raffreddore C non deve essere usato senza prescrizione medica per più di 3 giorni. In caso di disturbi persistenti, si rivolga al suo medico.

Anche dolori persistenti necessitano di un accertamento medico. La posologia indicata o prescritta dal medico non deve essere superata.

Parli con il medico o il farmacista prima di assumere le compresse effervescenti di Pretuval influenza e raffreddore C:

Se si assumono medicinali come certi antidepressivi o antipsicotici, le compresse effervescenti di Pretuval influenza e raffreddore C possono interagire con questi medicinali e si possono verificare alterazioni psichiche (ad es. eccitazione, allucinazioni, coma) e altri effetti come temperatura corporea superiore a 38°C, aumento della frequenza cardiaca, pressione arteriosa instabile, esagerazione dei riflessi, rigidità muscolare, mancanza di coordinazione e/o sintomi gastrointestinali (ad es. nausea, vomito, diarrea).

Un sovradosaggio di paracetamolo può causare danni al fegato. Per evitare il rischio di sovradosaggio, occorre assicurarsi che eventuali altri medicinali assunti contemporaneamente non contengano paracetamolo.

L'assunzione prolungata di antidolorifici, a sua volta, può contribuire alla persistenza del mal di testa.

L'assunzione a lungo termine di antidolorifici, in particolare la combinazione di diversi principi attivi antidolorifici, può provocare un danno permanente ai reni con il rischio di insufficienza renale.

Quando non si può assumere Pretuval influenza e raffreddore C?

In caso di ipersensibilità a uno dei componenti. In questo contesto l'ipersensibilità si manifesta, ad es., con asma, difficoltà a respirare, disturbi circolatori, aumento di frequenza delle pulsazioni cardiache, gonfiore della pelle e delle mucose, malessere o eruzione cutanea (orticaria). In singoli casi, le reazioni di



ipersensibilità possono causare svenimento e shock (il cosiddetto shock circolatorio). Se si manifestano reazioni di ipersensibilità (allergia), interrompa immediatamente il trattamento e si rivolga a un medico.

Pretuval influenza e raffreddore C non deve essere assunto né nel corso di un trattamento con determinati medicinali impiegati nei disturbi dell'umore (come inibitori delle monoamminoossidasi (MAO), inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI), antidepressivi triciclici) né nelle 2 settimane successive al trattamento poiché altrimenti possono verificarsi forti effetti collaterali (sindrome da serotonina). Possono manifestarsi i seguenti sintomi: aumento massivo della pressione arteriosa, iperattività neuromuscolare (tremori, rigidità, aumentata riflessività, contrazioni muscolari involontarie), iperattività autonoma (sudorazione, aumento della temperatura corporea, battito cardiaco accelerato, respirazione accelerata, dilatazione delle pupille) e alterazioni psichiche come stati di eccitazione e confusione.

In caso di uso concomitante di anoressizzanti.

Non deve assumere Pretuval influenza e raffreddore C in caso di marcata ipertensione (ipertensione grave) o pressione arteriosa elevata non farmacologicamente controllata, di insufficienza renale o malattia renale acuta (improvvisa) o cronica (a lungo termine) grave, di gravi malattie del cuore o del fegato o di epilessia.

Non deve usare Pretuval influenza e raffreddore C in caso di consumo eccessivo di alcol, aumento della pressione all'interno dell'occhio (glaucoma ad angolo stretto), bassa concentrazione di emoglobina nel sangue (anemia emolitica) o in presenza di un disturbo ereditario del fegato (la cosiddetta sindrome di Gilbert).

In caso di tosse accompagnata da espettorato (secrezione bronchiale) non deve assumere medicinali antitussivi senza aver prima consultato un medico e senza prescrizione medica.

Pretuval influenza e raffreddore C non deve essere somministrato ai bambini sotto i 12 anni.

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione di Pretuval influenza e raffreddore C?

La tosse è un meccanismo di difesa dell'organismo che può avere diverse cause. Se la tosse persiste per più di una settimana, si rivolga a un medico per chiarirne la causa, escludere una malattia più grave e, se necessario, iniziare un trattamento mirato.

Se soffre di asma, di altre malattie croniche delle vie respiratorie, di malattie del cuore, della tiroide, della prostata, del fegato o dei reni, di un tumore situato nel midollo surrenale (feocromocitoma), di diabete o di una malattia neurologica, oppure ha una grave infezione (ad es. infezione nel sangue), non deve assumere Pretuval influenza e raffreddore C senza prescrizione medica.

Se si manifestano reazioni di ipersensibilità (allergia), interrompa immediatamente il trattamento e si rivolga a un medico. Le reazioni di ipersensibilità si manifestano con eruzione cutanea, gonfiore del viso, aumento di frequenza delle pulsazioni cardiache, abbassamento della pressione arteriosa, capogiro, malessere e/o disturbi respiratori. In singoli casi possono anche causare svenimento e shock (il cosiddetto shock circolatorio).

In casi isolati si possono verificare gravi reazioni cutanee (pustolosi esantematica acuta generalizzata, sindrome di Stevens-Johnson e necrolisi epidermica tossica). Se sviluppa un arrossamento cutaneo generalizzato associato a pustole e febbre, interrompa l'assunzione di Pretuval influenza e raffreddore C e contatti immediatamente il medico. Cfr. la rubrica «Quali effetti collaterali può avere Pretuval influenza e raffreddore C?».

Con l'assunzione di Pretuval influenza e raffreddore C possono verificarsi improvviso dolore addominale o sanguinamento rettale, a causa di un'inflammatione del colon (colite ischemica). Se manifesta questi sintomi gastrointestinali, interrompa l'assunzione di Pretuval influenza e raffreddore C e si rivolga immediatamente al suo medico o a una struttura di assistenza sanitaria (cfr. «Quali effetti collaterali può avere Pretuval influenza e raffreddore C?»).

Con l'uso di Pretuval influenza e raffreddore C può verificarsi una riduzione del flusso sanguigno al nervo ottico. Se si verifica un'improvvisa perdita della vista, interrompa l'assunzione di Pretuval influenza e raffreddore C e si rivolga immediatamente al suo medico o a una struttura di assistenza sanitaria (cfr. «Quali effetti collaterali può avere Pretuval influenza e raffreddore C?»).

Dopo l'assunzione di medicinali contenenti pseudoefedrina sono stati riportati casi di sindrome da encefalopatia posteriore reversibile (PRES) e sindrome da vasocostrizione cerebrale reversibile (RCVS).



La PRES e la RCVS sono malattie rare che possono essere associate a un ridotto apporto di sangue nel cervello.

L'assunzione di Pretuval influenza e raffreddore C deve essere interrotta immediatamente e si deve consultare un medico qualora si manifestino pressione arteriosa elevata, malattie cardiovascolari, nausea, vomito, forti mal di testa a comparsa improvvisa, confusione, crisi convulsive o alterazioni della vista. Questi sintomi possono essere segni di sindrome da encefalopatia posteriore reversibile (PRES) e sindrome da vasocostrizione cerebrale reversibile (RCVS).

In caso di malattie dei reni o del fegato o in presenza di una rara malattia ereditaria dei globuli rossi del sangue, la cosiddetta carenza di glucosio-6-fosfato-deidrogenasi, così come in caso di uso contemporaneo di medicinali che influiscono sul fegato, in particolare certi medicinali contro la tubercolosi (rifampicina, isoniazide), l'epilessia (fenitoina, carbamazepina), le infezioni da HIV (zidovudina) o la gotta (probenecid), o in presenza di valori elevati di lipidi nel sangue (colestiramina), questo medicinale deve essere assunto esclusivamente seguendo le esatte indicazioni del medico.

È richiesta cautela anche in caso di uso contemporaneo di medicinali contenenti i principi attivi cloramfenicolo, salicilamide o fenobarbital.

Parli con il suo medico o il suo farmacista prima di assumere Pretuval influenza e raffreddore C se soffre di malattie gravi, tra cui un grave disturbo della funzionalità renale o sepsi (condizione in cui i batteri e le loro tossine circolano nel sangue e causano danni agli organi), se soffre di malnutrizione o di alcolismo cronico, o se assume anche flucloxacillina (un antibiotico). Nei pazienti in queste situazioni è stata segnalata una malattia grave, la cosiddetta acidosi metabolica (un disturbo del sangue e dell'equilibrio dei liquidi), che necessita di trattamento urgente. Si è verificata quando il paracetamolo è stato usato in quantità normali per un periodo prolungato o quando il paracetamolo è stato usato insieme alla flucloxacillina. I segni di acidosi metabolica possono includere gravi difficoltà respiratorie con respirazione rapida profonda, stordimento, nausea e vomito. Si raccomanda uno stretto monitoraggio medico per riconoscere l'insorgenza di acidosi metabolica.

Si sconsiglia l'assunzione contemporanea di Pretuval influenza e raffreddore C e bevande alcoliche. Il rischio di danno al fegato aumenta soprattutto se contemporaneamente non viene assunto cibo. Inoltre, durante il trattamento con Pretuval influenza e raffreddore C non si deve bere succo di pompelmo.

La posologia indicata o prescritta dal medico non deve essere superata. Per evitare il rischio di sovradosaggio, occorre assicurarsi che eventuali altri medicinali assunti contemporaneamente non contengano paracetamolo. Un sovradosaggio di paracetamolo può causare danni al fegato.

I pazienti anziani (sopra i 65 anni) possono essere molto sensibili a principi attivi come la pseudoefedrina.

Se soffre di malattie della tiroide o della prostata, di malattie cardiocircolatorie o di ipertensione o se assume certi tipi di medicinali (ad es. barbiturici, determinati antibiotici, medicinali contro l'ipertensione o l'insufficienza cardiaca, antidepressivi, determinati medicinali che contrastano l'acidità dello stomaco, antidolorifici o anticoagulanti), non deve assumere Pretuval influenza e raffreddore C senza aver consultato il medico. L'effetto di questi medicinali può risultare potenziato o limitato.

In determinati soggetti, ad es. nei pazienti affetti da una malattia del fegato o dei reni o in soggetti con predisposizione ereditaria (genetica), il principio attivo destrometorfano viene metabolizzato molto più lentamente dopo l'assunzione rispetto a quanto avviene in altre persone. Di conseguenza, non solo l'effetto antitussivo, ma anche gli effetti collaterali possono aumentare già dopo 3-4 giorni di trattamento. Il medico potrà fornirle ulteriori informazioni a riguardo.

Se gli effetti collaterali descritti nel capitolo «Quali effetti collaterali può avere Pretuval influenza e raffreddore C?» si manifestano con forte intensità, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere.

Questo medicinale contiene 75 mg di aspartame per compressa effervescente. Aspartame è una fonte di fenilalanina. Può esserle dannosa se è affetto da fenilchetonuria, una rara malattia genetica che causa l'accumulo di fenilalanina perché il corpo non riesce a smaltirla correttamente.

Questo medicinale contiene 2077,4 mg di sorbitolo per compressa effervescente. Sorbitolo è una fonte di fruttosio. Se il medico le ha detto che lei (o il bambino) è intollerante ad alcuni zuccheri, o se ha una diagnosi di intolleranza ereditaria al fruttosio, una rara malattia genetica per cui i pazienti non riescono a trasformare il fruttosio, parli con il suo medico prima che lei (o il bambino) prenda questo medicinale. Il



sorbitolo può causare problemi gastrointestinali e avere un lieve effetto lassativo.

Questo medicamento contiene 119,4 mg di sodio (componente principale del sale da cucina) per compressa effervescente. Questo equivale al 5,97% dell'assunzione massima giornaliera raccomandata con la dieta di un adulto.

Pretuval influenza e raffreddore C non è indicato per un'assunzione a lungo termine; se dopo un paio di giorni i sintomi del raffreddamento non si attenuano, è necessario rivolgersi al medico.

Questo medicamento può ridurre la capacità di reazione, la capacità di condurre un veicolo e la capacità di utilizzare attrezzi o macchine! Pertanto, usi prudenza nello svolgimento di queste attività. Questo vale soprattutto se contemporaneamente si consumano bevande alcoliche.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere nel caso in cui

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume altri medicamenti (anche se acquistati di sua iniziativa).

Si può assumere/usare Pretuval influenza e raffreddore C durante la gravidanza o l'allattamento?

Se è incinta, ha in programma una gravidanza o se allatta, per ragioni precauzionali deve evitare il più possibile di assumere medicamenti. Non è certo che Pretuval influenza e raffreddore C eserciti effetti negativi sullo sviluppo e sulla salute del nascituro. Per questo motivo deve usare questo medicamento durante la gravidanza solo se espressamente prescritto dal suo medico. Se assume Pretuval influenza e raffreddore C poco prima di portare a termine la gravidanza, possono insorgere difficoltà respiratorie nel neonato.

I principi attivi di Pretuval influenza e raffreddore C passano in piccole quantità nel latte materno. Se ne sconsiglia perciò l'uso durante l'allattamento.

Come usare Pretuval influenza e raffreddore C?

Pretuval influenza e raffreddore C è destinato unicamente agli adulti e agli adolescenti sopra i 12 anni.

Preparazione: sciogliere 1 compressa effervescente in circa 1,5 dl di acqua molto calda, ma non bollente, e bere la soluzione il più calda possibile.

Posologia: si può assumere 1 compressa effervescente di Pretuval influenza e raffreddore C ogni 6-8 ore, complessivamente non più di 4 volte nell'arco di una giornata.

In caso di sovradosaggio, nei bambini possono verificarsi eventi avversi gravi, inclusi disturbi neurologici.

La dose raccomandata non deve essere superata, poiché in caso di sovradosaggio possono presentarsi eventi avversi gravi, inclusi disturbi neurologici.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Se assume più compresse effervescenti di Pretuval influenza e raffreddore C del dovuto, possono svilupparsi i seguenti sintomi: nausea e vomito, contrazioni muscolari involontarie, agitazione, confusione, sonnolenza, disturbi della coscienza, movimenti oculari involontari e rapidi, accelerazione cardiaca, disturbi della coordinazione, psicosi con allucinazioni visive e ipereccitabilità.

Altri sintomi in caso di sovradosaggio massivo possono essere: coma, gravi problemi respiratori e convulsioni.

Si rivolga immediatamente al suo medico o all'ospedale se si verifica uno dei sintomi sopracitati.

Quali effetti collaterali può avere Pretuval influenza e raffreddore C?

Non comune: nausea, vomito, stitichezza, stanchezza, capogiro, bocca secca, agitazione, accelerazione del polso, mancanza di appetito, eruzione cutanea.



Raro: diarrea, reazioni di ipersensibilità, confusione, inibizione della respirazione. In singoli casi, allergia con sintomi generali gravi come ad es. costrizione bronchiale con disturbi respiratori e abbassamento della pressione arteriosa che richiedono un trattamento medico immediato.

Molto raro: alterazioni nelle analisi del sangue o reazioni cutanee gravi. Se si manifestano reazioni cutanee (gonfiore, arrossamento, formazione di vescicole, eventualmente anche delle/sulle mucose), interrompa immediatamente il trattamento e consulti un medico. Febbre a comparsa improvvisa, arrossamento della pelle o numerose piccole pustole (possibili segni di pustolosi esantematica acuta generalizzata – AGEP) possono verificarsi entro i primi 2 giorni di trattamento con Pretuval influenza e raffreddore C. Cfr. la rubrica «Quando è richiesta prudenza nella somministrazione di Pretuval influenza e raffreddore C?».

Frequenza non nota: riduzione del flusso sanguigno al nervo ottico (neuropatia ottica ischemica), infiammazione del colon dovuta ad un insufficiente apporto di sangue (colite ischemica), malattie gravi dei vasi sanguigni nel cervello note come sindrome da encefalopatia posteriore reversibile (PRES) e sindrome da vasocostrizione cerebrale reversibile (RCVS).

Se in passato ha avuto difficoltà a respirare o crisi asmatiche associate all'assunzione di aspirina o di altri antireumatici non steroidei (FANS), con Pretuval influenza e raffreddore C potrebbe presentarsi una reazione simile; ai primi segni, interrompa l'assunzione del medicamento e si rivolga immediatamente a un medico.

Effetti collaterali osservati dopo l'introduzione sul mercato con frequenza che non può essere determinata: Una malattia grave che può rendere il sangue acido (nota come acidosi metabolica) in pazienti con gravi malattie che fanno uso di paracetamolo (cfr. «Quando è richiesta prudenza nell'uso di Pretuval influenza e raffreddore C?»).

Gli effetti collaterali possono essere potenziati o manifestarsi più frequentemente se si assume il preparato in dosi elevate, per periodi prolungati oppure insieme a certi altri medicinali. In caso di sovradosaggio, cioè quando si assumono dosi più elevate rispetto a quelle raccomandate e/o si assume il medicamento a intervalli più ravvicinati rispetto a quanto raccomandato, i suddetti effetti collaterali vengono potenziati e aumentano i rischi descritti nella rubrica «Quando è richiesta prudenza nella somministrazione di Pretuval influenza e raffreddore C?».

Altri segni di sovradosaggio possono essere: sudorazione, palpitazioni, visione offuscata, eccitabilità e perdita di coscienza. Tuttavia, questi sintomi si manifestano dopo un periodo che va da diverse ore fino a un giorno dopo l'assunzione. Nei bambini, soprattutto nei bambini piccoli, il sovradosaggio può avere conseguenze gravi.

Qualora dovessero manifestarsi i sintomi di un sovradosaggio, interrompa immediatamente l'assunzione di Pretuval influenza e raffreddore C e si rivolga a un medico.

A seguito dell'assunzione di Pretuval influenza e raffreddore C possono verificarsi sintomi di stanchezza. Pertanto non si devono utilizzare macchine né guidare veicoli.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Istruzioni di conservazione

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Tenere ben chiuso il contenitore.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Indicazioni per lo smaltimento

Non gettare i medicinali nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. I medicinali scaduti o non più necessari, in uso nelle economie domestiche, possono essere consegnati nelle farmacie o nei punti di raccolta. Queste misure aiutano a proteggere l'ambiente.



Ulteriori indicazioni

Il medico, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Pretuval influenza e raffreddore C?

Principi attivi

1 compressa effervescente contiene 20 mg di destrometorfano bromidrato (corrispondente a 14,66 mg di destrometorfano), 30 mg di pseudoefedrina cloridrato, 300 mg di paracetamolo, 250 mg di acido ascorbico (vitamina C) come calcio ascorbato.

Sostanze ausiliarie

1 compressa effervescente contiene aspartame (E 951), sorbitolo (E 420), mannitolo (E 421), acido fumarico (E 297), aroma di limone, sodio bicarbonato (E 500), sodio cloruro, povidone (E 1201), maltodestrina.

Numero dell'omologazione

48340 (Swissmedic).

Dove è ottenibile Pretuval influenza e raffreddore C? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezioni da 10 e 20 compresse effervescenti.

Titolare dell'omologazione

Bayer (Schweiz) AG, 8045 Zurigo.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nell'ottobre 2025 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

