

## **Informazione destinata ai pazienti**

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni. Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico o del suo farmacista. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

## **Regenaplex Nr. 59b Gocce**

*Medicamento omeopatico*

### **Quando si usa Regenaplex Nr. 59b?**

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici, Regenaplex Nr. 59b può essere usato in caso di fissurazioni anali.

### **Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?**

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere Regenaplex Nr. 59b.

### **Quando non si può usare Regenaplex Nr. 59b e quando il suo uso richiede prudenza?**

Se è presente una perdita molto marcata di sangue nelle feci, ostinata presenza dei disturbi per più di 14 giorni e comparsa di manifestazioni patologiche insolite o nuove, bisogna rivolgersi al medico, per escludere la possibilità di altre cause della malattia. Se non vengono curati, i disturbi gravi possono avere conseguenze serie.

### **Si può assumere Regenaplex Nr. 59b durante la gravidanza o l'allattamento?**

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico o farmacista.

### **Come usare Regenaplex Nr. 59b?**

Se il medico non ha prescritto diversamente:

Adulti: 8 - 10 gocce, 1 - 2 volte al giorno.

Istruzioni per l'assunzione: Versare le gocce direttamente sulla lingua o diluire con un po' d'acqua. Trattenere le gocce in bocca almeno per un minuto, prima di deglutirle. Non mangiare né bere nulla 15 minuti prima e 15 minuti dopo l'assunzione del medicamento.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

### **Quali effetti collaterali può avere Regenaplex Nr. 59b?**

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto di Regenaplex Nr. 59b. Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista. Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con Regenaplex Nr. 59b e informi il suo medico o il suo farmacista.

### **Di che altro occorre tener conto?**

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Conservare le gocce a temperatura ambiente (15 - 25 °C).

Le gocce contengono alcool 50% vol.

Il medico o il farmacista possono darle ulteriori informazioni.



**Cosa contiene Regenaplex Nr. 59b?**

10,0 ml contiene volta 1,00 ml: Achillea millefolium D 2, Acidum nitricum D 6, Aesculus hippocastanum D 2, Aloe D 6, Carbo vegetabilis D 12, Cinchona pubescens D 12, Hamamelis virginiana D 3, Hydrastis canadensis D 8, Kreosotum D 8, Strychnos nux-vomica D 4.

Le gocce contengono alcool 50% vol.

**Numero dell'omologazione**

36863 01 013

**Dove è ottenibile Regenaplex Nr. 59b? Quali confezioni sono disponibili?**

In farmacia, senza prescrizione medica.

Confezioni: 15 ml

**Titolare dell'omologazione**

REGENA AG, Tägerwilen

**Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel novembre 2011 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).**

