

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Similasan Réactions allergiques des yeux N, gouttes pour les yeux, monodoses

Médicament homéopathique

Quand Similasan Réactions allergiques des yeux N est-il utilisé ?

Selon la conception homéopathique, Similasan Réactions allergiques des yeux N peut être utilisé localement en cas de réactions allergiques (p. ex. rhume des foins) des muqueuses oculaires et des paupières avec des symptômes tels que démangeaisons et brûlures, rougeurs, enfléments.

L'utilisation de ce médicament dans le champ d'applications indiqué est basée exclusivement sur les principes de l'homéopathie.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement ?

En cas d'inflammation des yeux, le port de lentilles de contact n'est pas recommandé. Toutefois, si vous ne pouvez pas vous en passer, retirez-les avant de mettre les gouttes et replacez vos lentilles de contact au plus tôt 15 minutes après le traitement. L'utilisation est également conseillée le soir, après le retrait des lentilles, avant d'aller se coucher et le matin au réveil, au moins 15 minutes avant de les remettre. Veuillez noter qu'un œil enflammé réagira de manière plus sensible aux lentilles. Si aucune amélioration n'intervient après 2 à 3 jours, il est recommandé de consulter un médecin. En cas d'aggravation ou si de nouveaux symptômes apparaissent, p. ex. baisse de l'acuité visuelle, il convient de consulter immédiatement un médecin.

Colore les lentilles de contact.

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si Similasan Réactions allergiques des yeux N peut être utilisé simultanément.

Quand Similasan Réactions allergiques des yeux N ne doit-il pas être utilisé ou seulement avec précaution ?

Ne doit être administré aux enfants de moins de 2 ans que sur prescription médicale.

En cas d'opacification du cristallin (cataracte) ou de glaucome, utiliser uniquement après diagnostic médical.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments (ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage externe) (même en automédication !).

Comment utiliser Similasan Réactions allergiques des yeux N ?

Sauf prescription contraire du médecin :



Adultes, adolescents et enfants à partir de 2 ans : 1 goutte par œil une à plusieurs fois par jour, au maximum 1 goutte par œil 10 fois par jour.

Ne doit être administré aux enfants de moins de 2 ans que sur prescription médicale.

Utilisation :

- Détachez une dosette contenant les gouttes pour les yeux et secouez-la pour déplacer le liquide vers la pointe en forme de boule. Tordre la partie plate avec la pointe arrondie pour la détacher de la monodose.
- Tenir la monodose entre le pouce et l'index avec la pointe tournée vers le bas juste au-dessus de l'œil ouvert ; presser pour verser le liquide goutte à goutte dans l'œil.
- Utiliser une nouvelle monodose à chaque application (ne se conserve pas, car ne contient pas de conservateur).

Le temps d'action d'un médicament peut varier d'une personne à l'autre. En règle générale, l'administration du médicament doit être répétée lorsque l'effet diminue ou lorsque les troubles reviennent.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. En l'absence de l'amélioration escomptée lors d'un traitement chez le petit enfant / l'enfant, veuillez consulter un médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin ou à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires Similasan Réactions allergiques des yeux N peut-il provoquer ?

Des cas isolés de réactions d'hypersensibilité telles que brûlures, irritations, rougeurs et démangeaisons ont été observés avec Similasan Réactions allergiques des yeux N.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec Similasan Réactions allergiques des yeux N et informez-en votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

À quoi faut-il encore faire attention ?

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention <EXP> sur le récipient.

Délai d'utilisation après ouverture

Utiliser aussitôt les monodoses ouvertes et les jeter après application (le liquide ne se conserve pas, car il ne contient pas d'agent conservateur).

Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15-25°C).

Conserver hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.



Que contient Similasan Réactions allergiques des yeux N ?

1 ml de liquide contient :

Principes actifs

Apis mellifica (HAB) D6 0.3033 ml / Euphrasia 3c (HAB) D6 0.3033 ml/ Schoenocaulon officinale (HAB) D6 0.3033 ml

Excipients

Citrate trisodique ; chlorure de sodium ; acide chlorhydrique ; eau pour préparations injectables

Numéro d'autorisation

67484

Où obtenez-vous Similasan Réactions allergiques des yeux N ? Quels sont les emballages à disposition sur le marché ?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

- Emballage de 20 monodoses de 0,40 ml

Titulaire de l'autorisation

T&S Eye Care Management AG, CH-6060 Sarnen

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en novembre 2021 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

