

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico o del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Similasan Reazioni allergiche degli occhi N, Augentropfen Monodosen

Medicamento omeopatico

Quando si usa Similasan Reazioni allergiche degli occhi N ?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici Similasan Reazioni allergiche degli occhi N può essere usato localmente in caso di reazioni allergiche (ad es. in caso di raffreddore da fieno) delle mucose oculari e delle palpebre con sintomi come: prurito e bruciore, arrossamento, gonfiore.

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa esclusivamente sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

In caso di infiammazioni agli occhi, è sconsigliato portare lenti a contatto. Se tuttavia sceglie di indossare lenti a contatto, le rimuova prima di instillare le gocce per gli occhi e le indossi nuovamente almeno 15 minuti dopo il trattamento. Si consiglia altresì di attendere almeno 15 minuti per l'applicazione delle gocce per gli occhi dopo aver rimosso le lenti, la sera prima di andare a letto e la mattina al risveglio. Ricordi che un occhio infiammato reagisce più sensibilmente alle lenti a contatto. Se dopo 2-3 giorni non si nota un miglioramento, si rivolga a un medico. In caso di peggioramento o di comparsa di nuovi sintomi, ad es. riduzione dell'acuità visiva, si rivolga immediatamente a un medico.

Altera il colore delle lenti a contatto.

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere Similasan Reazioni allergiche degli occhi N.

Quando non si può usare Similasan Reazioni allergiche degli occhi N e quando la sua somministrazione/il suo uso richiede prudenza?

Può essere somministrato ai bambini piccolo sotto i 2 anni solo su prescrizione medica.

In caso di opacizzazione del cristallino (cataratta) o glaucoma applicare solo dopo diagnosi medica.

Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa) o li applica esternamente

Come usare Similasan Reazioni allergiche degli occhi N?

Se non diversamente prescritto dal medico:

Adulti, adolescenti e bambini dai 2 anni: 1 goccia per occhio, da una a più volte al giorno, massimo 1 goccia per occhio 10 volte al giorno.

Può essere somministrato ai bebè e bambini sotto i 2 anni solo su prescrizione medica.



Utilizzo:

- staccare un contenitore monodose e agitarlo per far scendere il liquido nella punta arrotondata. Staccare la parte piatta dalla punta arrotondata con un movimento rotatorio.
- Tenere il contenitore monodose con il dito indice e il pollice, con la punta rivolta verso il basso sopra l'occhio aperto, premere e instillare le gocce nell'occhio.
- A ogni utilizzo, usare un nuovo contenitore monodose di gocce per gli occhi (non si conserva, poiché privo di conservanti).

L'efficacia della somministrazione può variare individualmente. In generale, ripetere la somministrazione del preparato quando si percepisce un calo dell'efficacia o il ritorno dei disturbi.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se il trattamento di un bambino piccolo/di un bambino, non produce il miglioramento auspicato, consulti un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Similasan Reazioni allergiche degli occhi N?

Con Similasan Reazioni allergiche degli occhi N, in casi sporadici sono state osservate reazioni di ipersensibilità come bruciore, irritazione, arrossamento e prurito agli occhi.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con Similasan Reazioni allergiche degli occhi N e informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.*

Termine di consumo dopo l'apertura

Dopo l'apertura, utilizzare immediatamente il contenitore monodose e poi smaltirlo dopo l'uso (non si conserva, poiché privo di conservanti).

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Similasan Reazioni allergiche degli occhi N?

1 ml di liquido contiene:

Principi attivi

Apis mellifica (HAB) D6 0.3033 ml / Euphrasia 3c (HAB) D6 0.3033 ml/ Schoenocaulon officinale (HAB) D6 0.3033 ml



Sostanze ausiliarie

Citrato di trisodio; cloruro di sodio; acido cloridrico; acqua per preparazioni iniettabili.

Numero dell'omologazione

67484

Dove è ottenibile Similasan Reazioni allergiche degli occhi N? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

- Confezione con 20 monodose da 0,40 ml

Titolare dell'omologazione

T&S Eye Care Management AG, CH-6060 Sarnen

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel novembre 2021 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

