

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Tyroqualine®

Spirig HealthCare AG

Qu'est-ce que Tyroqualine et quand doit-il être utilisé?

Tyroqualine est une association médicamenteuse destinée à lutter contre les infections de la cavité bucco-pharyngée. Il peut détruire rapidement aussi bien les bactéries que les champignons et il atténue les douleurs et les problèmes de déglutition. Tyroqualine s'utilise dans le traitement d'infections de la cavité bucco-pharyngée, infections à champignons y compris. Il peut être utilisé à titre préventif après opération des amygdales ou intervention de chirurgie dentaire.

Quand Tyroqualine ne doit-il pas être utilisé?

Si vous avez remarqué des symptômes de réaction allergique lors d'une utilisation précédente de Tyroqualine ou de l'un de ses constituants, vous ne devez pas utiliser Tyroqualine.

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Tyroqualine?

Il ne faut pas prendre Tyroqualine si vous présentez encore des lésions hémorragiques au niveau de la bouche.

En cas de fièvre élevée ou si dans le délai d'une semaine aucune amélioration n'est apparue, veuillez consulter un médecin.

L'utilisation et la sécurité d'emploi de Tyroqualine, pastilles à sucer n'ont pas à ce jour été étudiées chez l'enfant et l'adolescent.

Tyroqualine, pastilles à sucer contiennent du lactose. Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ce médicament contient moins de 1 mmol (23 mg) de sodium par pastille à sucer, c.-à-d. qu'il est essentiellement « sans sodium ».

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments (ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage externe) (même en automédication!).

Tyroqualine peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

Si vous êtes enceinte ou que vous prévoyez une grossesse, de même que si vous allaitez, il est plus prudent de renoncer dans la mesure du possible à tout médicament. Ne prenez Tyroqualine qu'après avoir obtenu l'accord de votre médecin.

Comment utiliser Tyroqualine?

Adultes

Laisser fondre lentement une pastille à sucer dans la bouche toutes les heures. Après amélioration des symptômes, ou à titre préventif, sucer une pastille à sucer toute les 4 à 5 heures. Maximum 8 pastilles à sucer par jour.



Enfants et adolescents

L'utilisation et la sécurité d'emploi de Tyroqualine, pastilles à sucer n'ont pas à ce jour été étudiées chez l'enfant et l'adolescent.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin ou à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires Tyroqualine peut-il provoquer?

La prise de Tyroqualine peut provoquer les effets secondaires suivants:

Fréquence inconnue (ne peut être estimée sur la base des données disponibles)

Des réactions allergiques telles que rougeur, démangeaisons ou difficultés respiratoires peuvent se manifester après l'utilisation de Tyroqualine. Dans ce cas, il faut interrompre la prise de la préparation. S'il est utilisé sur des lésions fraîches, Tyroqualine peut entraîner des saignements.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention?

Stabilité

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Conserver Tyroqualine, pastilles à sucer à température ambiante (15-25°C) dans l'emballage original et hors de la portée des enfants.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Tyroqualine?

Principes actifs

1 pastille à sucer de Tyroqualine contient 0,15 mg de chlorure de déqualinium 0,15 mg, 1 mg de tyrothricine 1 mg et 1 mg de chlorhydrate de lidocaïne monohydraté.

Excipients

Lactose, povidone K30, cyclamate de sodium, arôme de menthe poivrée, dibéhénate de glycérol.

Numéro d'autorisation

34096 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Tyroqualine? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Emballages de 36 pastilles à sucer.

Titulaire de l'autorisation

Spirig HealthCare SA, 4622 Egerkingen

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en en novembre 2024 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

