

Informazione destinata ai pazienti

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico, del suo farmacista o del suo droghiere.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

LIPACTIN®

Che cos'è Lipactin e quando si usa?

Lipactin è indicato per il trattamento delle vescicole febbrili, in particolare delle labbra (herpes labialis) e delle zone cutanee circostanti. Allevia il dolore e accelera la guarigione delle vescicole.

Quando non si può assumere/usare Lipactin?

Non utilizzare in caso di cosiddetta trombocitopenia nota associata a/indotta da eparina (una condizione in cui la somministrazione di eparina, un agente che inibisce la coagulazione del sangue, produce una riduzione del numero delle piastrine).

Lipactin non deve essere usato in caso di ipersensibilità nota a uno qualsiasi dei principi attivi o delle sostanze ausiliarie.

Quando è richiesta prudenza nell'uso di Lipactin?

Lipactin è destinato esclusivamente all'uso esterno sulla pelle. Evitare il contatto con gli occhi. I componenti di Lipactin possono causare reazioni da ipersensibilità locali.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

soffre di altre malattie

soffre di allergie o

assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa) o li applica esternamente.

Si può usare Lipactin durante la gravidanza o l'allattamento?

Non sono stati effettuati studi scientifici sistematici. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico, farmacista o droghiere.

Come usare Lipactin?

Adulti e adolescenti dai 12 anni:

Applicare un sottile strato di Lipactin sulle zone cutanee interessate da 3 a 6 volte al giorno. Il trattamento deve iniziare quanto prima, appena si notano formicolio, sensazione di tensione e dolore sulle labbra o sulle zone cutanee circostanti.

Continui il trattamento ancora per alcuni giorni dopo la scomparsa dei sintomi.

La durata massima del trattamento non deve superare i 7-10 giorni. Se la condizione peggiora o se le vescicole labiali non guariscono, occorre consultare il medico.

Bambini sotto i 12 anni:



L'uso e la sicurezza di Lipactin nei bambini sotto i 12 anni finora non sono stati esaminati. Pertanto, i bambini di età inferiore a 12 anni non devono essere trattati con Lipactin.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Lipactin?

Con l'uso di Lipactin possono verificarsi i seguenti effetti collaterali:

Raro (riguarda da 1 a 10 persone su 10 000)

Dopo l'applicazione di Lipactin può comparire una temporanea sensazione di bruciore.

Molto raro (riguarda meno di 1 persona su 10 000)

Possono manifestarsi reazioni da ipersensibilità nella zona cutanea trattata. In questi casi, occorre interrompere l'uso del medicamento e contattare il medico, il farmacista o il droghiere.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Istruzioni di conservazione

Conservare a temperatura ambiente (15-25°C) e fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Lipactin?

1 g di gel contiene:

Principi attivi

5 mg di zinco solfato eptaidrato, 175 U.I. Eparina sodica.

Sostanze ausiliarie

Fenossietanolo, glicerolo, polisorbato 60, polisorbato 80, carmellosa sodica, acqua depurata.

Numero dell'omologazione

47'167 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Lipactin? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Tubi da 5 g.



Titolare dell'omologazione

Louis Widmer AG
8952 Schlieren

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel gennaio 2023 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

