

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di fare uso del medicamento. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

TRUSOPT®

Santen SA

Che cos'è Trusopt e quando si usa?

Trusopt contiene come principio attivo un cosiddetto inibitore della carboanidrase, il quale diminuisce la pressione intraoculare. Le gocce oftalmiche Trusopt vengono utilizzate su prescrizione medica in caso di elevata pressione intraoculare e in caso di diverse forme di glaucoma, come per es. nel glaucoma ad angolo aperto.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Una pressione intraoculare troppo elevata può danneggiare il nervo ottico e quindi, di conseguenza, può causare il peggioramento della capacità visiva ed eventualmente alla perdita della vista. In generale esistono pochi sintomi che possono indicare la presenza di una pressione intraoculare alta. Per stabilirlo è necessaria una visita dal suo medico. Se compare una pressione intraoculare elevata, sono necessarie visite e misurazioni periodiche della pressione intraoculare presso il suo medico.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico per il trattamento del suo attuale disturbo agli occhi. Non lo utilizzi di propria iniziativa per il trattamento di altre malattie, e non lo consegni ad altre persone.

Quando non si può usare Trusopt?

Non utilizzi Trusopt se è allergico ad uno dei componenti o alle sulfonamidi.

Se non è certo di poter utilizzare Trusopt, si metta in contatto con il suo medico o con il suo farmacista.

Quando è richiesta prudenza nell'uso di Trusopt?

Consulti immediatamente il suo medico nel caso in cui compaiono dei disturbi oppure nuovi problemi agli occhi, come per es. arrossamento dell'occhio oppure edema della palpebra o lampi e ombre scure.

Se sospetta che Trusopt possa aver causato una reazione allergica (per es. eruzione cutanea o prurito), interrompa immediatamente la somministrazione e prenda contatto con il suo medico.

Informi il suo medico se soffre o ha sofferto in passato di problemi renali o epatici. L'uso di Trusopt non è quindi consigliato.

Comunichi al suo medico o suo farmacista tutti i medicinali (incluse gocce oftalmiche) di cui fa uso o che pensa di utilizzare, anche quelli ottenibili senza ricetta, in particolare un altro inibitore dell'anidrase carbonica come la acetazolamide o l'aspirina a dosi elevate o i medicinali contenenti di sulfamidici. Per maggiori informazioni, rivolgersi al medico o farmacista.

Uso nei bambini

Trusopt è stato studiato nei bambini con età inferiore a 6 anni che soffrono di un aumento della pressione intraoculare o di glaucoma. Per maggiori informazioni, rivolgersi al medico o farmacista.

Uso nei pazienti anziani

Negli studi con Trusopt è stato dimostrato che l'efficacia di Trusopt nei pazienti anziani e in quelli giovani è simile.

Indicazione per portatori di lenti a contatto



Trusopt contiene benzalconio cloruro. Benzalconio cloruro può essere assorbito dalle lenti a contatto morbide e può portare al cambiamento del loro colore. . Tolga le lenti a contatto prima di usare questo medicamento e aspetti 15 minuti prima di riapplicarle.

Benzalconio cloruro può anche causare irritazione agli occhi specialmente se ha l'occhio secco o disturbi alla cornea (lo strato trasparente più superficiale dell'occhio). Se prova una sensazione anomala all'occhio, di bruciore o dolore dopo aver usato questo medicinale, parli con il medico.

Determinati effetti collaterali legati all'utilizzo di Trusopt, ad esempio capogiro e vista offuscata che possono influire sulla capacità di condurre veicoli o utilizzare macchinari. Deve evitare di guidare o usare macchinari fino a che non si sente bene o la sua vista sia non offuscata. (cfr. «Quali effetti collaterali può avere Trusopt?»).

Informi il suo medico o farmacista, nel caso in cui

- soffre di altre malattie inclusi problemi oculari ed interventi chirurgici sull'occhio,
- soffre di allergie o
- assume o li applica esternamente o applica all'occhio altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa).

Si può usare Trusopt durante la gravidanza o l'allattamento?

Non usi Trusopt se è incinta o desidera iniziare una gravidanza a meno che il suo medico non lo consideri necessario. Il suo medico deciderà se può fare uso di Trusopt.

Informi il suo medico se allatta o desidera allattare. Il suo medico deciderà se può fare uso di Trusopt.

Come usare Trusopt?

Il suo medico stabilirà il giusto dosaggio e la durata del trattamento.

Se Trusopt viene utilizzato da solo, la dose è di una goccia in ciascun occhio ammalato mattina, mezzogiorno e sera.

Se il suo medico, per diminuire la pressione intraoculare, le ha consigliato di abbinare a Trusopt delle gocce oftalmiche betabloccanti, la dose sarà di una goccia in ciascun occhio ammalato mattina e sera.

Se utilizza Trusopt contemporaneamente ad altre gocce oftalmiche, le differenti gocce devono essere instillate a distanza di almeno 10 minuti.

Se dovesse interrompere il trattamento in seguito al manifestarsi di qualche disturbo, consulti immediatamente il suo medico.

Eviti che il contagocce del flacone venga a contatto con l'occhio o le sue zone circostanti. Essa può andare incontro a contaminazione batterica la quale può causare infezioni dell'occhio che possono indurre seri danni dell'occhio, anche perdita della vista. Per evitare una possibile contaminazione batterica del flacone contagocce, il contagocce del flacone non deve venire a contatto con alcuna superficie. Qualora si pensi che il medicinale possa essere contaminato o qualora si sviluppi un'infezione a livello oculare, si deve contattare immediatamente il medico prima di continuare ad usare il medicinale.

Istruzioni per l'uso

Non utilizzare se la fascetta di sicurezza in plastica intorno al collo del flacone è mancante o rotta. Quando si apre il flacone per la prima volta, strappare la fascetta di sicurezza in plastica.

Ogni volta che usa Trusopt:

1. Si lavi le mani.
2. Apra il flacone. Faccia particolare attenzione che la punta del flacone contagocce non tocchi l'occhio, la pelle intorno all'occhio o le sue dita.
- 3.



Inclini la testa all'indietro e tenga il flacone capovolto sopra l'occhio.



4. Tiri la palpebra inferiore verso il basso e guardi in alto. Prema delicatamente il flacone e lasci cadere una goccia nello spazio tra la palpebra inferiore e l'occhio.



5. Chiuda l'occhio e prema con il dito l'angolo interno dell'occhio per circa due minuti. Questo aiuta a impedire che il medicinale passi nel resto del corpo.



6. Ripeta le istruzioni da 3 a 5 con l'altro occhio se le è stato prescritto dal medico.

7. Rimetta il tappo e chiuda ermeticamente il flacone.

Se ha instillato troppe gocce nell'occhio o ha ingerito un po' del contenuto del flacone, prenda immediatamente contatto con il suo medico.

È importante che lei utilizzi Trusopt seguendo la prescrizione del medico.

Se per una volta dimentica una dose, la recuperi il più presto possibile. Se però è già l'ora della dose successiva, tralasci la dose dimenticata e continui con il normale schema di somministrazione.

Non prendere una doppia dose per compensare la dimenticanza della dose.

Se interrompe il trattamento con Trusopt: Nel caso voglia interrompere il trattamento ne parli prima con il medico.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte, ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali può avere Trusopt?

I principi attivi contenuti nelle gocce oftalmiche possono raggiungere la circolazione sanguigna. Gli effetti collaterali possono quindi manifestarsi, oltre che all'occhio, anche in altre parti del corpo.

Se compare uno di questi sintomi di una reazione allergica, includono orticaria, gonfiore di viso, labbra, lingua e/o gola, questo può causare difficoltà di deglutizione e di respirazione, sospenda immediatamente l'uso del medicamento e avverta il suo medico.

Raramente si manifestano anche altri effetti collaterali diversi da quelli summenzionati, alcuni dei quali possono essere gravi. Per ulteriori delucidazioni concernenti questi effetti collaterali, si rivolga al suo medico o al suo farmacista.



Ogni medicamento può causare effetti indesiderati o imprevisti, i cosiddetti effetti collaterali.

Durante l'uso di Trusopt possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali.

Molto comune (riguarda più di 1 persona su 10)

Sintomi agli occhi, come bruciore, dolore puntorio agli occhi.

Comune (riguarda da 1 a 10 persone su 100)

Vista annebbiata, prurito, lacrimazione, irritazione/infiemmazione della palpebra, infiammazioni dell'occhio (infiammazione della congiuntiva, della cornea), mal di testa, nausea, debolezza, stanchezza. È possibile che dopo l'applicazione delle gocce, percepisca un sapore amaro.

Non comune (riguarda da 1 a 10 persone su 1000)

Infiammazione dell'iride.

Raro (riguarda da 1 a 10 persone su 10 000)

Irritazioni dell'occhio inclusi arrossamento dell'occhio, dolore agli occhi oppure edema o incrostazioni della palpebra, distacco della corioide dopo chirurgia filtrante, temporaneamente può manifestarsi una miopia (che può risolversi con l'interruzione del trattamento), sangue dal naso secchezza della bocca, eruzioni cutanee localizzate (dermatite da contatto), vertigini, formicolio, o sensazione di intorpidimento, calcoli renali e reazioni allergiche come edemi allergici della pelle e delle mucose, eruzione cutanea, orticaria, prurito cutaneo, altre gravi reazioni cutanee e respiro corto raramente respiro affannoso. È possibile che dopo l'applicazione delle gocce, si manifesti un'irritazione alla gola.

Frequenza non nota (non può essere definita sulla base dei dati disponibili)

Sensazione di corpo estraneo nell'occhio (sensazione che ci sia qualcosa nell'occhio), battito cardiaco forte che può essere rapido o irregolare (palpitazioni), aumento della frequenza cardiaca, aumento della pressione arteriosa, sensibilità anormale degli occhi alla luce.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico o al suo farmacista, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Scadenza

Il medicamento non deve essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Termine di consumo dopo l'apertura

Termine di consumo dopo l'apertura: max 4 settimane.

Per evitare una possibile contaminazione batterica delle gocce, il contagocce del flacone non deve venire a contatto né con le mani né con gli occhi. Chiuda bene il flacone subito dopo l'uso e lo conservi sempre ben chiuso.

Indicazioni per la conservazione

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Conservare al riparo dalla luce e a temperatura ambiente (15-25°C). Tenere ben chiuso il contenitore.

Ulteriori indicazioni

Trascorse 4 settimane riporti il contenuto restante al suo venditore (medico o farmacista) perché venga smaltito in modo corretto. Non gettare i medicinali nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. I medicinali scaduti o non più necessari, in uso nelle economie domestiche, possono essere consegnati nelle farmacie o nei punti di raccolta. Queste misure aiutano a proteggere l'ambiente.



Il medico e il farmacista, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Trusopt?

Trusopt collirio, soluzione in contenitore multidose, (soluzione limpida, da incolore a quasi incolore, leggermente viscosa).

1 ml di Trusopt gocce oftalmiche contiene:

Principi attivi

20 mg di dorzolamide (sotto forma di 22,26 mg dorzolamide cloridrato)

Sostanze ausiliarie

Sodio citrato (E331), Idrossietilcellulosa, sodio idrossido (E524), mannitolo (E421), acqua per preparazioni iniettabili, benzalconio cloruro

Numero dell'omologazione

52969 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Trusopt? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia dietro presentazione della prescrizione medica.

Un flacone bianco traslucido in polietilene a bassa densità (LDPE) con punta contagocce trasparente e un tappo bianco.

Il sigillo di protezione è costituito da una fascetta sull'etichetta del flacone.

Disponibile nelle seguenti confezioni:

1 flacone da 5 ml.

3 flaconi da 5 ml.

Titolare dell'omologazione

Santen SA, Ginevra

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel giugno 2026 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

