

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico o del suo farmacista o del suo droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Laxasan® gocce orali, soluzione

Che cos'è il Laxasan e quando si usa?

Il Laxasan è un lassativo a base di sodio picosolfato, principio attivo dotato di un effetto stimolante sull'attività dell'intestino crasso. Il Laxasan si usa per la terapia della stitichezza occasionale (per esempio nel caso della conversione dell'alimento, con cambiamento locale o con pace della base).

Il preparato si può prendere solo occasionalmente e per non più di 1–2 settimane. Le terapie a lunga scadenza richiedono il controllo del medico.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se soffre di stitichezza mangi alimenti ricchi di fibre (verdura, frutta, pane integrale), beva molto e regolarmente e abbia cura di svolgere attività fisica (sport)!

Consigli per diabetici e donne diabetiche. Una dose giornaliera di 28 gocce corrisponde a 0,1 equivalenti pane. Il farmaco è adatto ai diabetici.

Quando non si può usare il Laxasan?

Non usare in caso di occlusione intestinale, di processi infiammatori nella cavità addominale, di crampi, di coliche e per bambini sotto i 4 anni. In caso di ipersensibilità al principio attivo o a uno degli eccipienti secondo la composizione.

Quando è richiesta prudenza nell'uso di Laxasan?

Come tutti i lassativi, anche il Laxasan non va preso a lunga scadenza. Prima di prendere il Laxasan, i pazienti che soffrono di malattie gravi devono chiedere consiglio al medico.

Sodio

Questo medicamento contiene meno di 1 mmol (23 mg) di sodio per ml, cioè è essenzialmente "senza sodio".

Metilidrossi benzoato

Laxasan gocce contiene metilidrossi benzoato (E 218). Il metilidrossi benzoato (E 218) può causare reazioni allergiche (anche ritardate).

Olio di ricino poliossidrato idrogenato

Laxasan gocce contiene olio di ricino poliossidrato idrogenato. L'olio di ricino poliossidrato idrogenato può causare disturbi gastrici e diarrea.

Informi il Suo medico, il farmacista o il droghiere se



- soffre di altre malattie,
- è affetto da allergie, oppure
- assume o applica esternamente altri farmaci (anche non prescritti!)

Si può usare il Laxasan durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle attuali conoscenze non esiste alcun rischio per il bambino in caso di impiego appropriato del prodotto. Non sono però mai stati condotti studi scientifici sistematici. Per prudenza è preferibile evitare qualunque utilizzo di farmaci durante la gravidanza o l'allattamento, oppure chiedere consiglio al proprio medico o farmacista.

Come usare il Laxasan?

In generale, salvo diversa prescrizione:

Adulti: 14–28 gocce.

Bambini e adolescenti

Adolescenti da 12 a 18 anni: 7–14 gocce.

Bambini da 4 a 12 anni: solamente su prescrizione del medico.

Bambini sotto i 4 anni: l'uso e la sicurezza di Laxasan nei bambini sotto i 4 anni finora non sono stati esaminati.

Prendere le gocce con o senz'acqua. L'effetto può iniziare da 4 a 6 ore dopo la somministrazione. Preso alla sera, dato che la durata del transito intestinale è maggiore agisce solo la mattina dopo.

Se dopo la prima somministrazione le feci sono troppo molli o troppo dure, nelle somministrazioni successive la dose va diminuita o aumentata di 2–3 gocce per volta fino a trovare la dose ottimale.

Attenzione: Per dosare esattamente, quando si contano le gocce il flaconcino va tenuto in posizione verticale.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal Suo medico. Se ha l'impressione che l'azione del farmaco sia insufficiente o eccessiva, ne parli con il Suo medico, farmacista o droghiere.

Quali effetti collaterali può avere il Laxasan?

Durante l'assunzione del Laxasan possono comparire i seguenti effetti collaterali: Se la dose è troppo alta possono manifestarsi delle coliche con feci liquide.

Raro (riguarda da 1 a 10 persone su 10 000) il preparato può causare meteorismo o crampi addominali. A dosi elevate, in caso di uso prolungato o troppo frequente può manifestarsi diarrea con perdita d'acqua e perturbazioni del bilancio delle sostanze minerali (tra l'altro perdita di potassio).

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Termine di consumo dopo l'apertura

Dopo aver aperto il flaconcino per la prima volta, si possono utilizzare per non più di 12 mesi.



Istruzioni di conservazione

Conservare il Laxasan a temperatura ambiente (15–25°C).

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darne ulteriori informazioni.

Cosa contiene il Laxasan?

Principi attivi

Gocce orali, soluzione: 1 ml (= 21 gocce) contiene 7,5 mg di sodio picosolfato (come sodio picosolfato monoidrato).

Sostanze ausiliarie

Olio essenziale di menta piperita, olio essenziale di finocchio, metilidrossi benzoato (E 218), olio di ricino poliossidato idrogenato, glicerolo, acqua depurata.

Numero dell'omologazione

49798 (Swissmedic)

Dove è ottenibile il Laxasan? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e drogheria, senza ricetta medica.

Confezioni da 20 ml [D]

Titolare dell'omologazione

Gebro Pharma AG, 4410 Liestal.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel dicembre 2021 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

