

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Bepanthen® MED Plus

Bayer (Schweiz) AG

Qu'est-ce que Bepanthen MED Plus et quand doit-il être utilisé?

Bepanthen MED Plus est une préparation désinfectante et cicatrisante. En cas de plaies superficielles, il prévient les infections et favorise la cicatrisation.

Bepanthen MED Plus est disponible en crème et en spray.

Bepanthen MED Plus a pour principe actif la chlorhexidine, qui lutte contre les bactéries présentes sur la peau ou ayant pénétré dans une plaie souillée. Cela permet de prévenir ou de réduire l'infection de la plaie.

Bepanthen MED Plus contient également un autre principe actif, le dexpanthénol. Dans la peau, ce principe actif se transforme en acide pantothénique, vitamine qui favorise le développement et la régénération des cellules cutanées de l'intérieur. La formation d'un nouveau tissu cutané est accélérée, et la plaie cicatrise plus rapidement. En outre, l'élasticité du tissu nouvellement formé est accrue.

Bepanthen MED Plus apaise la douleur grâce à son effet rafraîchissant. La crème est facile à appliquer et à éliminer; elle n'est pas grasse et ne colle pas. Le spray peut être pulvérisé sans toucher la plaie et n'entraîne quasiment pas de sensation de brûlure.

Bepanthen MED Plus s'utilise pour

- les petites plaies de toutes natures avec risque d'infection, telles que: écorchures, coupures, égratignures, crevasses, brûlures légères, intertrigo;
- les inflammations de la peau infectées;
- le traitement des inflammations du mamelon en période d'allaitement;
- les plaies chroniques comme les ulcères de jambe, les escarres (plaies de décubitus) et les plaies chirurgicales, uniquement sur ordonnance.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Les plaies étendues, très souillées et profondes, ainsi que les morsures et les piqûres nécessitent un traitement médical (en raison du risque de tétanos). Si une plaie est toujours aussi étendue après un certain temps ou ne guérit pas dans un délai de 10 à 14 jours, une visite chez le médecin s'impose. Faites de même si les bords de la plaie sont très rouges, si celle-ci enfle subitement ou devient très douloureuse ou encore si la blessure s'accompagne d'une fièvre (risque de septicémie).

En cas de peau enflammée, mais non lésée (coup de soleil, zones de pression, zones cutanées enflammées), le risque d'infection est quasi nul. Par conséquent, n'utilisez pas le désinfectant Bepanthen Plus, mais un médicament qui ne contient pas de désinfectant.

Quand Bepanthen MED Plus ne doit-il pas être pris/utilisé?

Si vous présentez une hypersensibilité à l'une ou plusieurs des substances contenues dans Bepanthen MED Plus, vous ne devez pas utiliser cette préparation. Si vous avez une lésion du tympan, vous ne devez pas utiliser Bepanthen MED Plus dans l'oreille.

Bepanthen MED Plus ne doit pas non plus être utilisé pour traiter les plaies graves, profondes et très souillées. Ce type de blessures doit être soigné par un médecin.



Des applications répétées au même site peuvent provoquer des irritations cutanées. Le médicament ne convient que pour les petites lésions de la peau et ne doit pas être utilisé sur de grandes surfaces cutanées.

Quelles sont les précautions à observer lors de la prise/l'utilisation de Bepanthen MED Plus?

Si vos symptômes ne s'améliorent pas, voire s'aggravent sous traitement, demandez conseil à votre médecin.

Veillez à ce que Bepanthen MED Plus n'entre pas en contact avec les oreilles ou les muqueuses.

Bepanthen MED Plus ne doit pas entrer en contact avec les yeux en raison du risque de lésion oculaire. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau. En cas d'irritation, de rougeur ou de douleur dans les yeux ou en cas de troubles visuels, consulter immédiatement un médecin. Des cas graves de lésions persistantes de la cornée (la surface de l'œil) nécessitant dans certains cas une greffe de cornée ont été rapportés chez des patients dont les yeux sont accidentellement entrés en contact avec des médicaments similaires lors d'interventions chirurgicales sous anesthésie (endormissement profond et sans douleur).

Lors de l'utilisation de médicaments contenant de la chlorhexidine, tels que Bepanthen MED Plus, des réactions allergiques graves, y compris un choc anaphylactique, peuvent survenir dans de rares cas. Si des symptômes de réaction allergique graves surviennent, tels qu'une respiration sifflante ou des difficultés respiratoires, un gonflement du visage, des démangeaisons, une urticaire pouvant entraîner rapidement des symptômes graves, une éruption cutanée sévère ou un choc, arrêtez immédiatement d'utiliser le produit et consultez un médecin sans délai.

N'utilisez pas Bepanthen MED Plus en même temps que d'autres désinfectants, car cela peut diminuer son efficacité.

Bepanthen MED Plus ne doit pas être pris par voie orale. En cas d'ingestion accidentelle de grandes quantités, consultez un médecin.

Bepanthen MED Plus, Crème contient de la graisse de laine, de l'alcool cétylique et de l'alcool stéarylique. Ces derniers peuvent provoquer des irritations cutanées localisées (p.ex. dermatite de contact).

Bepanthen MED PLUS, Spray contient 57 mg d'éthanol par millilitre. Cela peut provoquer une sensation de brûlure sur la peau lésée.

En raison de sa teneur en alcool, Bepanthen MED Plus, Spray ne doit pas être utilisé chez le nouveau-né.

Veillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage externe (même en automédication!).

Aucune influence négative de Bepanthen MED Plus sur l'aptitude à conduire et la capacité à utiliser des machines n'est connue.

Bepanthen MED Plus peut-il être pris/utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Bepanthen MED Plus peut être utilisé pendant la grossesse et pendant la période d'allaitement. Pendant ces périodes, évitez toutefois d'appliquer le produit sur de grandes surfaces de peau.

Les femmes qui allaitent ne doivent pas utiliser Bepanthen MED Plus sur la poitrine. Éliminez les résidus de médicament avant l'allaitement afin d'éviter leur absorption par le nouveau-né.

Comment utiliser Bepanthen MED Plus?

Pour toutes les possibilités d'emploi (voir «Qu'est-ce que Bepanthen MED Plus et quand doit-il être utilisé?»), la dose recommandée chez l'adulte, l'adolescent et l'enfant est la suivante:



Appliquez *Bepanthen MED Plus, Crème* ou *Bepanthen MED Plus, Spray* une à plusieurs fois par jour, selon les besoins, sur les plaies nettoyées ou les zones cutanées enflammées jusqu'à la guérison complète.

Si vos symptômes ne s'améliorent pas, voire s'aggravent sous traitement, adressez-vous à votre médecin.

Appliquez *Bepanthen MED Plus, Crème* en couche fine sur les zones de peau affectées.

Vaporiser *Bepanthen MED Plus, Spray* à une courte distance.

Le traitement de la plaie peut être effectué avec ou sans pansement.

Traitement des inflammations du mamelon en période d'allaitement: avant chaque tétée, éliminer soigneusement et complètement tout résidu de crème adhérant aux mamelons et aux seins.

Veuillez vous conformer à la posologie figurant sur la notice d'emballage ou prescrite par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires Bepanthen MED Plus peut-il provoquer?

L'utilisation de *Bepanthen MED Plus* peut provoquer les effets secondaires ci-après: réactions cutanées allergiques telles que: dermatite de contact, démangeaisons, rougeurs, eczéma, urticaire, irritations cutanées, vésicules ou sensation de brûlure, lésion de la cornée (surface de l'œil) et lésion oculaire permanente, y compris troubles visuels permanents (après un contact accidentel avec les yeux, voir «Quelles sont les précautions à observer lors de la prise/de l'utilisation de *Bepanthen MED Plus*?»).

Des réactions d'hypersensibilité et anaphylactiques allant jusqu'au choc, accompagnées des manifestations correspondantes telles que: asthme, essoufflement, respiration sifflante, autres troubles des voies respiratoires, gonflement du visage, réactions cutanées, telles que: démangeaisons, éruption cutanée ou urticaire, troubles gastro-intestinaux et cardio-pulmonaires, ont été observées.

Une application répétée au même site peut provoquer des irritations cutanées. Le médicament convient uniquement au traitement des petites plaies. Ne l'utilisez pas sur de grandes surfaces cutanées.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention?

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention <EXP> sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15-25°C).

Conserver hors de portée des enfants.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Bepanthen MED Plus?

Principes actifs

Bepanthen MED PLUS, Crème contient 50 mg de dexpanthénol et 5 mg de dichlorhydrate de chlorhexidine par gramme.

Bepanthen MED PLUS, Spray 50 mg de dexpanthénol et 5 mg de gluconate de chlorhexidine par millilitre.

Excipients

Bepanthen MED Plus, Crème: DL-pantolactone, alcool cétylique, alcool stéarylique, vaseline blanche, paraffine visqueuse, graisse de laine, stéarate de macrogol, eau purifiée.

Bepanthen MED Plus, Spray: DL-pantolactone, éther laurique de macrogol 9, alcool, eau purifiée.



Numéro d'autorisation

43891 (crème), 51739 (spray, solution pour application cutanée) (Swissmedic).

Où obtenez-vous Bepanthen MED Plus? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Crème en tubes de 4 × 3.5 g, 30 g et 100 g.

Spray en microdoseur de 30 ml et 50 ml.

Titulaire de l'autorisation

Bayer (Schweiz) AG, 8045 Zurich.

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en avril 2025 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

