

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Mebucaïne Extra Spray®

Spirig HealthCare AG

Qu'est-ce que Mebucaïne Extra Spray et quand doit-il être utilisé?

Mebucaïne Extra Spray contient un principe actif désinfectant (chlorure de benzoxonium) et un principe actif analgésique au niveau local (chlorhydrate de lidocaïne monohydraté).

La lidocaïne, un anesthésique local, soulage le mal de gorge et les troubles de la déglutition liés à l'infection.

Mebucaïne Extra Spray a un effet antibactérien, antiviral et antifongique (contre les champignons).

Mebucaïne Extra Spray soulage les symptômes dus aux infections de la bouche et de la gorge, en particulier les maux de gorge (avec ou sans troubles de la déglutition), les aphtes et les inflammations des gencives. Adjuvant en cas d'angines.

Quand Mebucaïne Extra Spray ne doit-il pas être utilisé?

Vous ne devez pas utiliser Mebucaïne Extra Spray si vous êtes allergique au chlorure de benzoxonium, à d'autres ammoniums quaternaires, à la lidocaïne, à d'autres anesthésiques locaux ou à d'autres composants de Mebucaïne Extra Spray.

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Mebucaïne Extra Spray?

Mebucaïne Extra Spray n'est pas recommandé pour les enfants âgés de moins de 4 ans.

Mebucaïne Extra Spray est uniquement destiné à une application buccale et dans la gorge. Il est préférable de ne pas utiliser Mebucaïne Extra Spray juste avant ou après l'emploi d'un dentifrice, car son efficacité pourrait être diminuée.

Précautions: En cas de maux de gorge accompagnés d'une fièvre élevée, d'importants troubles de la déglutition ou si les symptômes ne s'améliorent pas dans le délai de 5 jours, veuillez consulter un médecin ou un pharmacien.

Les patients présentant des plaies et des lésions de la muqueuse de la bouche et de la gorge doivent utiliser Mebucaïne Extra Spray avec prudence.

Mebucaïne Extra Spray ne doit pas être utilisé pendant ou immédiatement avant le repas ou la consommation de liquides. L'effet anesthésique local de la lidocaïne peut provoquer une sensation d'engourdissement transitoire de la langue et de la muqueuse buccale et ainsi gêner la déglutition. Ne rien boire ni manger tant que cette sensation d'engourdissement persiste.

Mebucaïne Extra Spray: ne pas vaporiser dans les yeux, ne pas inhaler. L'embout du spray pour la gorge ne doit pas être utilisé s'il est endommagé.

Ce médicament contient 50 mg d'éthanol (alcool) par dose, ce qui équivaut à 100 mg/ml (12.4% v/v).

Si la peau est endommagée, une sensation de brûlure peut apparaître.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique ou



- vous utilisez déjà d'autres médicaments (même en automédication!).

Mebucaïne Extra Spray peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Mebucaïne Extra Spray ne doit pas être utilisé pendant la grossesse, sauf en cas de prescription médicale explicite.

Ne pas utiliser Mebucaïne Extra Spray pendant l'allaitement. Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, vous devez, par mesure de précaution, renoncer à prendre des médicaments ou demander l'avis du médecin, du pharmacien ou du droguiste.

Comment utiliser Mebucaïne Extra Spray?

Ne pas utiliser les doses individuelles plus fréquemment que toutes les 2 – 3 heures.

Ne pas dépasser la posologie recommandées.

Afin de soulager les symptômes, la plus faible dose efficace doit toujours être utilisée pendant la plus courte durée possible de traitement.

Ne pas utiliser en association avec d'autres antiseptiques.

Ne pas utiliser pendant ou immédiatement avant de boire ou de manger.

Sauf avis contraire du médecin:

Adultes

Pulvériser Mebucaïne Extra Spray dans la cavité buccale ou la gorge. Tenir le spray verticalement et presser fortement 4 fois lors de chaque application.

Selon les besoins, utiliser 3 à 6 fois par jour au maximum. Respecter un intervalle d'au moins 2 à 3 heures entre les utilisations.

Avant le premier usage, presser plusieurs fois le spray dans l'air pour amorcer la pompe.

Utilisation du Mebucaïne Extra Spray:

- Retirer le capuchon de protection.
- Fixer l'embout sur le spray pour la gorge en pressant fortement dessus.
- Avant la première utilisation, pomper plusieurs fois jusqu'à l'apparition d'une nébulisation régulière. Mebucaïne Extra Spray est immédiatement prêt à l'emploi pour les utilisations suivantes.
- Après usage, désinfecter et sécher l'embout du spray pour la gorge à l'aide d'un chiffon propre et humidifié avec un peu de Mebucaïne Extra Spray.
- Enlever l'embout du spray pour la gorge et le conserver dans la boîte jusqu'au prochain usage. Replacer le capuchon de protection sur le spray.
- L'embout de pulvérisation dans la gorge ne doit être utilisé que par une seule personne afin d'éviter une propagation éventuelle de l'infection.

Enfants dès 4 ans

Mebucaïne Extra Spray peut être utilisé chez les enfants dès 4 ans, la dose devant cependant être réduite; n'actionner Mebucaïne Extra Spray pas plus de 2-3 fois lors de chaque utilisation.

Selon les besoins, utiliser 3 à 6 fois par jour au maximum. Respecter un intervalle d'au moins 2 à 3 heures entre les utilisations.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires Mebucaïne Extra Spray peut-il provoquer?



Certains patients peuvent être allergiques à ce produit et présenter les réactions suivantes: difficultés à respirer ou troubles de la déglutition, gonflement du visage, des lèvres, de la langue ou dans la gorge, fortes démangeaisons avec éruptions cutanées rouges, urticaire ou formation de papules. Si vous remarquez de telles réactions, il faut arrêter le traitement et consulter un médecin.

Occasionnel (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 1000)

Irritation ou sensation de picotement dans la bouche et dans la gorge.

Rare (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 10 000)

Réactions d'hypersensibilité comme des gonflements au niveau du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge, une détresse respiratoire, des démangeaisons, une éruption cutanée (urticaire).

Lors d'une utilisation de plus de 2 semaines, une coloration brune réversible de la langue et/ou des dents peut apparaître.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention?

Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Tenir hors de la portée des enfants.

Conserver à 15-30 °C.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Mebucaine Extra Spray?

1 ml solution pour pulvérisation buccale contient

Principes actifs

2 mg de chlorure de benzoxonium et 1,5 mg de chlorhydrate de lidocaïne monohydraté.

Excipients

Éthanol 12,4 % vol., glycérol, eau purifiée, acide chlorhydrique (pour l'ajustement du pH), huile essentielle de menthe poivrée et lévomenthol.

Numéro d'autorisation

46861 (Swissmedic).

Où obtenez-vous Mebucaine Extra Spray? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Mebucaine Extra Spray: flacon de 30 ml avec embout de pulvérisation

Titulaire de l'autorisation

Spirig HealthCare SA, 4622 Egerkingen

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en décembre 2020 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

