

Information für Patientinnen und Patienten

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, denn sie enthält wichtige Informationen.

Dieses Arzneimittel haben Sie entweder persönlich von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin verschrieben erhalten oder Sie haben es ohne ärztliche Verschreibung in der Apotheke oder Drogerie bezogen. Wenden Sie das Arzneimittel gemäss Packungsbeilage beziehungsweise nach Anweisung des Arztes, Apothekers oder Drogisten bzw. der Ärztin, der Apothekerin oder der Drogistin an, um den grössten Nutzen zu haben. Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

Similasan Entzündete Augen N, Augentropfen Monodosen

Homöopathisches Arzneimittel

Wann wird Similasan Entzündete Augen N angewendet?

Gemäss homöopathischem Arzneimittelbild kann Similasan Entzündete Augen N bei nichtinfektiösen, leichten Formen von Entzündungen der Augenbindehaut und der Lidränder aufgrund irritierender Umweltfaktoren, mit Symptomen wie gerötete Augen, brennende Augen angewendet werden. Die Anwendung dieses Arzneimittels im genannten Anwendungsgebiet beruht ausschliesslich auf den Prinzipien einer homöopathischen Therapierichtung.

Was sollte dazu beachtet werden?

Wenn Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin andere Arzneimittel verordnet hat, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, ob Similasan Entzündete Augen N gleichzeitig eingenommen werden darf.

Bei Augenentzündungen ist das Tragen von Kontaktlinsen nicht angezeigt.

Färbt Kontaktlinsen.

Wenn Sie jedoch auf Kontaktlinsen angewiesen sind, entfernen Sie diese vor dem Eintropfen und setzen Sie die Linsen frühestens 15 Minuten nach der Behandlung wieder ein. Empfehlenswert ist die Anwendung auch nach dem Entfernen der Linsen, abends vor dem Schlafengehen und morgens beim Erwachen, mind. 15 Min. vor dem Einsetzen der Linsen.

Beachten Sie, dass ein entzündetes Auge gegenüber Linsen empfindlicher reagiert.

Wenn nach 2 – 3 Tagen keine Besserung eingetreten ist, ist ein Arzt bzw. eine Ärztin aufzusuchen.

Kommt es zu einer Verschlechterung oder treten neue Symptome auf, z.B. eine Abnahme der Sehschäfte oder Schmerzen, ist unverzüglich ein Arzt bzw. eine Ärztin aufzusuchen.

Wann darf Similasan entzündete Augen N nicht oder nur mit Vorsicht eingenommen / angewendet werden?

Bei Kindern bis 6 Jahre nur auf ärztliche Verschreibung hin anwenden.

Bei Linsentrübungen (Grauer Star, Katarakt) oder Grünem Star (Glaukom) nur nach ärztlicher Diagnose anwenden.

Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie

- an anderen Krankheiten leiden,
- Allergien haben oder
- andere Arzneimittel (auch selbst gekaufte!) einnehmen oder äusserlich anwenden!

Wie verwenden Sie Similasan entzündete Augen N?



Bei Kindern bis 6 Jahre nur auf ärztliche Verschreibung hin anwenden.

Falls vom Arzt bzw. von der Ärztin nicht anders verschrieben:

- Ein bis mehrere Male pro Tag 1 Tropfen pro Auge, maximal 10-mal täglich 1 Tropfen pro Auge.

Anwendung:

- Einen Tropfenbehälter abtrennen und Flüssigkeit zur Kugelspitze schütteln. Flachen Teil mit Kugelspitze durch eine Drehbewegung vom Tropfenbehälter abtrennen.
- Augentropfenbehälter mit Zeigefinger und Daumen mit der Spitze nach unten über das offene Auge halten, zusammenpressen und Tropfen ins Auge träufeln.
- Für jede Anwendung einen neuen Augentropfenbehälter verwenden (nicht haltbar, da ohne Konservierungsmittel).

Die Wirkungsdauer einer Arzneimittelgabe kann individuell verschieden sein.

Grundsätzlich wird die Anwendung des Arzneimittels bei Nachlassen der Wirkung oder bei Rückkehr der Beschwerden wiederholt.

Nicht für Kinder unter 6 Jahren ohne ärztliche Verordnung.

Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt oder von der Ärztin verschriebene Dosierung. Wenn bei der Behandlung eines Kleinkindes / Kindes die gewünschte Besserung nicht eintritt, ist mit ihm ein Arzt bzw. eine Ärztin aufzusuchen. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. mit Ihrer Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Welche Nebenwirkungen kann Similasan Entzündete Augen N haben?

Für Similasan Entzündete Augen N wurden in Einzelfällen allergische Reaktionen mit Juckreiz, Brennen und Rötung der Augen beobachtet.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten oder Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin. Dies gilt insbesondere auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Bei Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). Bei andauernder Verschlechterung setzen Sie Similasan Entzündete Augen N ab und informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten oder Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Was ist ferner zu beachten?

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit "EXP" bezeichneten Datum verwendet werden.

Aufbrauchfrist nach Anbruch

Angebrochene Augentropfenbehälter sofort verwenden und nach Gebrauch wegwerfen (nicht haltbar, da ohne Konservierungsmittel).

Lagerungshinweis

Bei Raumtemperatur (15-25°C) lagern.

Ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.

Was ist in Similasan Entzündete Augen N enthalten?



1 ml Flüssigkeit enthält (1 Tropfen entspricht 17 mg):

Wirkstoffe

Atropa bella-donna (HAB) D6 (Ph.Eur.Hom. 1.1.3) 0.3033 ml / Euphrasia 3c (HAB) D6 0.3033 ml / Hepar sulfuris (HAB) D12 0.3033 ml.

Hilfsstoffe

Trinatriumcitrat; Natriumchlorid; Salzsäure; Wasser für Injektionszwecke

Zulassungsnummer

67562 (Swissmedic)

Wo erhalten Sie Similasan Entzündete Augen N? Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken und Drogerien, ohne ärztliche Verschreibung.

- Packung mit 20 Monodosen zu 0,40 ml

Zulassungsinhaberin

T&S Eye Care Management AG, CH-6060 Sarnen

Diese Packungsbeilage wurde im November 2021 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

