

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico o del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Similasan Occhi infiammati N, gocce per gli occhi monodosi

Medicamento omeopatico

Quando si usa Similasan Occhi infiammati N?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici, Similasan Occhi infiammati N può essere usato in caso di forme lievi di infiammazione non infettive della congiuntiva e dei bordi palpebrali causate da fattori ambientali irritanti, con sintomi come occhi arrossati, che bruciano.

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa esclusivamente sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere *Similasan Occhi infiammati N*.

In caso di infiammazioni agli occhi, è sconsigliato portare lenti a contatto.

Altera il colore delle lenti a contatto.

Se tuttavia sceglie di indossare lenti a contatto, le rimuova prima di instillare le gocce per gli occhi e le indossi nuovamente almeno 15 minuti dopo il trattamento. Si consiglia altresì di attendere almeno 15 minuti per l'applicazione delle gocce per gli occhi dopo aver rimosso le lenti, la sera prima di andare a letto e la mattina al risveglio.

Ricordi che un occhio infiammato reagisce più sensibilmente alle lenti a contatto.

Se dopo 2-3 giorni non si nota un miglioramento, si rivolga a un medico.

In caso di peggioramento o di comparsa di nuovi sintomi, ad es. riduzione dell'acuità visiva o dolore, si rivolga immediatamente a un medico.

Quando non si può assumere / usare Similasan Occhi infiammati N e quando la sua somministrazione/il suo uso richiede prudenza?

Per bambini fino ai 6 anni, utilizzare solo ed esclusivamente su prescrizione medica.

In caso di opacizzazione del cristallino (cataratta) o glaucoma applicare solo dopo diagnosi medica.

Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa) o li applica esternamente

Come usare Similasan Occhi infiammati N?

Per bambini fino ai 6 anni, utilizzare solo ed esclusivamente su prescrizione medica.

Se non diversamente prescritto dal medico:

- 1 goccia per occhio, da una a più volte al giorno, massimo 1 goccia per occhio 10 volte al giorno.



Utilizzo:

- staccare un contenitore monodose e agitarlo per far scendere il liquido nella punta arrotondata. Staccare la parte piatta dalla punta arrotondata con un movimento rotatorio.
- Tenere il contenitore monodose con il dito indice e il pollice, con la punta rivolta verso il basso sopra l'occhio aperto, premere e instillare le gocce nell'occhio.
- A ogni utilizzo, usare un nuovo contenitore monodose di gocce per gli occhi (non si conserva, poiché privo di conservanti).

L'efficacia della somministrazione può variare individualmente.

In generale, ripetere la somministrazione del rimedio quando si percepisce un calo dell'efficacia o il ritorno dei disturbi.

Senza prescrizione medica, il rimedio non è adatto ai bambini sotto i 6 anni.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se il trattamento di un bambino piccolo/di un bambino, non produce il miglioramento auspicato, consulti un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Similasan Occhi infiammati N?

Con Similasan Occhi infiammati N, in casi sporadici sono state osservate reazioni allergiche con prurito, bruciore e arrossamento degli occhi.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con Similasan Occhi infiammati N e informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.*

Termine di consumo dopo l'apertura

Dopo l'apertura, utilizzare immediatamente il contenitore monodose e poi smaltirlo dopo l'uso (non si conserva, poiché privo di conservanti).

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Cosa contiene Similasan Occhi infiammati N?

1 ml di liquido contiene (1 goccia corrisponde a 17 mg):

Principi attivi

Atropa bella-donna (HAB) D6 (Ph.Eur.Hom. 1.1.3) 0.3033 ml / Euphrasia 3c (HAB) D6 0.3033 ml / Hepar sulfuris (HAB) D12 0.3033 ml.

Sostanze ausiliarie



Citrato di trisodio; cloruro di sodio; acido cloridrico; acqua per preparazioni iniettabili.

Numero dell'omologazione

67562 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Similasan Occhi infiammati N? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

- Confezione con 20 monodose da 0.40 ml

Titolare dell'omologazione

T&S Eye Care Management AG, CH-6060 Sarnen

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel novembre 2021 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

