

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Allergodil® saisonal forte 0,15% pulvérisation nasale

VERFORA SA

Qu'est-ce que l'Allergodil saisonal forte 0,15% pulvérisation nasale et quand doit-il être utilisé?

Allergodil saisonal forte 0,15% pulvérisation nasale est un médicament antiallergique destiné au traitement symptomatique du rhume allergique saisonnier (le rhume des foins) chez les adultes et les adolescents dès 12 ans ainsi que, seulement selon prescription du médecin, chez les enfants dès 6 ans.

Du fait qu'il est appliqué localement dans le nez, le médicament agit dans un délai de 15 minutes.

Quand Allergodil saisonal forte 0,15% pulvérisation nasale ne doit-il pas être utilisé?

Allergodil saisonal forte 0,15% pulvérisation nasale ne doit pas être utilisé en cas d'hypersensibilité connue au principe actif ou à l'un des excipients (voir «Que contient Allergodil saisonal forte 0,15% pulvérisation nasale?»).

Ce médicament n'est pas recommandé pour les enfants âgés de moins de 6 ans, car son efficacité et sa sécurité n'ont pas été étudiées chez ce groupe de patients.

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation d'Allergodil saisonal forte 0,15% pulvérisation nasale?

Dans des cas rares, des troubles tels qu'abattement, lassitude, épuisement, faiblesse, vertiges, obnubilation ou somnolence peuvent survenir qui peuvent être dus soit à la maladie elle-même, soit à l'utilisation d'Allergodil saisonal forte 0,15% pulvérisation nasale. Dans ce cas, ne conduisez pas de véhicules et n'utilisez pas de machines. Souvenez-vous que la consommation d'alcool peut renforcer ces effets.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage externe (même en automédication!).

Allergodil saisonal forte 0,15% pulvérisation nasale peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Allergodil saisonal forte 0,15% pulvérisation nasale ne doit être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement que sur prescription expresse du médecin.

Comment utiliser Allergodil saisonal forte 0,15% pulvérisation nasale?

Adultes et adolescents dès 12 ans:

Sauf prescription contraire, la posologie recommandée est de 2 nébulisations dans chaque narine, une fois par jour. Dans certains cas, 2 nébulisations dans chaque narine, deux fois par jour sont nécessaires. La dose journalière maximale est 2 nébulisations dans chaque narine, deux fois par jour.

Enfants de 6 à 11 ans:



Utiliser uniquement sur prescription médicale: 1 nébulisation dans chaque narine deux fois par jour.

Allergodil saisonal forte 0,15% pulvérisation nasale ne doit pas être utilisé chez les enfants de moins de 6 ans en raison de l'absence de données. Pour des raisons de sécurité, les enfants de 6 à 11 ans ne doivent être traités que sur prescription médicale.

Mode d'emploi

L'application doit se faire avec la tête légèrement inclinée vers l'avant.

Avant la première utilisation, la pompe doit être amorcée en appuyant sur celle-ci et en la relâchant six fois jusqu'à l'apparition d'une nébulisation fine. Si Allergodil saisonal forte 0,15% pulvérisation nasale n'a pas été utilisé pendant 3 jours ou plus, il faut de nouveau l'amorcer avant l'emploi, en appuyant et relâchant la pompe aussi souvent que nécessaire pour obtenir une nébulisation fine.

Utilisation de la pulvérisation nasale

1. Mouchez-vous pour dégager vos narines.
2. Inclinez la tête vers l'avant en direction des orteils. N'inclinez pas la tête vers l'arrière.
3. Tenez le flacon en position verticale et introduisez délicatement l'embout du nébuliseur dans une narine.
4. Comprimez l'autre narine avec un doigt, pressez une fois rapidement sur la pompe et inspirez simultanément doucement par le nez.
5. Expirez par la bouche.
6. Répétez l'opération avec l'autre narine.
7. En cas d'une posologie de 2 nébulisations dans chaque narine, veuillez répéter les étapes 2 à 6.
8. Après l'utilisation, inspirez doucement et n'inclinez pas la tête vers l'arrière. Cela permet d'empêcher que le médicament ne passe dans la gorge et ne provoque un mauvais goût.

Durée du traitement

La durée du traitement d'un rhume des foins est normalement de 2 semaines. Si les symptômes persistent plus longtemps, veuillez consulter votre médecin.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires Allergodil saisonal forte 0,15% pulvérisation nasale peut-il provoquer?

Fréquent (concerne 1 à 10 personnes sur 100)

Des troubles du goût (un goût désagréable du principe actif azélastine) apparaissent fréquemment après l'utilisation. Ceci est souvent la conséquence d'une utilisation incorrecte, soit une inclination de la tête vers arrière. Dans de rares cas, ceci peut provoquer des nausées. C'est pourquoi il est important de veiller à utiliser le produit correctement (voir «Comment utiliser Allergodil saisonal forte 0,15% pulvérisation nasale?»).

Occasionnel (concerne 1 à 10 personnes sur 1000)

Occasionnellement, une obnubilation ou une somnolence surviennent.

Occasionnellement, la muqueuse nasale déjà altérée par l'inflammation peut présenter une irritation qui se manifeste par une brûlure, des démangeaisons, des éternuements ou des saignements de nez.

Rare (concerne 1 à 10 personnes sur 10 000)

Dans de rares cas, des vertiges, des nausées, de l'abattement (fatigue, épuisement) et de la faiblesse se manifestent.



Très rare (concerne moins d'une personne sur 10 000)

Dans de très rares cas, de l'hypersensibilité, une éruption cutanée, des démangeaisons ou de l'urticaire peuvent survenir.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention?

Stabilité

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Délai d'utilisation après ouverture

Délais d'utilisation après ouverture: 6 mois.

Remarques concernant le stockage

Ne pas conserver au-dessus de 25°C et conserver hors de portée des enfants.

Ne pas conserver au réfrigérateur.

Ne pas congeler.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Allergodil saisonal forte 0,15% pulvérisation nasale?

Solution pour pulvérisation nasale. Solution claire et incolore.

Principes actifs

1 nébulisation d'Allergodil saisonal forte 0,15% pulvérisation nasale contient 0,21°mg de chlorhydrate d'azélastine (correspondant à 0,19 mg d'azélastine).

Excipients

Hypromellose, sucralose, sorbitol, édétate disodique, citrate de sodium, eau purifiée.

Numéro d'autorisation

65425 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Allergodil saisonal forte 0,15% pulvérisation nasale? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

Allergodil saisonal forte 0,15% pulvérisation nasale est disponible en pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Il est présenté en flacons de 5 ml de solution.

Titulaire de l'autorisation

VERFORA SA, 1752 Villars-sur-Glâne.

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en février 2022 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

