

Information für Patientinnen und Patienten

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, denn sie enthält wichtige Informationen. Dieses Arzneimittel haben Sie entweder persönlich von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin verschrieben erhalten oder Sie haben es ohne ärztliche Verschreibung in der Apotheke oder Drogerie bezogen. Wenden Sie das Arzneimittel gemäss Packungsbeilage beziehungsweise nach Anweisung des Arztes, Apothekers oder Drogisten bzw. der Ärztin, der Apothekerin oder der Drogistin an, um den grössten Nutzen zu haben. Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

meridol® perio Chlorhexidin Lösung 0,2%

Was ist meridol® perio Chlorhexidin Lösung 0,2% und wann wird es angewendet?

meridol® perio Chlorhexidin Lösung 0,2% ist ein Antiseptikum zur vorübergehenden Keimzahlreduktion in der Mundhöhle und zur Hemmung der Entstehung bakterieller Zahnbeläge (Plaquebildung).

meridol® perio Chlorhexidin Lösung 0,2% wird angewendet

- zur kurzzeitigen Behandlung von bakteriell bedingten Entzündungen des Zahnfleisches (Gingivitis) und der Mundschleimhaut.

Nach ärztlicher Verordnung:

- zur begleitenden Behandlung bei Therapien des Zahnhalteapparates,
- zur Verhinderung einer Wundinfektion bei chirurgischen Eingriffen in der Mundhöhle,
- bei beschränkter Mundhygienefähigkeit.

Was sollte dazu beachtet werden?

Der Kontakt von meridol® perio Chlorhexidin Lösung 0,2% mit schlecht durchblutetem Gewebe, dem Gehörgang, dem Auge und der Augenumgebung ist zu vermeiden.

Wann darf meridol® perio Chlorhexidin Lösung 0,2% nicht angewendet werden?

meridol® perio Chlorhexidin Lösung 0,2% enthält Chlorhexidin, das in sehr seltenen Fällen Allergien auslöst. Typische Zeichen sind Juckreiz, allgemeine Hautrötung, Nesselfieber, Asthma oder vereinzelt Kreislaufreaktionen. Sie erfordern umgehend ärztliche Behandlung.

Bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber einem Bestandteil des Präparates darf meridol® perio Chlorhexidin Lösung 0,2% nicht angewendet werden.

Wann ist bei der Anwendung von meridol® perio Chlorhexidin Lösung 0,2% Vorsicht geboten?

meridol® perio Chlorhexidin Lösung 0,2% sollte wegen der möglichen Inaktivierung nicht mit Zahnpasten oder anderen Spüllösungen gleichzeitig angewendet werden.



Das Arzneimittel sollte bei Wunden, Ulzerationen und nässenden Abschilferungen der Mundschleimhaut nicht angewendet werden.

Bei Personen, bei denen die Kontrolle über den Schluckreflex nicht gewährleistet ist (z.B. Kinder vor der Einschulung, Behinderte) sollte meridol® perio Chlorhexidin Lösung 0,2% nicht angewendet werden.

Macrogolglycerolhydroxystearat kann Hautreizungen hervorrufen.

Dieses Arzneimittel enthält 730 mg Propylenglycol pro 10 ml, entsprechend 73 mg Propylenglycol pro ml. Propylenglykol kann Hautreizungen verursachen.

Dieses Arzneimittel enthält einen Duftstoff mit Limonen, Linalool und Eugenol.

Limonene, Linalool & Eugenol können allergische Reaktionen hervorrufen.

Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie

- an anderen Krankheiten leiden,
- Allergien haben oder
- andere Arzneimittel (auch selbst gekaufte!) einnehmen oder äusserlich anwenden!

Darf meridol® perio Chlorhexidin Lösung 0,2% während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit eingenommen / angewendet werden?

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen ist bei bestimmungsgemässer Anwendung kein Risiko für das Kind bekannt. Systematische wissenschaftliche Untersuchungen wurden aber nie durchgeführt. Vorsichtshalber sollten Sie während der Schwangerschaft und Stillzeit möglichst auf Arzneimittel verzichten oder den Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. die Ärztin, Apothekerin oder Drogistin um Rat fragen.

Wie verwenden Sie meridol® perio Chlorhexidin Lösung 0,2%?

Erwachsene und Kinder über 8 Jahren: die Mundhöhle wird 2 mal täglich für eine Minute mit 10 ml meridol® perio Chlorhexidin Lösung 0,2% gründlich gespült und die Lösung anschliessend ausgespuckt. Die Anwendung soll nach dem Zähneputzen und anschliessendem sorgfältigen Ausspülen mit Wasser erfolgen.

Die Lösung ist gebrauchsfertig und daher unverdünnt anzuwenden.

meridol® perio Chlorhexidin Lösung 0,2% sollte nicht länger als 7 Tage angewendet werden, es sei denn, Ihr Arzt oder Zahnarzt rät Ihnen zu einer längeren Anwendung.

Ständige Anwendung als Mundspüllösung ohne mechanische Reinigung der Zähne kann Blutungen des Zahnfleisches fördern.

Die Anwendung und Sicherheit von meridol® perio Chlorhexidin Lösung 0,2% bei Kindern unter 8 Jahren ist bisher nicht geprüft worden.

Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt oder der Ärztin verschriebene Dosierung. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem



Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. mit Ihrer Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Welche Nebenwirkungen kann meridol® perio Chlorhexidin Lösung 0,2% haben?

Folgende Nebenwirkungen können bei der Anwendung von meridol perio Chlorhexidin Lösung 0,2% auftreten:

Sehr häufig (betrifft mehr als einen von 10 Behandelten)

Sehr häufig sind Verfärbungen der Zahnhartsubstanz und von Restaurationen. Diese können vom Zahnarzt oder vom Dentalhygieniker bzw. der Zahnärztin oder der Dentalhygienikerin leicht wieder entfernt werden. Eine Verfärbung der Haarzunge ist ebenfalls möglich. Diese Verfärbung bildet sich nach Ende der Behandlung kurzfristig wieder zurück. Bei Vollprothesen empfiehlt sich ein Spezialreiniger. Weiterhin kann ein brennendes Gefühl auf der Zunge (bei Behandlungsbeginn), eine Beeinträchtigung des Geschmacksempfindens oder ein Taubheitsgefühl der Zunge auftreten. Diese Erscheinungen sind nach Beendigung der Anwendung reversibel.

Gelegentlich (betrifft 1 bis 10 von 1000 Behandelten)

Gelegentlich treten reversible schuppige Veränderungen der Mundschleimhaut auf.

Selten (betrifft 1 bis 10 von 10'000 Behandelten)

Selten treten Überempfindlichkeitsreaktionen auf. In Einzelfällen wurden auch schwerwiegende allergische Reaktionen nach lokaler Anwendung von Chlorhexidin beschrieben.

Sehr selten (betrifft weniger als 1 von 10'000 Behandelten)

Sehr selten ist eine reversible Speicheldrüsenschwellung.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin. Dies gilt insbesondere auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Was ist ferner zu beachten?

Haltbarkeit

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit «EXP» bezeichneten Datum verwendet werden.

Aufbrauchsfrist nach Anbruch

Nach Anbruch ist das Arzneimittel 4 Wochen haltbar.

Lagerungshinweis

Bei Raumtemperatur (15–25° C) lagern. Ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.



Weitere Hinweise

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker oder Drogist bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin. Diese Personen verfügen über die ausführliche Fachinformation.

Was ist in meridol® perio Chlorhexidin Lösung 0,2% enthalten?

1 ml Lösung zur Anwendung in der Mundhöhle enthält

Wirkstoff

Chlorhexidindigluconat 2 mg.

Hilfsstoffe

Sorbitol-Lösung 70% (nicht kristallisierend) (E420), Glycerol (E422), Macrogolglycerolhydroxystearat, Pfefferminzöl (enthält Limonen, Linalool und Eugenol) , Zitronensäuremonohydrat, Patentblau V (E131), Propylenglykol (E1520), Cetylpyridiniumchlorid, gereinigtes Wasser.

Zulassungsnummer

57479 (Swissmedic).

Wo erhalten Sie meridol® perio Chlorhexidin Lösung 0,2%? Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken und Drogerien, ohne ärztliche Verschreibung.

Flasche à 300 ml.

ZulassungsinhaberIn

GABA Schweiz AG, 4106 Therwil.

Diese Packungsbeilage wurde im März 2024 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

