

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di fare uso del medicamento. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

lopidine® 0,5%

Che cos'è lopidine collirio 0.5% e quando si usa?

lopidine 0.5% è un medicamento capace di abbassare ulteriormente la pressione intraoculare in caso di glaucoma, si usa assieme ad altri medicinali per l'abbassamento della pressione intraoculare. lopidine collirio 0.5% può essere utilizzato solo su prescrizione medica.

Di che cosa occorre inoltre tenere conto durante il trattamento?

lopidine collirio 0.5% le è stato prescritto dal suo medico unitamente ad altri colliri per il trattamento del suo glaucoma. Utilizzi quindi sempre lopidine collirio 0.5% in combinazione con gli altri medicinali che le ha prescritto il medico. Anche durante l'utilizzo di lopidine collirio 0.5% può inoltre verificarsi una perdita d'efficacia col passare del tempo. A causa di questa eventualità, dovrebbe assolutamente rispettare gli appuntamenti per le visite di controllo dal suo oculista.

Non utilizzi lopidine collirio 0.5% per il trattamento di altre malattie o di altre persone; applichi il medicamento solo nell'occhio, non inietti e non ingerisca il preparato.

Quando non si può usare lopidine collirio 0.5%?

In caso di ipersensibilità nota o presunta (allergia) a un componente di lopidine collirio 0.5% e/o alla sostanza clonidina.

lopidine collirio 0.5% non deve essere utilizzato nei bambini di età inferiore ai 12 anni.

lopidine collirio 0.5% non deve essere utilizzato in combinazione con i cosiddetti MAO-inibitori.

Inoltre, lopidine collirio 0.5% non deve essere utilizzato nei pazienti con malattie cardiovascolari gravi o instabili e incontrollate, inclusa la pressione alta (ipertensione arteriosa) grave e incontrollata, nell'anamnesi.

Quando è richiesta prudenza nell'uso di lopidine collirio 0.5%?

Questo tipo di farmaci può causare sonnolenza. Per questo motivo si sconsiglia di condurre veicoli o di utilizzare macchine.

Avvertenza per i portatori di lenti a contatto:

togliere le lenti dagli occhi prima di utilizzare qualsiasi medicamento prescritto e reintrodurle solo 30 minuti dopo l'applicazione dell'ultimo preparato.

lopidine collirio 0.5% contiene il conservante benzalconio cloruro, che può causare irritazione oculare e alterare il colore delle lenti a contatto morbide.

Il benzalconio cloruro può causare anche irritazione oculare, specialmente in caso di occhi secchi o malattie della cornea (lo strato trasparente sulla parte anteriore dell'occhio).

Contatti il suo medico se dopo aver usato questo medicamento manifesta una sensazione insolita, bruciore o dolore all'occhio.



Informi assolutamente il suo medico o suo il farmacista nel caso in cui assume o applica nell'occhio qualsiasi altro medicamento (anche se acquistato di sua iniziativa), se soffre di allergie o soffre di altre malattie, in particolare di: malattie cardiache e/o circolatorie (per es. ipertensione, infarto cardiaco recente), ridotta funzionalità renale e/o epatica, malattie vascolari cerebrali, disturbi della regolazione vascolare (sindrome di Raynaud), malattie occlusive dei vasi sanguigni (*Trombangiitis obliterans*) e depressione.

Si può usare lopidine collirio 0.5% durante la gravidanza o l'allattamento?

Durante la gravidanza e l'allattamento, lopidine collirio 0.5% può essere applicato solo con il consenso esplicito del medico o del farmacista.

Come usare lopidine collirio 0.5%?

Adulti: salvo diversa prescrizione medica, instillare 1 goccia di lopidine collirio 0.5% 3 volte al giorno nell'occhio interessato/negli occhi interessati per un massimo di 3 mesi.

Avvertenza per l'uso

Dopo l'applicazione di lopidine collirio 0.5% attendere almeno 5 minuti prima di utilizzare un altro medicamento per il trattamento del suo glaucoma.

Adottando questa misura, si evita che uno dei medicinali lavi via l'altro dall'occhio. Se per un motivo qualsiasi lopidine collirio 0.5% non rimanesse nell'occhio dopo l'applicazione, si può instillare un'altra goccia.

Dopo l'applicazione, si raccomanda di chiudere delicatamente la palpebra o di esercitare una leggera pressione col dito sui dotti lacrimali nell'angolo dell'occhio. In questo modo si limita l'assorbimento del medicamento nei sistemi circolatorio e linfatico (assorbimento sistemico) e si riducono le reazioni avverse sistemiche.

Importante: si attenga alla posologia di lopidine collirio 0.5% indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico e inoltre, utilizzi secondo le prescrizioni tutti gli altri medicinali contro il glaucoma che le sono stati ordinati. Se ritiene che l'azione di lopidine 0.5% o di uno degli altri medicinali sia troppo debole o troppo forte, ne parli al suo medico, al suo farmacista.

Provvedimenti in caso di sovradosaggio

In caso di instillazione di una dose eccessiva di lopidine collirio 0.5%, sciacquare l'occhio una con acqua corrente calda.

Quali effetti collaterali può avere lopidine collirio 0.5%?

I principi attivi contenuti nelle preparazioni oftalmiche possono raggiungere la circolazione sanguigna. Per questa ragione, oltre che nella regione dell'occhio, non si possono escludere effetti collaterali anche in altre parti del corpo.

Con l'applicazione di lopidine collirio 0.5% possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali:

Molto comune (riguarda più di 1 utilizzatore su 10):

infiammazione della mucosa oculare, prurito agli occhi, arrossamento oculare.

Comune (riguarda da 1 a 10 utilizzatori su 100):

gonfiore delle palpebre, secchezza oculare, sensazione di corpo estraneo, formazione di croste sui bordi delle palpebre, aumento della produzione lacrimale, fastidio agli occhi. Raffreddore, mal di testa, gusto



alterato, naso secco, bocca secca, infiammazioni cutanee.

Non comune (riguarda da 1 a 10 utilizzatori su 1000):

dilatazione delle pupille, infiammazione della cornea, diminuzione dell'acuità visiva, sensibilità alla luce, visione annebbiata, infiltrati corneali, infiammazione del margine palpebrale, abbassamento della palpebra, arrossamento delle palpebre, disturbi alle palpebre, dolore oculare, gonfiore oculare, gonfiore dei vasi mucosali, secrezione oculare, irritazione oculare.

Difficoltà respiratorie, naso che cola, irritazione della gola, nausea, stitichezza, infiammazione cutanea al contatto con il prodotto, dolori al petto, stanchezza, irritabilità, capogiro, disturbi della coordinazione, depressione, nervosismo.

Altri effetti collaterali con frequenza non nota: ipersensibilità.

Se dovessero manifestarsi effetti collaterali di questo genere, non utilizzi più il preparato e consulti immediatamente il suo medico o farmacista. Sintomi allergici o simili ad allergie possono insorgere subito o dopo qualche settimana o mese (entro ca. 1–130 giorni).

Se osserva effetti collaterali qui non descritti si rivolga al suo medico, farmacista.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con "Verwendbar bis/Da consumarsi entro il".

Termine di consumo dopo l'apertura

Una volta aperto il flacone, non utilizzare le gocce per più di 30 giorni.

Il contenuto residuo, eventualmente rimasto nel flaconcino 30 giorni dopo l'apertura, va riportato al punto di distribuzione (medico o farmacista) affinché venga smaltito in modo corretto.

Indicazione di stoccaggio

Conservare il medicamento a temperatura ambiente (15–25°C), al riparo dalla luce e dal calore e fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Sterilità

Per evitare una possibile contaminazione batterica del collirio, non toccare la punta contagocce del flacone né con le mani né con gli occhi. Chiudere bene il flacone dopo l'uso.

Il medico o il farmacista, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene lopidine collirio 0.5%?

Principi attivi

1 ml di lopidine collirio 0.5% contiene:

apraclonidina 5 mg (come apraclonidina cloridrato 5.75 mg)

Sostanze ausiliarie

Benzalconio cloruro (0.1 mg/ml), sodio acetato, sodio cloruro, acido cloridrico e/o sodio idrossido, acqua.

Numero dell'omologazione



52 813 (Swissmedic).

Dove è ottenibile Iopidine collirio 0.5%? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia, dietro presentazione della prescrizione medica.

Confezione: flacone contagocce da 5 ml.

Titolare dell'omologazione

Essential Pharma Switzerland, Zug

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel Febbraio 2023 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

