

Information destinée aux patients

Lisez attentivement la notice d'emballage avant de prendre le médicament. Ce médicament vous a été remis sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Quentakehl® D4, capsules

Médicament homéopathique

Quand Quentakehl® D4, capsules est-il utilisé?

Selon la conception homéopathique, Quentakehl® D4, capsules peut être utilisé sur ordonnance médicale en cas d'affections grippales.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si Quentakehl® D4, capsules peut être pris simultanément. Si les troubles persistent, il faut informer le médecin.

Quand Quentakehl® D4, capsules ne doit-il pas être utilisé ou seulement avec précaution?

Quentakehl® D4, capsules ne doit pas être utilisé en cas d'allergie contre la pénicilline et pour les enfants et les adolescents de moins de 18 ans.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien, si

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication).

Quentakehl® D4, capsules peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis du médecin ou du pharmacien.

Comment utiliser Quentakehl® D4, capsules?

Sauf prescription contraire du médecin, Adultes : prendre 1-3 capsules par jour avant le petit déjeuner ou le soir avant le coucher, avec un peu de liquide. Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit.

L'utilisation et la sécurité de Quentakehl® D4, capsules n'ont à ce jour pas été testées chez les enfants ni les adolescents de moins de 18 ans.

Adressez vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires Quentakehl® D4, capsules peut-il provoquer?



L'utilisation de Quentakehl® D4, capsules peut provoquer les effets secondaires suivants: Des réactions allergiques contre la pénicilline et semblables. Si vous remarquez des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. L'utilisation de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec Quentakehl® D4, capsules et informez-en votre médecin ou votre pharmacien.

A quoi faut-il encore faire attention?

Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «À utiliser jusqu'au » sur la récipient. Garder le médicament hors de portée des enfants. Conserver à température ambiante (15-25 °C). Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Que contient Quentakehl® D4, capsules?

1 capsule contient:

330mg Penicillium glabrum D4 trituration (HAB; 6).

Cette préparation contient en outre des excipients: lactose; capsule: hypromellose.

Numéro d'autorisation

54123 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Quentakehl® D4, capsules? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie, sur ordonnance médicale.

Emballage à 20 capsules.

Titulaire de l'autorisation

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlindach

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en mars 2004 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

