

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di far uso del medicamento. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Questo medicamento potrebbe nuocere alla loro salute. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Quentakehl® D4, capsule

Medicamento omeopatico

Quando si usa Quentakehl® D4, capsule?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici, Quentakehl® D4, capsule può essere usato su prescrizione del suo medico in caso di infezioni grippali.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere Quentakehl® D4, capsule. Se i sintomi persistono, bisogna consultare un medico.

Quando non si può assumere Quentakehl® D4, capsule e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

Quentakehl® D4, capsule non può essere usato in caso di allergia contro la penicillina e nei bambini e negli adolescenti sotto i 18 anni. Informi il suo medico o il suo farmacista se

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume o applica esternamente altri medicinali (anche se acquistati di propria iniziativa).

Si può assumere Quentakehl® D4, capsule durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia non sono ancora stati eseguiti studi scientifici sistematici. Per precauzione dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al suo medico o al suo farmacista.

Come usare Quentakehl® D4, capsule?

Salvo diversa prescrizione medica, adulti : prendere 1-3 capsule prima della colazione o alla sera prima di andare a letto, con un po' di liquido. Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. L'uso e la sicurezza dell Quentakehl® D4, capsule nei bambini e negli adolescenti sotto i 18 anni finora non sono stati esaminati. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali può avere Quentakehl® D4, capsule?

In seguito all'applicazione di Quentakehl® D4, capsule possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali: Reazioni allergiche contro la penicillina e simili. Se osserva effetti collaterali non menzionati, dovrebbe



informare il suo medico o il suo farmacista. Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con Quentakehl® D4, capsule e informi il suo medico o il suo farmacista.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicinale non deve essere utilizzato oltre la data indicata con „verwendbar bis“ sulla confezione. Conservare il medicinale fuori dalla portata dei bambini. Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C). Il medico, il farmacista possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Quentakehl® D4, capsule?

1 capsula contiene:

330 mg Penicillium glabrum D4 trituratio (HAB; 6).

Questo preparato contiene eccipienti supplementari: lattosio e ipromellosa (capsula).

Numero dell'omologazione

54123 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Quentakehl® D4, capsule? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia dietro presentazione della prescrizione medica.

Imballaggi di 20 capsule.

Titolare dell'omologazione

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlindach

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel marzo 2004 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

