

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente questo foglio prima di prendere o usare questo medicinale. Questo medicinale ti è stato prescritto personalmente e non devi darlo a nessun altro. Anche se presentano i tuoi stessi sintomi di malattia, il medicinale potrebbe danneggiarli.

Conserva il foglio illustrativo, potresti rileggerlo più tardi.

Lisinopril Spirig HC®

Spirig HealthCare AG

Che cos'è Lisinopril Spirig HC e quando si usa?

Lisinopril Spirig HC è un medicinale usato per trattare la pressione alta e l'insufficienza cardiaca (insufficienza cardiaca, gittata cardiaca insufficiente), nonché nei pazienti che hanno avuto un attacco cardiaco. Lisinopril Spirig HC è anche somministrato a pazienti diabetici che soffrono di alcune disfunzioni renali associate al diabete. Lisinopril Spirig HC appartiene ad un gruppo di medicinali chiamati ACE inibitori. Lisinopril Spirig HC dilata i vasi sanguigni e quindi aiuta ad abbassare la pressione sanguigna e a migliorare le prestazioni cardiache.

Lisinopril Spirig HC deve essere utilizzato solo su prescrizione medica.

Quando non si può usare Lisinopril Spirig HC?

Se è allergico a uno qualsiasi degli ingredienti o se ha avuto prurito, orticaria, calo improvviso della pressione sanguigna, gonfiore delle mani, dei piedi o delle caviglie, del viso, delle labbra, della lingua o della gola (difficoltà a deglutire o respirare) durante l'assunzione di un medicinale che abbassa la pressione sanguigna, non prenda Lisinopril Spirig HC. Anche se uno dei tuoi familiari ha manifestato segni simili di malattia per qualsiasi altro motivo, dovresti consultare il tuo medico o il tuo medico. Informa il tuo medico.

Se soffri di diabete mellito (tipo 1 o tipo 2) o hai una funzionalità renale compromessa e stai assumendo medicinali contenenti aliskiren per abbassare la pressione sanguigna (ad esempio Rasilez®), non prenda Lisinopril Spirig HC.

Lisinopril Spirig HC non deve essere usato in combinazione con medicinali contenenti la combinazione di principi attivi sacubitril/valsartan (usato per trattare l'insufficienza cardiaca) o racecadotril (usato per trattare la diarrea) perché esiste un aumento del rischio di angioedema (gonfiore del viso, degli occhi, delle labbra o lingua, problemi respiratori).

Se sei incinta o stai allattando, non prendere Lisinopril Spirig HC.

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione di Lisinopril Spirig HC?

Questo medicinale può influenzare la reattività, la capacità di guida e la capacità di utilizzare strumenti o macchinari! Ciò vale in misura maggiore all'inizio del trattamento e quando si cambiano i preparativi, nonché in relazione all'alcol.

Il medico curante dovrebbe essere a conoscenza di tutte le malattie che ha avuto o di cui soffre attualmente, in particolare glicemia alta (diabete) e malattie renali (grave restringimento delle arterie renali). Il tuo medico risp. Il medico dovrebbe essere informato anche se soffre di un restringimento dell'aorta o di un ingrossamento patologico del muscolo cardiaco. Informatelo anche se state seguendo una dieta o se soffrite di diarrea o vomito. Se nota gonfiore del viso, degli occhi, delle labbra o della lingua dopo aver preso Lisinopril Spirig HC, o se ha difficoltà a respirare, lo riferisca immediatamente al medico o all'operatore sanitario. Non continui a prendere Lisinopril Spirig HC senza parlare con il medico.

Se sta assumendo i cosiddetti inibitori di mTOR, come temsirolimus, everolimus, sirolimus o medicinali con inibitori NEP, come racecadotril o sacubitril, il medico o la dottoressa deve avvisarla. Il medico dovrebbe esserne consapevole perché può aumentare il rischio di angioedema. I segni di angioedema includono gonfiore del viso, delle labbra, della lingua e/o della gola con difficoltà a deglutire e a respirare.

Se deve sottoporsi a dialisi, deve informare il personale medico competente che sta assumendo Lisinopril Spirig HC (un ACE inibitore), poiché in questo caso alcune membrane filtranti del sangue o alcune



procedure di dialisi potrebbero non essere utilizzate. Se è necessario un intervento chirurgico, deve informare il medico in anticipo che sta assumendo Lisinopril Spirig HC.

Se vuole sottoporsi ad una terapia desensibilizzante contro le punture di api o vespe, informi prima il medico o il medico curante. Il tuo medico perché la tua terapia con Lisinopril Spirig HC deve essere modificata. Raramente possono verificarsi reazioni allergiche dopo punture di insetti.

L'uso di Lisinopril Spirig HC in associazione con medicinali contenenti il principio attivo aliskiren non è raccomandato.

In rari casi, Lisinopril Spirig HC può aumentare l'effetto dell'insulina o dei farmaci antidiabetici orali. Se soffre di diabete ed è in trattamento con insulina o farmaci antidiabetici orali, deve quindi prestare particolare attenzione ai segni di ipoglicemia (ipoglicemia).

Alcuni medicinali possono influenzare il modo in cui agisce Lisinopril Spirig HC. Pertanto, informi il medico o il medico se sta assumendo uno qualsiasi dei seguenti medicinali:

- diuretici,
- medicinali antipertensivi, compresi quelli contenenti il principio attivo aliskiren,
- medicinali che contengono integratori di potassio o sali sostitutivi contenenti potassio e altri medicinali che possono aumentare i livelli sierici di potassio;
- alcuni medicinali per i reumatismi (indometacina), l'artrite, i dolori muscolari o la depressione e iniezioni d'oro (come l'aurotiomato di sodio), comunemente usati per il trattamento dell'artrite reumatoide cronica,
- Medicinali contenenti litio per la depressione,
- medicinali per il trattamento del cancro (ad esempio everolimus) e medicinali che prevengono il rigetto di un organo trapiantato, ad esempio rene o fegato (ad esempio temsirolimus, sirolimus),
- Racecadotril per il trattamento della diarrea,
- Alteplase, un fibrinolitico utilizzato per sciogliere i coaguli di sangue in varie malattie vascolari,
- Medicinali contenenti la combinazione di principi attivi sacubitril/valsartan (usati per il trattamento dell'insufficienza cardiaca).

Quando prende le compresse per la prima volta, la pressione sanguigna può essere influenzata maggiormente rispetto al trattamento successivo. Se la sua pressione sanguigna è molto bassa, si sente debole e/o ha delle vertigini, si sdrai fino a quando non si sente meglio e informi il medico.

Lisinopril Spirig HC non deve essere somministrato a bambini e adolescenti.

Informi il medico o il farmacista oppure il medico o il farmacista se lo desidera

- soffrono di altre malattie,
- avere allergie o
- prendere altri medicinali (compresi quelli acquistati autonomamente!) o usarli esternamente.

Si può usare Lisinopril Spirig HC durante la gravidanza o l'allattamento?

Informa il tuo medico o il tuo medico se sei incinta o stai pianificando una gravidanza. Lisinopril Spirig HC non deve essere assunto durante la gravidanza e l'allattamento.

Come usare Lisinopril Spirig HC?

Lisinopril Spirig HC può essere assunto prima, durante o dopo i pasti. Lisinopril Spirig HC viene somministrato una volta al giorno, se possibile alla stessa ora. Le compresse con scanalature sono adatti per il dosaggio delle unità dividendo le compresse.

La dose di Lisinopril Spirig HC deve essere determinata dal medico.

È importante che lei si sottoponga regolarmente ai controlli dal medico mentre assume Lisinopril Spirig HC in modo che la terapia possa essere adattata ai suoi sintomi individuali.



Adulti

Per la pressione alta

Il tuo medico risp. Il medico adatterà il dosaggio alle tue condizioni di salute. La dose iniziale abituale è una compressa di Lisinopril Spirig HC 10 mg una volta al giorno. La dose di mantenimento è solitamente una compressa di Lisinopril Spirig HC 20 mg una volta al giorno. Vengono presi in considerazione anche gli altri medicinali che sta assumendo. Se ha già assunto diuretici prima di iniziare la terapia o sta seguendo una dieta povera di sale, sarà il medico o la dottoressa a consigliarla. Il medico interromperà l'assunzione del diuretico 23 giorni prima del trattamento oppure ridurrà la dose iniziale di Lisinopril Spirig HC.

Nell'insufficienza cardiaca

Se i diuretici e/o la digitale non hanno un effetto sufficiente, può essere somministrato anche Lisinopril Spirig HC. Il trattamento dell'insufficienza cardiaca deve essere effettuato solo sotto stretto controllo medico. Il dosaggio viene stabilito dal medico e serve ad integrare un trattamento già in corso (solitamente digitale e/o diuretico). La dose di mantenimento abituale è di 520 mg di Lisinopril Spirig HC una volta al giorno.

Dopo l'infarto

Di solito, il paziente riceve 5 mg di Lisinopril Spirig HC il giorno 1 e il giorno 2, seguiti da 10 mg di Lisinopril Spirig HC una volta al giorno.

Nei pazienti con diabete mellito con determinate compromissioni renali

La dose abituale è di 10 mg o 20 mg di Lisinopril Spirig HC, somministrati una volta al giorno.

Bambini e adolescenti con pressione sanguigna alta

Per i bambini dai 6 anni di età e gli adolescenti, la dose dipende dal peso e viene determinata individualmente dal medico. L'uso di Lisinopril Spirig HC non è raccomandato nei bambini di età inferiore a 6 anni e nei bambini e adolescenti con grave danno renale.

Non modificare autonomamente il dosaggio prescritto. Se ritieni che il medicinale sia troppo debole o troppo forte, parla con il medico o il farmacista.

Quali effetti collaterali può avere Lisinopril Spirig HC?

Durante l'assunzione di Lisinopril Spirig HC possono verificarsi i seguenti effetti collaterali:

Molto comune (colpisce più di una persona su 10):

Vertigini, mal di testa, pressione bassa (soprattutto quando ci si alza), aritmie cardiache, tosse, diarrea e vomito.

Non comune (colpisce da 1 a 10 persone su 1'000):

Perdita di appetito, sbalzi d'umore, formicolio alle mani e ai piedi, depressione, disturbi del gusto, disturbi del sonno, allucinazioni, palpitazioni, aumento del polso, naso che cola, respiro corto, mal di gola, raucedine, bronchite, nausea, dolore addominale, indigestione, eruzione cutanea, prurito, impotenza, stanchezza, esaurimento e dolore al petto.

Raro (colpisce da 1 a 10 pazienti su 10'000):

Gotta, confusione, disturbi olfattivi, polmonite, secchezza delle fauci, stitichezza, orticaria, perdita di capelli, psoriasi, insufficienza renale e bassi livelli di sodio nel sangue (possibili sintomi: affaticamento, mal di testa, nausea e vomito).

Molto raro (interessa meno di 1 su 10'000):

Bassi livelli di zucchero nel sangue (ipoglicemia), infiammazione dei seni e della mucosa orale, forte dolore addominale superiore (infiammazione del pancreas), ittero, aumento della sudorazione e gravi alterazioni della pelle (con sintomi quali arrossamento, vesciche, reazioni di desquamazione e noduli).



Durante il trattamento con Lisinopril Spirig HC possono verificarsi alterazioni della conta ematica. È quindi possibile che il medico le prenda il sangue di tanto in tanto per vedere se Lisinopril Spirig HC ha un effetto sul suo emocromo. Tale effetto potrebbe manifestarsi sotto forma di stanchezza o mal di gola.

Dal lancio sul mercato in alcuni pazienti sono state osservate gravi reazioni allergiche

Se manifesta gonfiore del viso, delle labbra, della lingua o della gola (difficoltà a deglutire o respirare) mentre assume Lisinopril Spirig HC, interrompa l'assunzione di Lisinopril Spirig HC e informi immediatamente il medico o l'operatore sanitario. Interrompere il trattamento anche in caso di forte prurito della pelle con gonfiore. Anche se queste reazioni possono essere temporanee, occorre rimanere sotto osservazione medica fino alla scomparsa dei segni, con o senza contromisure farmacologiche.

Se notate effetti collaterali, contattate il vostro medico o il farmacista. Il tuo medico o il farmacista. Ciò vale in particolare per gli effetti collaterali non specificati in questo foglio illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Durata

Il medicinale deve essere utilizzato solo fino alla data contrassegnata con «EXP» sul contenitore.

Nota sulla conservazione

Conservare a temperatura non superiore a 30 °C, nella confezione originale e fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni si rivolga al medico o al farmacista oppure al medico o al farmacista. Queste persone dispongono di informazioni specialistiche dettagliate.

Indicazioni per lo smaltimento

Non gettare i medicinali nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. I medicinali scaduti o non più necessari, in uso nelle economie domestiche, possono essere consegnati nelle farmacie o nei punti di raccolta. Queste misure aiutano a proteggere l'ambiente.

Cosa contiene Lisinopril Spirig HC?

Principi attivi

Lisinopril (come lisinopril diidrato)

Sostanze ausiliarie

Calcio fosfato dibasico diidrato, mannitol (E 421), amido pregelatinizzato, amido di mais, magnesio stearato, silice colloidale.

Numero dell'omologazione

56903 (Swissmedic).

Dove è ottenibile Lisinopril Spirig HC? Quali confezioni sono disponibili?

Lisinopril Spirig HC è disponibile solo in farmacia con prescrizione medica.

Lisinopril Spirig HC 5 mg: compresse con scanalatura (divisibili) in confezioni da 30 o 100 compresse.

Lisinopril Spirig HC 10 mg: compresse con scanalatura (divisibili in 4 pezzi) in confezioni da 30 o 100 compresse.

Lisinopril Spirig HC 20 mg: compresse con scanalatura (divisibili in 4 pezzi) in confezioni da 30 o 100 compresse.

Titolare dell'omologazione

Spirig HealthCare SA, 4622 Egerkingen



Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nell'aprile 2024 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

