

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament. Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Terbinafine Spirig HC® Crème

Spirig HealthCare AG

Qu'est-ce que la Terbinafine Spirig HC crème et quand doit-elle être utilisée?

Terbinafine Spirig HC crème est un médicament destiné au traitement des infections de la peau causées par des champignons (dermatophytes), comme par exemple les mycoses des pieds, les mycoses superficielles de la peau et le Pityriasis versicolor.

La crème Terbinafine Spirig HC est, en plus, efficace contre les mycoses causées par des levures (candidose de la peau).

La crème Terbinafine Spirig HC supprime les symptômes tels que démangeaisons, desquamations et rougeurs.

Chez la majorité des patients avec des mycoses des pieds aucune récurrence n'était survenue pendant 2 mois après un traitement d'une semaine avec Terbinafine Spirig HC.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Afin de prévenir les mycoses, devront être observés les règles suivantes:

- Tous les jours, changez les vêtements qui ont été en contact avec les zones infectées de la peau.
- Evitez de porter des vêtements trop justes ou peu perméables à l'air.
- Séchez soigneusement les parties cutanées atteintes après le lavage.
- Changez tous les jours de serviette de toilette.
- Si vous souffrez d'une mycose des pieds, ne marchez pas pieds nus. De plus, saupoudrez ou vaporisez chaque jour l'intérieur de vos chaussettes ou de vos chaussures avec une poudre ou un spray efficace contre les mycoses.
- Lavez bien vos mains après utilisation et après contact avec les parties cutanées atteintes, afin d'empêcher l'infection fongique de se propager.

Quand Terbinafine Spirig HC crème ne doit-elle pas être utilisée?

N'utilisez pas Terbinafine Spirig HC en cas d'hypersensibilité au principe actif terbinafine ou à l'un des excipients selon la composition (cf. «Que contient Terbinafine Spirig HC crème ?»).

L'utilisation de Terbinafine Spirig HC crème n'a pas été établie pour les enfants de moins de 12 ans. Faute d'expérience clinique, l'utilisation de Terbinafine Spirig HC crème chez l'enfant de moins de 12 ans n'est pas recommandée.

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Terbinafine Spirig HC crème?

La crème Terbinafine Spirig HC est réservée à l'usage externe uniquement. Évitez tout contact avec les yeux. Des irritations oculaires peuvent se produire en cas de contact accidentel avec les yeux. Si du produit entre en contact avec les yeux, rincez-les immédiatement soigneusement à l'eau courante. Consultez votre médecin si des troubles persistent.

Les nourrissons et enfants en bas âge ne doivent pas entrer en contact avec les zones traitées, y compris la poitrine.



Terbinafine Spirig HC crème contient de l'alcool cétylique et de l'alcool stéarylique qui peuvent provoquer des réactions cutanées locales.

Terbinafine Spirig HC contient 10 mg d'alcool benzylique par gramme. L'alcool benzylique peut provoquer des réactions allergiques et une légère irritation locale.

Lors de mycoses importantes ou lorsque la mycose atteint aussi les ongles, consultez votre médecin.

N'appliquez aucun autre médicament sur les parties cutanées traitées.

Veillez informer votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste si:

- Vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique ou
- vous utilisez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication!).

Terbinafine Spirig HC crème peut-elle être utilisée pendant la grossesse ou l'allaitement?

Grossesse

Pendant la grossesse, Terbinafine Spirig HC crème ne doit pas être utilisée que sur ordonnance médicale expresse. Si vous planifiez une grossesse, consultez d'abord votre médecin avant d'utiliser Terbinafine Spirig HC.

Allaitement

Pendant l'allaitement, Terbinafine Spirig HC crème ne doit pas être utilisée. Les nourrissons et enfants en bas âge ne doivent pas entrer en contact avec les parties cutanées traitées, y compris la poitrine.

Comment utiliser Terbinafine Spirig HC crème?

Avant d'appliquer Terbinafine Zentiva, lavez soigneusement les parties cutanées atteintes avec un tampon d'ouate et de l'eau chaude puis séchez soigneusement.

Adultes et adolescents dès 12 ans

Terbinafine Spirig HC crème peut être appliqué une ou deux fois par jour (matin et/ou soir). Appliquez une couche mince de Terbinafine Zentiva crème sur et autour des parties cutanées atteintes, massez légèrement pour faire pénétrer. Lavez-vous soigneusement les mains et séchez-les après utilisation.

Schémas de traitement habituels

Mycoses des pieds, mycoses superficielles de la peau: appliquer 1 fois par jour pendant 1 semaine.

Mycose des pieds du type «pied mocassin» (mycose plantaire s'étendant aux bords latéraux des pieds): 2 fois par jour pendant 2 semaines.

Mycoses causées par des levures: appliquer 1-2 fois par jour pendant 1 semaine.

Pityriasis versicolor: appliquer 1-2 fois par jour pendant 2 semaines.

Pour éviter les rechutes, suivez le traitement comme il est décrit ci-dessus. Si les troubles s'aggravent ou si après 1 semaine aucune amélioration n'apparaît, consultez votre médecin.

Enfants de moins de 12 ans

L'utilisation et la sécurité de Terbinafine Spirig HC crème n'ont pas été établies à ce jour pour les enfants de moins de 12 ans.

Veillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin ou à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires Terbinafine Spirig HC crème peut-elle provoquer?

L'utilisation de Terbinafine Spirig HC peut provoquer les effets secondaires suivants:



Fréquent (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 100)

Desquamation, démangeaisons.

Occasionnel (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 1000)

Lésions de la peau, croûte, décolorations de la peau, rougeurs, sensation de brûlure sur la peau, douleurs ou irritations au niveau de la zone d'application.

Rare (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 10 000)

Sécheresse cutanée, dermatite de contact ou eczéma.

Très rare (concerne moins d'un utilisateur sur 10 000)

Éruption cutanée ou cloques (papules).

Si Terbinafine Spirig HC entre accidentellement en contact avec les yeux, des irritations oculaires peuvent survenir (cf. «Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Terbinafine Spirig HC crème?»).

Arrêtez le traitement par Terbinafine Spirig HC et informez immédiatement votre médecin dès l'apparition de l'un ou de ou plusieurs des symptômes suivants. Ils peuvent être le signe d'une réaction allergique:

- Troubles respiratoires ou problèmes de déglutition,
- enflure du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge,
- fortes démangeaisons cutanées avec éruptions rouges ou cloques (également au-delà de la zone d'application).

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

A quoi faut-il encore faire attention?

Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le l'emballage.

Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15–25 °C) dans l'emballage original et hors de la portée des enfants.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Terbinafine Spirig HC crème?

Principes actifs

1 g de crème contient 10 mg de chlorhydrate de terbinafine (correspondant à 8,8 mg de terbinafine).

Excipients

Hydroxyde de sodium, alcool benzylique, monostéarate de sorbitan, palmitate de cétyle, alcool cétylique, alcool cétostéarylique, polysorbate 60, myristate d'isopropyle, eau purifiée.

Numéro d'autorisation

57513 (Swissmedic).

Où obtenez-vous le Terbinafine Spirig HC crème? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie sans ordonnance médicale.



Tube de 15 g.

Titulaire de l'autorisation

Spirig HealthCare SA, 4622 Egerkingen.

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en novembre 2023 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

