

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni. Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico o del suo farmacista o del suo droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Terbinafina Spirig HC® Creme

Spirig HealthCare AG

Che cos'è Terbinafina Spirig HC e quando si usa?

Terbinafina Spirig HC crema sono medicamenti che vengono usati per il trattamento delle infezioni fungine della pelle provocate da dermatofiti, come p.e. micosi ai piedi, micosi superficiale della pelle, pitiriasis versicolor.

La crema è in più efficace contro le micosi causate da lieviti (candidose della pelle).

Terbinafina Spirig HC calma i sintomi generali quali prurito, desquamazione e arrossamento.

Presso la maggioranza dei pazienti con la micosi ai piedi nessuna recidiva si è presentata durante 2 mesi dopo un trattamento di una settimana con Terbinafina Spirig HC.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Per prevenire in modo efficace una micosi occorre rispettare alcune regole:

- Cambiare ogni giorno i vestiti che sono a contatto con la pelle malata.
- Evitare di portare dei vestiti aderenti e poco permeabili all'aria.
- Una volta lavata, asciugare accuratamente la pelle malata.
- Cambiare ogni giorno gli asciugamani.
- In caso di micosi ai piedi, non camminare a piedi nudi; cospargere ogni giorno l'interno delle calze e delle scarpe con un talco o uno spray antimicotico.
- Lavarsi bene le mani dopo l'uso e dopo il contatto con la pelle infetta. In questo modo è possibile evitare la diffusione dell'infezione fungina.

Quando non si può usare Terbinafina Spirig HC crema?

Terbinafina Spirig HC non può essere usato in caso di ipersensibilità al principio attivo terbinafina o ad una delle sostanze ausiliarie contenute nel preparato (vedere «Cosa contiene Terbinafina Spirig HC crema?»).

L'uso di Terbinafina Spirig HC crema nei bambini sotto i 12 anni non è stato esaminato. A causa della mancanza di esperienza clinica, l'uso di Terbinafina Spirig HC crema nei bambini al di sotto dei 12 anni non è raccomandato.

Quando è richiesta prudenza nell'uso di Terbinafina Spirig HC crema?

Terbinafina Spirig HC crema sono indicati solo per uso esterno; non devono entrare a contatto con gli occhi. Dopo un contatto accidentale con gli occhi possono comparire irritazioni agli occhi stessi. Se il preparato è entrato a contatto con gli occhi, bisogna lavarli immediatamente e accuratamente con acqua corrente. Consulti il suo medico se i disturbi non svaniscono.

I lattanti e i bambini piccoli non devono entrare in contatto con le aree cutanee trattate, incluso il seno.

Terbinafina Spirig HC crema contiene alcool cetilico e alcool stearilico che possono provocare reazioni cutanee locali.

Terbinafina Spirig HC contiene 10 mg di alcool benzilico per grammo. L'alcool benzilico può causare reazioni allergiche e una lieve irritazione locale.

Se le micosi sono estese o se anche le unghie sono infette, bisogna consultare il medico.



Non applicare altri medicinali sulle aree cutanee trattate.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere nel caso in cui:

- Soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume o applica esternamente altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa!).

Si può usare Terbinafina Spirig HC crema durante la gravidanza o l'allattamento?

Gravidanza

Durante la gravidanza, Terbinafina Spirig HC crema non può essere usato, eccetto su prescrizione medica. Se sta pianificando una gravidanza, usare Terbinafina Spirig HC solo dopo aver consultato un medico.

Allattamento

Durante l'allattamento non usare Terbinafina Spirig HC crema. I lattanti e i bambini piccoli non devono venire a contatto con le zone trattate, incluso il seno.

Come usare Terbinafina Spirig HC crema?

Prima dell'uso di Terbinafina Spirig HC, le aree cutanee malate devono essere pulite a fondo con un batuffolo di ovatta imbevuto di acqua calda, quindi asciugate.

Adulti e adolescenti dai 12 anni

Applicare Terbinafina Spirig HC crema in uno strato sottile una o due volte al giorno – mattina e/o sera – sulle aree cutanee malate e sulle parti che circondano la zona lesa, massaggiando leggermente per farla penetrare. Lavarsi e asciugarsi accuratamente le mani dopo l'uso.

Schemi usuali di trattamento

Micosi ai piedi, micosi superficiale della pelle: 1 settimana 1 volta al giorno.

Micosi ai piedi di tipo «piede a mocassino» (micosi alla pianta del piede e a lato di esso): 2 volte al giorno durante 2 settimane.

Micosi causate da lieviti: 1 settimana 1-2 volte al giorno.

Pitiriasis versicolor: 2 settimane 1-2 volte al giorno.

Per evitare una ricaduta, si attenga alla durata di trattamento indicata. Se i disturbi peggiorano o se dopo 1 settimana non si nota nessun miglioramento, bisogna consultare un medico.

Bambini sotto i 12 anni

L'uso e la sicurezza di Terbinafina Spirig HC crema nei bambini sotto i 12 anni non sono stati esaminati.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Terbinafina Spirig HC crema?

Con l'uso di Terbinafina Spirig HC possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali:

Comune (riguarda da 1 a 10 persone su 100)

Desquamazione cutanea, prurito.

Non comune (riguarda da 1 a 10 persone su 1000)

Lesioni cutanee, croste, alterazioni del colore della pelle, arrossamenti, sensazione di bruciore sulla pelle, dolore o irritazione in corrispondenza della zona di applicazione.

Raro (riguarda da 1 a 10 persone su 10 000)



Secchezza cutanea, dermatite da contatto o eczema.

Molto raro (riguarda meno di 1 persona su 10 000)

Eruzione cutanea o vescicole (papule).

Se Terbinafina Spirig HC viene accidentalmente a contatto con gli occhi, può verificarsi irritazione all'occhio (vedere «Quando è richiesta prudenza nell'uso di Terbinafina Spirig HC crema?»).

Interrompere il trattamento con Terbinafina Spirig HC e informare subito il proprio medico se si verificano uno o più dei seguenti sintomi che possono essere segni di una reazione allergica:

- Difficoltà di respirazione o deglutizione,
- gonfiore del viso, delle labbra, della lingua o della gola,
- grave prurito della pelle con eruzione cutanea rossa o vesciche (anche fuori dalla zona di applicazione).

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15–25 °C) nella confezione originale e fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Che cosa contengono Terbinafina Spirig HC crema?

Principi attivi

1 g di Terbinafina Spirig HC crema contiene 10 mg di idrocloruro di terbinafina (corrispondenti a 8,8 mg di terbinafina).

Sostanze ausiliarie

Idrossido di sodio, alcool benzilico, monostearato di sorbitano, palmitato di cetile, alcool cetilico, alcool cetostearilico, polisorbato 60, miristato di isopropile, acqua depurata.

Numero dell'omologazione

57513 (Swissmedic).

Dove è ottenibile Terbinafina Spirig HC? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Tubetto da 15 g.

Titolare dell'omologazione

Spirig HealthCare SA, 4622 Egerkingen.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel novembre 2023 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

