

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico, del suo farmacista o del suo droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Strepsils® Miele & Limone pastiglie

Reckitt Benckiser (Switzerland) AG

Che cos'è Strepsils Miele & Limone e quando si usa?

Strepsils Miele & Limone è costituito da pastiglie aventi attività antibatterica contro gli agenti delle infiammazioni della mucosa orale e viene impiegato per la terapia adiuvante locale delle infiammazioni di origine infettiva dello spazio orofaringeo.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

In linea di principio, in caso di infezioni batteriche occorre stabilire la necessità di una terapia antibiotica mirata.

In caso di sospetta infezione da funghi, occorre il trattamento con un adeguato antimicotico (medicamento per il trattamento mirato delle infezioni da funghi).

Nota per i diabetici: Una pastiglia contiene 2.5 g di carboidrati digeribili ed è adatto alle persone diabetiche.

Contiene zucchero, quindi ne potrebbe essere favorita la formazione della carie. Occorre pertanto osservare un'accurata igiene dentale.

Quando non si può usare Strepsils Miele & Limone?

Strepsils Miele & Limone non dovrà essere usato se lei fosse ipersensibile (allergico) a uno dei componenti di Strepsils Miele & Limone.

Non è adatto ai bambini di età inferiore ai 6 anni.

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione di Strepsils Miele & Limone?

In caso di gravi infiammazioni o dolori alla gola che si accompagnano a febbre elevata, mal di testa, nausea o vomito e che persistano per più di 3 giorni, occorre consultare un medico.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui soffre di altre malattie, soffre di allergie o assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa)!

Utilizzi Strepsils Miele & Limone solo dopo averne discusso con il suo medico se sa di soffrire di un'intolleranza agli zuccheri.

Questo medicamento contiene 0.98 g di glucosio e 1.44 g di saccarosio per dose. Da tenere in considerazione in persone affette da diabete mellito.

Può essere dannoso per i denti.

Questo medicamento contiene solo una piccolissima quantità di glutine (dall'amido di frumento). È considerato «senza glutine» ed è molto improbabile che possa causarle problemi se è celiaco.

Una pastiglia contiene non più di 19.52 microgrammi di glutine.

Se lei è allergico al frumento (condizione diversa dalla celiachia) non prenda questo medicamento.

Questo medicamento contiene un profumo con citrale, d-limonene, geraniolo e linalolo che possono provocare reazioni allergiche.

Questo medicamento contiene zolfo diossido (E220) che raramente può causare gravi reazioni di ipersensibilità e costrizione bronchiale (broncospasmo).



Si può usare Strepsils Miele & Limone durante la gravidanza o l'allattamento?

Per prudenza, durante la gravidanza e l'allattamento dovrebbe, nei limiti del possibile, rinunciare all'assunzione di medicinali o chiedere consiglio al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Come usare Strepsils Miele & Limone?

Per l'impiego nello spazio orofaringeo.

Impieghi Strepsils Miele & Limone sempre scrupolosamente secondo le istruzioni riportate in questo foglietto illustrativo. Si dovrebbe sempre utilizzare la dose più bassa per il periodo di tempo più breve possibile fino al conseguimento della scomparsa dei disturbi. Per favore, chiedi al tuo medico, al tuo farmacista o al tuo droghiere nel caso non fosse assolutamente sicuro.

Salvo diversa prescrizione del medico, la dose abituale per gli adulti e per i bambini con età superiore ai 12 anni è di una pastiglia da lasciare sciogliere in bocca ogni 2 - 3 ore. Come per tutti i tipi di pastiglie, per evitare una irritazione della mucosa orale, si consiglia di cambiare la posizione della pastiglia in bocca durante il suo scioglimento.

La dose giornaliera non dovrebbe superare le 8 pastiglie.

Bambini dai 6 ai 12 anni: in base al bisogno, una pastiglia ogni 4 ore da lasciar sciogliere in bocca. La dose giornaliera non dovrebbe superare le 4 pastiglie.

Strepsils Miele & Limone non è adatto ai bambini di età inferiore ai 6 anni.

Non impieghi Strepsils Miele & Limone oltre 3 giorni senza aver consultato il medico.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritto dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Se usato correttamente è da escludere un sovradosaggio con Strepsils Miele & Limone e finora non si è a conoscenza di nessun caso.

In caso di assunzione accidentale di numerose pastiglie di Strepsils Miele & Limone, contatti immediatamente il suo medico.

Quali effetti collaterali può avere Strepsils Miele & Limone?

Come tutti i medicinali, Strepsils Miele & Limone può avere effetti collaterali.

Non comune (riguarda da 1 a 10 persone su 1000)

Occasionalmente possono presentarsi reazioni di ipersensibilità come eruzione cutanea, gonfiore doloroso di origine allergica a livello della cute e delle mucose soprattutto nella zona del viso, orticaria, affanno dovuto a restringimento delle vie respiratorie, pressione bassa con perdita di coscienza di breve durata e sensazione spiacevole in bocca. La sensazione spiacevole in bocca può manifestarsi sotto forma di irritazioni nella zona della faringe, disturbo della sensibilità nel cavo orale (formicolio o «intorpidimento») della pelle, gonfiore e bruciore alla lingua.

Le reazioni di ipersensibilità, di regola, regrediscono rapidamente dopo la sospensione del medicamento.

Se dovesse presentarsi una di queste manifestazioni che potrebbero comparire sin dal primo impiego, occorrerà interpellare immediatamente un medico.

Molto raro (riguarda meno di 1 persona su 10'000)

In casi molto rari si manifestano disturbi di digestione e nausea.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.



Istruzioni di conservazione

Non conservare a temperature superiori a 25°C.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Strepsils Miele & Limone?

Una pastiglia contiene:

Principi attivi

1.2 mg di alcool 2,4-diclorobenzilico e 0.6 mg di amilmetacresolo.

Sostanze ausiliarie

Saccarosio, glucosio, amido di frumento (contiene glutine), zolfo diossido (E220), miele (contiene zucchero invertito), acido tartarico, olio di menta piperita, olio di limone (contiene d-limonene, citrale, geraniolo, linalolo), giallo di chinolina (E104), acqua depurata.

Numero dell'omologazione

58440 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Strepsils Miele & Limone? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezioni da 24 pastiglie.

Titolare dell'omologazione

Reckitt Benckiser (Switzerland) AG, 8304 Wallisellen

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nell'agosto 2021 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

