

Information für Patientinnen und Patienten

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, denn sie enthält wichtige Informationen.

Dieses Arzneimittel haben Sie entweder persönlich von Ihrem Arzt bzw. von Ihrer Ärztin verschrieben erhalten, oder Sie haben es ohne ärztliche Verschreibung in der Apotheke oder Drogerie bezogen. Wenden Sie das Arzneimittel gemäss Packungsbeilage beziehungsweise nach Anweisung des Arztes, Apothekers oder Drogisten bzw. der Ärztin, Apothekerin oder Drogistin an, um den grössten Nutzen zu haben. Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

Korolind, Tropfen

Homöopathisches Arzneimittel

Wann wird Korolind angewendet?

Gemäss homöopathischem Arzneimittelbild kann Korolind zur Besserung des Befindens bei Herz-Kreislauf-Störungen angewendet werden.

Die Anwendung des Arzneimittels ersetzt nicht andere vom Arzt diesbezüglich verordnete Arzneimittel.

Wenn unregelmässiger Puls, starkes Herzklopfen, stechende Schmerzen in der Brustgegend und Atemnot plötzlich auftreten oder länger andauern, ist die Konsultation einer Ärztin bzw. eines Arztes angezeigt. Sie werden feststellen, ob das Herz oder die Gefässe organisch erkrankt sind oder ob die Beschwerden nervös bedingt sind.

Was sollte dazu beachtet werden?

Wenn Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin andere Arzneimittel verordnet hat, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, ob Korolind gleichzeitig eingenommen werden darf.

Wann darf Korolind nicht oder nur mit Vorsicht eingenommen werden?

Korolind darf nicht eingenommen werden,

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber einem der Bestandteile sind,
- von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren.

Bei Einnahme von Korolind mit anderen Arzneimitteln sind bisher keine Wechselwirkungen bekannt geworden.

In der Homöopathie ist bekannt, dass die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden kann.

Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie

- an anderen Krankheiten leiden,
- Allergien haben oder
- andere Arzneimittel (auch selbst gekaufte!) anwenden.

Enthält 53 Vol.-% Alkohol.

Darf Korolind während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit eingenommen werden?



Aufgrund der bisherigen Erfahrungen ist bei bestimmungsgemässer Anwendung kein Risiko für das Kind bekannt. Systematische wissenschaftliche Untersuchungen wurden aber nie durchgeführt. Vorsichtshalber sollten Sie während der Schwangerschaft und Stillzeit möglichst auf Arzneimittel verzichten oder den Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. die Ärztin, Apothekerin oder Drogistin um Rat fragen.

Wie verwenden Sie Korolind?

Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt oder von der Ärztin verschriebene Dosierung. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. mit Ihrer Ärztin, Apothekerin oder Drogistin. Soweit nicht anders verordnet, nehmen Erwachsene 1- bis 3-mal täglich 5 Tropfen ein. Das Mittel sollte auf Zucker oder Brot gegeben werden, da es in Wasser nicht löslich ist. Falls der medizinische Geschmack nicht stört, kann Korolind auch unverdünnt auf die Zunge getropft werden.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Die Wirkungsdauer einer Arzneimittelgabe kann individuell verschieden sein.

Auch homöopathische Medikamente sollten ohne medizinischen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Korolind darf nicht eingenommen werden von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren.

Welche Nebenwirkungen kann Korolind haben?

Bei Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). Setzen Sie Korolind bei andauernder Verschlechterung ab und informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin. Für Korolind sind bisher bei bestimmungsgemäsem Gebrauch keine Nebenwirkungen beobachtet worden. Wenn Sie dennoch Nebenwirkungen beobachten, informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Was ist ferner zu beachten?

Bei Raumtemperatur (15-25°C) und ausserhalb der Reichweite von Kindern lagern.

Die angebrochene Flasche ist 3 Monate haltbar.

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit «Exp.» bezeichneten Datum verwendet werden.

Was ist in Korolind enthalten?

10 g Mischung (entsprechend 10,6 ml) enthalten als Wirkstoffe:

Crataegus Urtinktur 7,5 g

Camphora D1 2,5 g

Enthält 53 Vol.-% Alkohol.

1 ml entspricht 24 Tropfen.

Zulassungsnummer

66762 (Swissmedic)

Wo erhalten Sie Korolind? Welche Packungen sind erhältlich?



In Apotheken und Drogerien, ohne ärztliche Verschreibung.

Flaschen à 10 ml, 40 ml und 100 ml

ZulassungsinhaberIn

steinberg pharma ag, 8400 Winterthur

HerstellerIn

Robugen GmbH Pharmazeutische Fabrik, D-73730 Esslingen

Diese Packungsbeilage wurde im Dezember 2018 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

