

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Korolind, Gouttes

Médicament homéopathique

Quand Korolind est-il utilisé?

Selon la conception homéopathique, Korolind peut être utilisé pour améliorer l'état de santé en cas de troubles cardiovasculaires.

La prise de ce médicament ne remplace en aucun cas d'autres médicaments éventuellement prescrits par un médecin. Il est recommandé de consulter un médecin en cas de symptômes soudains ou durables tels qu'un rythme cardiaque irrégulier, des palpitations importantes, des douleurs thoraciques aiguës ou une dyspnée. Vous pourrez ainsi déterminer si votre cœur ou si vos vaisseaux sont atteints d'une maladie organique ou si vos symptômes sont d'ordre nerveux.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si Korolind peut être pris simultanément.

Quand Korolind ne doit-il pas être pris ou seulement avec précaution?

Korolind ne doit pas être utilisé,

- si vous êtes hypersensible (allergique) à l'un des ingrédients,
- chez l'enfant et l'adolescent de moins de 18 ans.

Aucune interaction n'est connue à ce jour en cas de prise de Korolind avec d'autres médicaments.

Il est connu en homéopathie que les effets d'un médicament homéopathique peuvent être altérés par certains facteurs nuisibles au mode de vie et par des stimulants.

Veillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments (même en automédication!).

Contient 53% d'alcool.

Korolind peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si ce médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre



droguiste.

Comment utiliser Korolind?

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Sauf prescription contraire, la posologie pour un adulte est de 5 gouttes à prendre 1 à 3 fois par jour.

Prendre les gouttes sur un sucre ou du pain, car elles ne sont pas solubles dans l'eau. Si le goût de médicament ne gêne pas, Korolind peut aussi être déposé sur la langue.

Dès que les symptômes s'améliorent, réduire la fréquence d'utilisation.

La durée de l'effet d'un médicament peut varier selon les individus.

Les médicaments homéopathiques ne doivent pas être pris pendant une longue durée sans avis médical.

Korolind ne doit pas être utilisé chez l'enfant et l'adolescent de moins de 18 ans.

Quels effets secondaires Korolind peut-il provoquer?

La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale).

Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec Korolind et informez-en votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Aucun effet secondaire de Korolind n'a été constaté à ce jour en cas d'usage conforme à celui auquel le médicament est destiné.

Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

À quoi faut-il encore faire attention?

Conserver à température ambiante (15-25°C) et hors de portée des enfants.

Le flacon se conserve 3 mois après ouverture.

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention <EXP> sur le récipient.

Que contient Korolind?

10 g (correspondant à 10.6 ml) de mélange contiennent les substances actives:

Crataegus teinture mère 7.5 g

Camphora D1 2.5 g

Contient 53% d'alcool.

1 ml correspond à 24 gouttes.

Numéro d'autorisation

66762 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Korolind? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Flacon de 10 ml, 40 ml et 100 ml



Titulaire de l'autorisation

steinberg pharma ag, 8400 Winterthur

Fabricant

Robugen GmbH Pharmazeutische Fabrik, D-73730 Esslingen

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en décembre 2018 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

