

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico, del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Korolind, Gocce

Medicamento omeopatico

Quando si usa Korolind?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici Korolind può essere usato per ottenere un miglioramento delle condizioni in presenza di disturbi cardiovascolari.

L'uso del medicamento non sostituisce altri farmaci prescritti dal medico. In caso di improvvisi o prolungati disturbi, quali irregolarità del polso, forti palpitazioni, dolori pungenti nella zona toracica ed insufficienza respiratoria sarà opportuno consultare un medico. Quest'ultimo stabilirà se il cuore o i vasi sanguigni sono colpiti da una patologia organica o se i disturbi sono di natura nervosa.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o farmacista se simultaneamente può assumere Korolind.

Quando non si può usare Korolind e quando il suo uso richiede prudenza?

Korolind non deve essere usato

- in caso di ipersensibilità (allergica) ad uno dei componenti,
- nei bambini e negli adolescenti di età inferiore a 18 anni.

A tutt'oggi non sono note interazioni in caso di assunzione di Korolind con altri medicinali.

In omeopatia si sa che l'effetto di un medicamento omeopatico può essere pregiudicato da fattori generalmente dannosi dello stile di vita e da sostanze eccitanti o dal ricorso a generi voluttuari.

Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa).

Contiene 53% vol. di alcool.

Si può usare Korolind durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico, farmacista o droghiere.



Come usare Korolind?

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Salvo diversamente prescritto, agli adulti si consiglia l'assunzione di 5 gocce 1-3 volte al giorno. Assumere il rimedio versando le gocce su zucchero o pane, in quanto il prodotto non è solubile in acqua. Se il gusto del medicamento non risulta sgradevole, Korolind gocce può essere versato non diluito direttamente sulla lingua.

Con remissione dei sintomi, diminuire la frequenza delle somministrazioni.

La durata dell'effetto di una somministrazione può essere diversa da soggetto a soggetto.

Anche i medicinali omeopatici non dovrebbero essere assunti per periodi prolungati, se non dietro consiglio medico.

Korolind non deve essere usato nei bambini e negli adolescenti di età inferiore a 18 anni.

Quali effetti collaterali può avere Korolind?

Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con Korolind e informi il suo medico, farmacista o droghiere.

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto di Korolind. Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico, farmacista o droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Conservare a temperatura ambiente (15-25 C) e fuori dalla portata dei bambini.

Una volta iniziato, il flacone si conserva per 3 mesi.

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Cosa contiene Korolind?

10 g di miscela (pari a 10,6 ml) contengono come principi attivi:

Tintura madre di biancospino 7,5 g

Canfora D1 2,5 g

Contiene 53% vol. di alcool.

1 ml equivale a 24 gocce.

Numero dell'omologazione

66762 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Korolind? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Flaconi da 10 ml, 40 ml e 100 ml

Titolare dell'omologazione

steinberg pharma ag, 8400 Winterthur



Fabbricante

Robugen GmbH Pharmazeutische Fabrik, D-73730 Esslingen

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel dicembre 2018 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

