

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage avant de prendre ce médicament. Ce médicament vous a été remis personnellement sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Exmykehl D3, suppositoires

Médicament homéopathique

Quand Exmykehl D3, suppositoires est-il utilisé?

Selon la conception homéopathique, Exmykehl D3, suppositoires peut être utilisé sur prescription de votre médecin en cas de mycoses septiques de la peau et des muqueuses.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si Exmykehl D3, suppositoires peut être utilisé simultanément.

Quand Exmykehl D3, suppositoires ne doit-il pas être utilisé ou seulement avec précaution?

Exmykehl D3, suppositoires ne doit pas être utilisé en cas d'allergie connue à la pénicilline. Ne pas utiliser pour les enfants et les adolescences de moins de 18 ans. Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien, si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication!).

Exmykehl D3, suppositoires peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si ce médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Comment utiliser Exmykehl D3, suppositoires?

Sauf prescription contraire du médecin pour les adultes, introduire 1 suppositoire 1 fois par jour dans le rectum avant le coucher. Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. L'utilisation et la sécurité de Exmykehl D3 n'ont à ce jour pas été testées chez les enfants ni les adolescents de moins de 18 ans. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires Exmykehl D3, suppositoires peut-il provoquer?

L'utilisation de Exmykehl D3, suppositoires peut provoquer les effets secondaires suivants: rarement des réactions d'hypersensibilité (allergie à pénicilline). Si vous remarquez des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. L'utilisation de



médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec Exmykehl D3, suppositoires et informez-en votre médecin ou votre pharmacien.

A quoi faut-il encore faire attention?

Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «à utiliser jusqu'à...» sur le récipient. Garder les médicaments hors de portée des enfants. Conserver à température ambiante (15-25 °C). Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Que contient Exmykehl D3, suppositoires?

1 suppositoire contient:

67 mg Candida albicans D3 (HAB, 6), 67 mg Candida parapsilosis D3 (HAB, 6), 67 mg Penicillium roqueforti (HAB, 6).

Cette préparation contient en outre des excipients.

Numéro d'autorisation

52137 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Exmykehl D3, suppositoires? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie, sur ordonnance médicale.

Emballage de 10 suppositoires

Titulaire de l'autorisation

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlindach

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en août 2007 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

