

## **Informazione destinata ai pazienti**

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di far uso del medicamento. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

## **Exmykehl D3, supposte**

Medicamento omeopatico

### **Quando si usa Exmykehl D3, supposte?**

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici Exmykehl D3, supposte può essere usato su prescrizione del suo medico in caso di micosi settici della pelle e delle mucose.

### **Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?**

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può usare Exmykehl D3, supposte.

### **Quando non si può usare Exmykehl D3, supposte e quando il suo uso richiede prudenza?**

Exmykehl D3, supposte non può essere usato in caso di allergia conosciuta a la penicillina. Non deve essere utilizzato nei bambini e negli adolescenti sotto i 18 anni.

Informi il suo medico o il suo farmacista nel caso in cui:

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume o applica esternamente altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa).

### **Si può usare Exmykehl D3, supposte durante la gravidanza o l'allattamento?**

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico o farmacista.

### **Come usare Exmykehl D3, supposte?**

Salvo diversa prescrizione medica per gli adulti, introdurre 1 supposta 1 volta al giorno nell'ano prima di andare a letto. Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. L'uso e la sicurezza dell Exmykehl D3, supposte nei bambini e negli adolescenti sotto i 18 anni finora non sono stati esaminati.

Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

### **Quali effetti collaterali può avere Exmykehl D3, supposte?**

In seguito all'applicazione di Exmykehl D3, supposte possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali: raramente reazioni di ipersensibilità (allergia alla penicillina). Se osserva effetti collaterali non descritti dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista. Con l'applicazione di medicinali omeopatici, i



disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con Exmykehl D3, supposte e informi il suo medico o il suo farmacista.

### **Di che altro occorre tener conto?**

Il medicamento non deve essere utilizzato oltre la data indicata con „verwendbar bis.“ sulla confezione. Conservare i medicinali fuori dalla portata dei bambini. Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C). Il medico, il farmacista possono darle ulteriori informazioni.

### **Cosa contiene Exmykehl D3, supposte?**

1 supposta contiene:

67 mg Candida albicans D3 (HAB, 6), 67 mg Candida parapsilosis D3 (HAB, 6), 67 mg Penicillium roqueforti D3 (HAB, 6).

Questo preparato contiene inoltre sostanze ausiliarie.

### **Numero dell'omologazione**

52137 (Swissmedic)

### **Dove è ottenibile Exmykehl D3, supposte? Quali confezioni sono disponibili?**

In farmacia, dietro presentazione della prescrizione medica.

Confezione da 10 supposte.

### **Titolare dell'omologazione**

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlindach

**Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel agosto 2007 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).**

