

Information destinée aux patients

Lisez attentivement la notice d'emballage avant de prendre le médicament. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire. Ce médicament vous a été remis sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Bovisan D5, capsules

Médicament homéopathique

Quand Bovisan D5, capsules est-il utilisé?

Selon la conception homéopathique, Bovisan D5, capsules peut être utilisé sur ordonnance médicale en cas d'asthénie aiguë avec hypotonie.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si Bovisan D5, capsules peut être pris simultanément.

Quand Bovisan D5, capsules ne doit-il pas être utilisé ou seulement avec précaution?

Ne pas utiliser Bovisan D5, capsules en cas d'hypersensibilité à la substance active et pour les enfants et les adolescents de moins de 18 ans. Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien, si

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne (même en automédication).

Bovisan D5, capsules peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis du médecin ou du pharmacien.

Comment utiliser Bovisan D5, capsules?

Chez des adultes: Sauf prescription contraire du médecin, on commence la thérapie avec une dose moyenne – correspondant à une capsule toutes les deux semaines. En cas de manque de réaction ou de réaction trop faible, on peut prendre le médicament dans des intervalles plus courts – au maximum deux fois par semaine. Prendre les capsules avec un peu de liquide avant le petit déjeuner ou le soir avant le coucher. Après diminution des troubles aigus il est recommandé d'interrompre la thérapie. L'utilisation et la sécurité de Bovisan D5, capsules n'ont à ce jour pas été testées chez les enfants ni les adolescents de moins de 18 ans.. Adressez vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires Bovisan D5, capsules peut-il provoquer?



L'emploi approprié du médicament n'a donné lieu à aucun effet secondaire attesté à ce jour. Si vous remarquez d'effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec Bovisan D5, capsules et informez-en votre médecin ou votre pharmacien.

A quoi faut-il encore faire attention?

Garder le médicament hors de la portée des enfants. Stocker à la température ambiante (max. 25° C).

Que contient Bovisan D5, capsules?

Une capsule contient:

330 mg Mycobacterium bovis (BCG) D5 trituration conformément à la prescription 6 HAB.

Cette préparation contient en outre hypromellose et des autres excipients.

Numéro d'autorisation

55767 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Bovisan D5, capsules? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie, sur ordonnance médicale.

Emballage de 5 capsules.

Titulaire de l'autorisation

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlindach

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en l'octobre 2002 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

