

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di far uso del medicamento. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Questo medicamento potrebbe nuocere alla loro salute. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Bovisan D5, capsule

Medicamento omeopatico

Quando si usa Bovisan D5, capsule?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici, Bovisan D5, capsule può essere usato su prescrizione del suo medico in caso di astenia acuta con ipotonia.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere Bovisan D5, capsule.

Quando non si può assumere Bovisan D5, capsule e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

Bovisan D5, capsule non deve essere usato in caso di ipersensibilità conosciuta alla sostanza attiva e nei bambini e negli adolescenti sotto i 18 anni. Informi il suo medico o il suo farmacista se

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di propria iniziativa).

Si può usare Bovisan D5, capsule durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia non sono ancora stati eseguiti studi scientifici sistematici. Per precauzione dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al suo medico o al suo farmacista.

Come usare Bovisan D5, capsule?

Negli adulti: Salvo diversa prescrizione medica, si comincia la terapia con un dosaggio medio – corrispondente a una capsula ogni due settimane. In caso di assenza di reazione o di reazione debole la somministrazione può essere seguito a intervalli più corti – massimo due volte per settimana. Prendere le capsule prima della colazione o alla sera prima di coricarsi con un po' di liquido. – Dopo il decrescendo degli incomodi acuti è raccomandato fare una pausa. L'uso e la sicurezza dell Bovisan D5, capsule nei bambini e negli adolescenti sotto i 18 anni finora non sono stati esaminati.

Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.



Quali effetti collaterali può avere Bovisan D5, capsule?

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto di Bovisan D5, capsule. Se osserva effetti collaterali, dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista. Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con Bovisan D5, capsule e informi il suo medico o il suo farmacista.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non deve essere utilizzato oltre la data indicata con "Verwendbar bis" sulla confezione. Conservare il medicamento fuori della portata dei bambini. Conservare a temperatura ambiente (max 25° C).

Cosa contiene Bovisan D5, capsule?

Una capsula contiene:

330 mg Mycobacterium bovis (BCG) D5 trituratio secondo prescrizione 6 HAB.

Questo preparato contiene inoltre ipromellosa e sostanze ausiliarie addizionale.

Numero dell'omologazione

55767 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Bovisan D5, capsule? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia dietro presentazione della prescrizione medica.

Confezione da 5 capsule.

Titolare dell'omologazione

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlindach

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel ottobre 2002 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

