

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Loratadin-Mepha comprimés

Mepha Pharma AG

Qu'est-ce que Loratadin-Mepha et quand doit-il être utilisé?

Loratadin-Mepha est une préparation destinée au traitement des affections allergiques. Il exerce un effet bloquant de longue durée sur l'histamine qui est libérée dans l'organisme lors de réactions allergiques. Cette longue durée d'action permet une seule prise par jour. À la posologie habituelle, Loratadin-Mepha ne diminue généralement ni les performances ni la concentration et ne rend pas somnolent.

Loratadin-Mepha s'utilise chez l'adulte et l'adolescent de plus de 12 ans pour le traitement préventif et symptomatique du rhume des foins, en cas de rhinite allergique chronique, de conjonctivite allergique et d'urticaire chronique.

Quand Loratadin-Mepha ne doit-il pas être pris?

En cas d'hypersensibilité connue au principe actif de Loratadin-Mepha ou à l'un des excipients.

Les enfants de moins de 12 ans ne doivent pas prendre Loratadin-Mepha comprimés, en raison du manque d'expérience clinique

Quelles sont les précautions à observer lors de la prise de Loratadin-Mepha?

La prise de doses élevées peut entraîner une sédation (fatigue, somnolence).

Ne pas dépasser la posologie recommandée lors de la conduite d'un véhicule motorisé ou de l'utilisation de machines.

L'effet sédatif de l'alcool ou du diazépam n'est pas renforcé par Loratadin-Mepha.

Si vous présentez un trouble de la fonction hépatique, votre médecin réduira normalement la dose, c.-à-d. que vous ne prendrez Loratadin-Mepha qu'un jour sur deux.

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre Loratadin-Mepha.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si vous souffrez d'une autre maladie, si vous êtes allergique ou si vous prenez ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage externe (même en automédication!).

Loratadin-Mepha peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

La prise de Loratadin-Mepha est déconseillée si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. Demandez l'avis de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste avant de prendre des médicaments pendant la grossesse ou l'allaitement.

Comment utiliser Loratadin-Mepha?

Adolescents de plus de 12 ans et adultes:

1 comprimé de Loratadin-Mepha 1 fois par jour.

Enfants de moins de 12 ans

L'utilisation et la sécurité de Loratadin-Mepha chez les enfants de moins de 12 ans n'ont pas encore été évaluées.



Prise correcte du médicament

Ce médicament peut se prendre à n'importe quel moment de la journée. Pour obtenir un effet le plus rapide possible, prenez Loratadin-Mepha à jeun. Si vous préférez prendre Loratadin-Mepha avec un repas, il est possible que l'effet se manifeste un peu plus tardivement.

Avalez les comprimés de Loratadin-Mepha sans les croquer avec un peu de liquide.

Les comprimés possèdent une rainure de sécabilité et peuvent être divisés pour faciliter la prise, mais pas pour prendre une dose partielle.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires Loratadin-Mepha peut-il provoquer?

Les effets secondaires suivants peuvent survenir lors de la prise de Loratadin-Mepha:

Très fréquent (concerne plus d'une personne sur 10):

Maux de tête.

Fréquent (concerne 1 à 10 personnes sur 100):

Vertiges, obnubilation, nausées, toux, saignements de nez, rhume, infections des voies aériennes supérieures, diarrhée, sécheresse buccale, troubles digestifs, augmentation de l'appétit, inflammation de la gorge, fatigue.

Occasionnel (concerne 1 à 10 personnes sur 1000):

États d'excitation, états anxieux, confusion, dépression, migraine, nervosité, accès de sueur, soif, vomissements, fourmillements, conjonctivites, douleurs aux yeux, douleurs aux oreilles, acouphènes, douleurs dans la cage thoracique, hypertension artérielle, troubles du rythme cardiaque (extrasystoles), bronchite, asthme, nez sec/bouché, essoufflement, sinusites, éternuements, troubles de la phonation, altération du goût, ballonnements (flatulences), gastrite, constipation, maux de dents, démangeaisons, éruptions cutanées, sensation de chaleur, urticaire, douleurs articulaires, sensation de faiblesse générale, maux de dos, besoin d'uriner plus fréquent ou plus rare, règles douloureuses, fièvre, malaise.

Rare (concerne 1 à 10 personnes sur 10'000):

Réactions allergiques, aggravation de l'allergie, perte de mémoire, perte d'appétit, troubles de la concentration, agitation, troubles de la sensibilité au toucher, tremblements, vision floue, altération de la production de larmes, toux sanglante, tension artérielle basse, gonflements, brève perte de connaissance, palpitations, laryngite, inflammations de la muqueuse buccale, saignements sous la peau, cheveux secs, peau sèche, sensibilité à la lumière, crampes dans les jambes, gonflements des extrémités, gonflements du visage et autour des yeux, gonflement des lèvres, de la langue et du larynx, impuissance, perte de la libido, règles plus abondantes, bouffées de chaleur.

Très rare (concerne moins d'une personne sur 10'000):

Perte de poids, hallucinations, convulsions, spasme de la paupière, altération de la salivation, troubles de la fonction hépatique (hépatite), nécrose du foie, jaunisse, chute de cheveux, rougeur de la peau, douleurs musculaires, coloration de l'urine, inflammation du vagin, augmentation de la taille des seins chez l'homme (gynécomastie), frissons.

Vous devez immédiatement arrêter de prendre Loratadin-Mepha et consulter un médecin si vous observez une coloration foncée de l'urine, des selles claires et éventuellement une coloration jaune de la peau.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention?



Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Conserver dans l'emballage d'origine. Ne pas conserver au-dessus de 30°C. Conserver hors de la portée des enfants.

Remarques complémentaires

Si un test d'exploration de l'allergie est effectué, le traitement par Loratadin-Mepha devra être interrompu 48 heures avant la réalisation du test; en effet, l'administration d'antihistaminiques peut empêcher les réactions positives ou en affaiblir le résultat.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Loratadin-Mepha?

1 comprimé contient:

Principes actifs

Loratadine 10 mg.

Excipients

Lactose monohydraté, cellulose microcristalline, amidon de maïs, stéarate de magnésium.

Numéro d'autorisation

57209 (Swissmedic).

Où obtenez-vous Loratadin-Mepha? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale:

Emballage de 14, 28 et 42 comprimés.

Titulaire de l'autorisation

Mepha Pharma AG, Basel.

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en septembre 2022 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

Numéro de version interne: 10.1

