

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico, del suo farmacista o del suo droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Poll-X

Che cos'è Poll-X e quando si usa?

Poll-X allevia i sintomi della rinite allergica (ad esempio raffreddore da fieno), come starnuti, naso che cola, prurito al naso, naso intasato, prurito al palato, prurito agli occhi, occhi arrossati o lacrimanti.

Poll-X è inoltre impiegato nel trattamento dei sintomi associati all'orticaria (una malattia della pelle causata da un'allergia). Di questi sintomi fanno parte il prurito e la tipica eruzione cutanea.

Quando non si può assumere Poll-X?

Poll-X non può essere usato in caso d'ipersensibilità alla desloratadina o alla loratadina o ad uno degli altri componenti di Poll-X.

I bambini sotto i 12 anni non possono assumere Poll-X compresse pellicolate.

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione di Poll-X?

Non sono disponibili dati relativi all'uso di Poll-X nei pazienti affetti da malattie renali ed epatiche.

Generalmente Poll-X non compromette la capacità di rendimento o di concentrazione. Si raccomanda, tuttavia, di non svolgere attività che richiedono una vigilanza mentale, quali ad esempio la guida di autoveicoli o l'uso di macchinari, fino a quando non si è stabilita la propria reazione al medicamento. Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere nel caso in cui

- soffra di altre malattie,
- soffra di allergie,
- assuma o applica altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa!) o
- abbia una storia medica o familiare di crisi convulsive.

Si può assumere Poll-X durante la gravidanza o l'allattamento?

Durante la gravidanza o l'allattamento non dovrebbe assumere Poll-X.

Informi il suo medico se è in stato di gravidanza o sta pianificando una gravidanza o se allatta.

Come usare Poll-X?

Adulti e adolescenti dai 12 anni

Assumere una compressa pellicolata di Poll-X da 5 mg una volta al giorno.

Ingerire la compressa pellicolata intera (senza masticarla) con dell'acqua.

Le compresse pellicolate di Poll-X si possono essere assunte indipendentemente dai pasti.

Bambini sotto i 12 anni

Nei bambini di età inferiore ai 12 anni, non è possibile un adeguato aggiustamento della dose con Poll-X 5 mg, la compressa pellicolata. In questo caso, si raccomanda l'uso di una preparazione di desloratadina che



permette un dosaggio inferiore adattato (per esempio soluzione orale con il principio attivo desloratadina).
Assuma Poll-X per tutto il tempo prescritto dal medico.

Se ha assunto più Poll-X di quanto dovuto, si rivolga immediatamente al suo medico o farmacista.

Se ha dimenticato una dose di Poll-X, non assuma una dose doppia per recuperare dosi singole dimenticate, ma segua il normale schema di trattamento e assuma quindi la dose successiva al momento prescritto.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Poll-X?

Con l'assunzione di Poll-X si possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali:

Comune (può riguardare da 1 a 10 persone trattate su 100)

Stanchezza.

Non comune (può riguardare da 1 a 10 persone trattate su 1000)

Mal di testa e secchezza delle fauci.

Molto raro (può riguardare meno di 1 persona trattata su 10'000)

Gravi reazioni allergiche (difficoltà respiratorie, respiro sibilante), eruzioni cutanee e prurito, tachicardia, palpitazioni, polso irregolare, nausea, mal di stomaco, vomito, disturbi di stomaco, diarrea, vertigini, allucinazioni, sonnolenza, agitazione associata ad aumentata attività fisica, convulsioni, dolori muscolari, infiammazione del fegato e disturbi della funzionalità epatica.

Frequenza non nota (non può essere definita sulla base dei dati disponibili)

Aumentato appetito.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP.» sul contenitore.

Istruzioni di conservazione

Conservare il medicamento a temperatura ambiente (15-25°C) nella confezione originale e fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Poll-X?

Principi attivi

1 compressa pellicolata di Poll-X contiene 5 mg di desloratadina come principio attivo.



Sostanze ausiliarie

Cellulosa microcristallina, amido pregelatinizzato, magnesio stearato, silice colloidale anidra, ipromellosa, titanio diossido (E171), acido stearico, indigotina (E132).

Numero dell'omologazione

67123 (Swissmedic).

Dov'è ottenibile Poll-X? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Sono disponibili confezioni da 10, 30 e 50 compresse pellicolate.

Titolare dell'omologazione

axapharm ag, 6340 Baar.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel marzo 2024 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

10125p-04

