

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico o del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Similasan Cardiospermum, crema

Medicamento omeopatico

Quando si usa Similasan Cardiospermum ?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici Similasan Cardiospermum può essere usato in caso di

- Eruzioni cutanee acute, allergiche e pruriginose
- Eritema solare, orticaria, allergia a determinati cibi
- Prurito, arrossamenti, infiammazioni cutanee dovute al contatto con materiali scarsamente tollerati (ad es. detersivi, coloranti, lana, profumo)
- Eruzioni e infiammazioni cutanee croniche dovute ad allergie.

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa esclusivamente sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

In caso di continuo peggioramento o mancata guarigione consultare un medico

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può usare Similasan Cardiospermum.

Quando non si può usare Similasan Cardiospermum e quando la sua somministrazione/il suo uso richiede prudenza?

Non applicare su ferite aperte.

Nei bambini fino ai 2 anni, il medicamento può essere utilizzato solo previa consultazione con il medico, il farmacista o il droghiere.

In presenza di lesioni cutanee di grossa estensione, infezioni e qualora si sospettino malattie sistemiche dovrebbe essere consultato un medico.

Similasan Cardiospermum contiene olio di arachidi. Non può essere utilizzato se è ipersensibile (allergica/o) all'olio di arachidi o alla soia.

Localmente, il medicamento può causare irritazioni della pelle (ad es. dermatite da contatto; alcol cetilico, polisorbato-60).

Questo medicamento contiene 200 mg di glicole propilenico per 1 g. Il glicole propilenico può causare irritazioni della

pelle. Utilizzare questo medicamento nei bambini fino a 4 settimane con ferite aperte oppure lesioni o danni cutanei estesi (come ustioni) esclusivamente previa consultazione con il medico o farmacista.



Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa) o li applica esternamente

Si può usare *Similasan Cardiospermum* durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico o farmacista o droghiere.

Come usare *Similasan Cardiospermum*?

Salvo diversa prescrizione medica, attenersi alla seguente posologia:

Bambini (dai 2 anni), adolescenti e adulti:

Spalmare uno strato sottile sulle parti interessate oppure spalmare la crema su una compressa e applicarla sulla ferita.

- ***Disturbi acuti:*** Applicare più volte al giorno (corrisp. a 6 volte al giorno), secondo le necessità. Sostituire la compressa almeno 2 volte al giorno.
- ***Per la completa guarigione:*** Applicare 2 - 3 volte al giorno e sostituire la compressa almeno 1 volta al giorno.

La durata dell'effetto varia a seconda del soggetto. In generale si consiglia di ripetere la somministrazione del preparato in caso di riduzione dell'effetto o di ripresa dei sintomi.

Nei bambini fino ai 2 anni, il medicamento può essere utilizzato solo previa consultazione con il medico, farmacista o droghiere.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se il trattamento di un bambino piccolo/di un bambino, non produce il miglioramento auspicato, consulti un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere *Similasan Cardiospermum*?

Con l'assunzione o l'uso di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con *Similasan Cardiospermum* e informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto di *Similasan Cardiospermum*. Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.*



Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Dopo l'uso chiudere bene il tubo.

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Similasan Cardiospermum?

1 g di crema contiene:

Principi attivi

Cardiospermum halicacabum (HAB) D4 33.33 mg / Cardiospermum halicacabum (HAB) D6 33.33 mg /
Cardiospermum halicacabum (HAB) D12 33.33 mg

Sostanze ausiliarie

Olio di arachidi idrogenato 200 mg, glicole propilenico (E1520) 200 mg, alcol cetilico 100 mg,
polisorbato 60 (E435) (50 mg), acqua per preparazioni iniettabili, complesso sodio-cloruro di argento

Numero dell'omologazione

54136 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Similasan Cardiospermum? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezione: Tubo da 50 g di contenuto

Titolare dell'omologazione

Similasan AG, CH-8916 Jonen

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel novembre 2023 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

