**Informazione destinata ai pazienti**

Legga attentamente il foglietto illustrativo, perchè contiene informazioni importanti. Questo medicamento le è stato prescritto dal medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica,in farmacia. Faccia uso corretto del medicamento o segua le indicazioni del medico o del farmacista al fine di ottenere il maggior beneficio. Conservi questo foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

**Gocce Dr. Reckeweg® R16 Cimisan**

**Che cosa sono le gocce Dr. Reckeweg® R16 Cimisan e quando si usano?**

Secondo i canoni della medicina omeopatica le gocce Dr. Reckeweg® R16 Cimisan trovano principalmente impiego in caso di emicrania.

**Quali precauzioni sono da osservare durante il trattamento?**

Nel caso in cui il medico le avesse già prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se è possibile associare ad essi le gocce Dr. Reckeweg® R16 Cimisan. In presenza di disturbi gravi o di cefalgia accompagnata da febbre alta, si raccomanda di consultare tempestivamente il medico, soprattutto nel caso di bambini. Dolori persistenti richiedono un consulto medico.

**Quando non si possono usare le gocce Dr. Reckeweg® R16 Cimisan e quando la loro somministrazione richiede prudenza?**

Finora non si conoscono limitazioni d'uso. Se è usato correttamente non è necessario adottare particolari precauzioni.

Informi il suo medico o il suo farmacista se:

– soffre di altre malattie,

– soffre di allergie,

– assume altri medicamenti o fa uso di medicamenti per uso esterno (anche acquistati di propria iniziativa).

**Si possono somministrare le gocce Dr. Reckeweg® R16 Cimisan durante la gravidanza o l'allattamento?**

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia non sono mai stati effettuati studi scientifici sistematici. Per precauzione dovrebbe rinunciare, nella misura del possibile, ad assumere medicamenti durante la gravidanza e l'allattamento o chidere consiglio al suo medico o al suo farmacista.

**Come usare le gocce Dr. Reckeweg® R16 Cimisan?**

Salvo diversa prescrizione medica, per un trattamento prolungato, 10-15 gocce, in poca acqua, 2-3 volte al dì prima dei pasti. In caso di emicranie acute iniziare con 10 gocce ogni 15-30 minuti; raggiunto un miglioramento, diminuire la frequenza delle somministrazioni. Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal medico. Se non si manifesta il miglioramento desiderato nel trattamento di un bambino piccolo / bambino, deve essere consultato un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

**Quali effetti collaterali possono avere le gocce Dr. Reckeweg® R16 Cimisan?**

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto delle gocce Dr. Reckeweg® R16 Cimisan. Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista. Nel corso dell'assunzione di medicinali omeopatici si può verificare un aggravamento temporaneo dei sintomi (aggravamento iniziale). In caso di aggravamento persistente interrompa il trattamento con le gocce Dr. Reckeweg® R16 Cimisan e informi il medico o il farmacista.

**Di che altro occorre tener conto?**

Il medicinale può essere utilizzato solamente fino alla data indicata con «EXP» sul contenitore. Conservare a temperatura ambiente (15-25° C). Conservare fuori della portata dei bambini. Altre informazioni possono essere fornite dal vostro medico o farmacista. Le gocce contengono alcool 36 % Vol.

**Cosa contengono le gocce Dr. Reckeweg® R16 Cimisan?**

10 ml contengono: Cimicifuga racemosa D4 1 ml, Gelsemium sempervirens D3 1 ml, Iris versicolor D2 1 ml, Sanguinaria canadensis D3 1 ml, Spigelia anthelmia D4 1 ml e come eccipienti alcool e acqua. Contiene alcool 36 % Vol.

**Numero dell'omologazione**

45045

**Dove sono ottenibili le gocce Dr. Reckeweg® R16 Cimisan? Quali confezioni sono disponibili?**

In vendita in farmacia senza ricetta medica. Flaconi di gocce da 50 ml.

**Titolare dell'omologazione**

Laboratoire Jacques Reboh et fils SA
Route de la Glâne 4
CH-1680 Romont

**Fabbricante**

Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH
D - 64625 Bensheim

**Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel 07/2004 dall'autorità competente in materia di medicamenti (Swissmedic).**