

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

RENNIE® GUM, gomme à mâcher médicamenteuse

Bayer (Schweiz) AG

Qu'est-ce que RENNIE GUM et quand doit-il être utilisé?

Le principe actif de Rennie Gum est le carbonate de calcium. Il neutralise l'acidité gastrique et soulage les symptômes de l'hyperacidité gastrique tels que les brûlures d'estomac et les renvois acides.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Remarque pour les diabétiques: 1 gomme à mâcher Rennie Gum contient 6,75 mg de sucralose et près de 170 mg de sorbitol.

Quand RENNIE GUM ne doit-il pas être pris?

Vous ne devez pas prendre Rennie Gum si:

- vous êtes hypersensible au carbonate de calcium ou aux excipients contenus dans Rennie Gum
- votre fonction rénale est sévèrement altérée
- vous souffrez d'hypercalcémie (trop de calcium dans le sang)
- des calculs rénaux ont été constatés chez vous (néphrolithiase)
- vous souffrez d'hypophosphatémie (trop peu de phosphate dans le sang)

Quelles sont les précautions à observer lors de la prise de RENNIE GUM?

Rennie Gum ne doit pas être pris pendant plus de 2 semaines sans avis médical. Si les troubles persistent et/ou réapparaissent périodiquement, vous devez consulter un médecin afin d'exclure une maladie grave. De plus, Rennie Gum ne doit pas être pris pendant une période prolongée sans avis médical, car une modification des sels sanguins peut survenir en cas d'utilisation à long terme.

L'effet des antibiotiques, des glycosides cardiaques (digoxine), médicaments contre l'ostéoporose (appelés biphosphonates), des médicaments contre le VIH, des diurétiques, des hormones thyroïdiennes, de l'eltrombopag, des médicaments contenant du fer et d'autres médicaments peut être modifié en cas de prise simultanée avec Rennie Gum. Il faut donc respecter un intervalle de deux heures entre la prise de Rennie Gum et celle d'autres médicaments.

Une utilisation à long terme doit être évitée, tout particulièrement si vous souffrez de troubles de la fonction rénale ou d'une tendance aux calculs rénaux. Rennie Gum ne doit pas être pris avec des quantités importantes de lait ou de produits laitiers.

Ce médicament contient du sorbitol. Le sorbitol est une source de fructose. Si votre médecin vous a informé(e) que vous présentiez une intolérance à certains sucres ou si vous avez été diagnostiqué(e) avec une intolérance héréditaire au fructose (IHF), une maladie congénitale rare caractérisée par l'incapacité à décomposer le fructose, parlez-en à votre médecin avant que vous ne preniez ou ne receviez ce médicament.

Ce médicament contient de l'isomaltitol. Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.



Ce médicament contient 0,02055 µg d'alcool benzylique par gomme à mâcher équivalent à 0,02055 µg/1 900 mg. L'alcool benzylique peut provoquer des réactions allergiques.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage externe (même en automédication!).

RENNIE GUM peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné.

Rennie Gum peut être pris pendant la grossesse dans le cadre d'une utilisation conforme aux recommandations. La dose maximale journalière recommandée ne doit pas être dépassée et la prise ne doit pas se poursuivre au-delà de 2 semaines.

Pour prévenir un excès de calcium, les femmes enceintes doivent éviter de consommer des quantités importantes de lait et de produits laitiers.

Le calcium passe dans le lait maternel, mais aucun effet n'est attendu sur l'enfant aux doses thérapeutiques de Rennie Gum.

Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis du médecin, du pharmacien ou du droguiste.

Comment utiliser RENNIE GUM?

Les instructions suivantes sont valables pour toutes les possibilités d'emploi (voir «Qu'est-ce que RENNIE GUM et quand doit-il être utilisé?»):

Adultes et enfants de plus de 12 ans: laisser fondre lentement dans la bouche 1 à 2 gommes à mâcher Rennie Gum, de préférence une heure après les repas et avant le coucher, ou plus fréquemment en cas de brûlures d'estomac. La durée de mastication recommandée est de 15 minutes et la gomme à mâcher ne doit pas être avalée. En cas de besoin, la prise peut être répétée environ toutes les deux heures.

Ne pas mâcher plus de 10 gommes à mâcher Rennie Gum par jour.

L'utilisation et la sécurité de Rennie Gum n'ont pas été établies à ce jour pour les enfants de moins de 12 ans. Son utilisation n'est donc pas recommandée chez les enfants de moins de 12 ans.

Ne pas prendre la dose maximale de 10 gommes à mâcher Rennie Gum pendant plus de 2 semaines.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires RENNIE GUM peut-il provoquer?

Les effets secondaires suivants peuvent survenir lors de la prise de Rennie Gum:

nausées, vomissements, troubles gastriques, constipation, diarrhée, faiblesse musculaire.

Chez les patients souffrant de troubles de la fonction rénale, l'utilisation de hautes doses pendant une période prolongée peut provoquer une défaillance rénale, une hypercalcémie et une alcalose, ce qui peut entraîner des symptômes digestifs et une faiblesse musculaire.

Troubles du goût, maux de tête, azotémie (teneur en azote élevée dans le sang), dépôts calcaires (calcinose), faiblesse générale (asthénie).

Très rare (concerne moins d'une personne sur 10 000)

Éruption cutanée, démangeaisons, urticaire, gonflement, réaction allergique et difficultés respiratoires.



Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention?

Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Ne pas conserver au-dessus de 25°C et protéger de l'humidité.

Conserver hors de portée des enfants.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient RENNIE GUM?

Principes actifs

750 mg de carbonate de calcium

Excipients

Isomalt, base de gomme à mâcher contenant du butylhydroxytoluène, arômes (menthe poivrée) contenant de l'alcool benzylique, arômes (menthol), sucralose, acésulfame potassique, bleu brillant FCF, sorbitol, copovidone, stéarate de magnésium

Numéro d'autorisation

68152 (Swissmedic)

Où obtenez-vous RENNIE GUM? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

1 emballage de 20 gommes à mâcher médicamenteuses

Titulaire de l'autorisation

Bayer (Schweiz) AG, 8045 Zurich

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en septembre 2024 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

