

Information für Patientinnen und Patienten

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, denn sie enthält wichtige Informationen. Dieses Arzneimittel haben Sie entweder persönlich von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin verschrieben erhalten oder Sie haben es ohne ärztliche Verschreibung in der Apotheke bezogen. Wenden Sie das Arzneimittel gemäss Packungsbeilage beziehungsweise nach Anweisung des Arztes oder des Apothekers bzw. der Ärztin oder der Apothekerin an, um den grössten Nutzen zu haben. Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

Dr. Reckeweg® R4 Enterocolin Tropfen

Wann werden Dr. Reckeweg® R4 Enterocolin Tropfen angewendet?

Gemäss homöopathischem Arzneimittelbild können Dr. Reckeweg® R4 Enterocolin Tropfen bei Durchfall angewendet werden.

Was sollte dazu beachtet werden?

Wenn Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin andere Arzneimittel verschrieben hat, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, ob Dr. Reckeweg® R4 Enterocolin Tropfen gleichzeitig eingenommen werden dürfen.

Wann dürfen Dr. Reckeweg® R4 Enterocolin Tropfen nicht oder nur mit Vorsicht angewendet werden?

Bei Durchfall bei Kindern unter 3 Jahren muss ein Arzt, eine Ärztin konsultiert werden. Wenn der Durchfall von Fieber begleitet ist, wenn Verdacht auf Blut im Stuhl besteht, so ist ein Arzt, eine Ärztin, ein Apotheker, eine Apothekerin zu konsultieren. Wenn die Beschwerden länger als 3 Tage anhalten oder wenn die Beschwerden sich wiederholen, so ist ein Arzt, eine Ärztin, ein Apotheker, eine Apothekerin zu konsultieren. Besonders bei älteren Menschen und Kindern muß zusätzlich auf eine ausreichende Flüssigkeits- und Elektrolytzufuhr geachtet werden.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, wenn Sie

- an anderen Krankheiten leiden,
- Allergien haben oder
- andere Arzneimittel (auch selbstgekauft) einnehmen oder äusserlich anwenden!

Dürfen Dr. Reckeweg® R4 Enterocolin Tropfen während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit angewendet werden?

Auf Grund der bisherigen Erfahrungen ist bei bestimmungsgemässer Anwendung kein Risiko für das Kind bekannt. Systematische wissenschaftliche Untersuchungen wurden aber nie durchgeführt. Vorsichtshalber sollten Sie während der Schwangerschaft und Stillzeit möglichst auf Arzneimittel verzichten oder den Arzt oder Apotheker bzw. die Ärztin oder die Apothekerin um Rat fragen.

Wie verwenden Sie Dr. Reckeweg® R4 Enterocolin Tropfen?

Falls vom Arzt bzw. von der Ärztin nicht anders verschrieben, bei fieberhaft verlaufenden Durchfällen im akuten Stadium alle 15 Minuten bis stündlich 20 Tropfen unverdünnt einnehmen. Sobald die Durchfälle nachlassen oder das Fieber sinkt, nimmt man alle 1-2 Stunden 10-15 Tropfen. Nach Abklingen der Erscheinungen noch einige Tage lang 3mal täglich 10-15 Tropfen einnehmen. Bei fieberlos verlaufenden Durchfällen alle 1-3 Stunden 10-15 Tropfen. Bei chronischen Durchfällen über einen längeren Zeitraum 3mal täglich 10-15 Tropfen in etwas Wasser einnehmen. Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt oder von der Ärztin verschriebene Dosierung. Wenn bei der Behandlung eines Kleinkindes / Kindes die gewünschte Besserung nicht eintritt, ist mit ihm ein Arzt bzw. eine Ärztin aufzusuchen. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit



Ihrem Arzt oder Apotheker bzw. mit Ihrer Ärztin oder Apothekerin.

Welche Nebenwirkungen können Dr. Reckeweg® R4 Enterocolin Tropfen haben?

Für Dr. Reckeweg® R4 Enterocolin Tropfen sind bisher bei bestimmungsgemäßigem Gebrauch keine Nebenwirkungen beobachtet worden. Wenn Sie dennoch Nebenwirkungen bemerken, informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin. Bei Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). Bei andauernder Verschlechterung setzen Sie Dr. Reckeweg® R4 Enterocolin Tropfen ab und informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin.

Was ist ferner zu beachten?

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit «EXP» bezeichneten Datum verwendet werden. Bei Raumtemperatur (15-25° C) aufbewahren. Arzneimittel für Kinder unerreikbaar aufbewahren. Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin. Die Tropfen enthalten 36 Vol.-% Alkohol.

Was ist in Dr. Reckeweg® R4 Enterocolin Tropfen enthalten?

10 ml enthalten: Acidum phosphoricum D3 1 ml, Baptisia D4 1 ml, Chamomilla D4 1 ml, Colocynthis D6 1 ml, Mercurius sublimatus corrosivus D5 1 ml, Oleander D6 1 ml, Veratrum album D6 1 ml, und als Hilfsstoffe Wasser und Alkohol. Enthält 36 Vol.-% Alkohol.

Zulassungsnummer

45036

Wo erhalten Sie Dr. Reckeweg® R4 Enterocolin Tropfen? Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken ohne ärztliche Verschreibung.

Tropfflaschen zu 50 ml.

ZulassungsinhaberIn

Laboratoire Jacques Reboh et fils SA

Route de la Glâne 4

CH-1680 Romont

Diese Packungsbeilage wurde im 10/2006 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

