

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di fare uso del medicamento. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute. Conservi questo foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Gocce Dr. Reckeweg® R27 Renocalcin

Che cosa sono le gocce Dr. Reckeweg® R27 Renocalcin e quando si usano ?

Secondo i canoni della medicina omeopatica le gocce Dr. Reckeweg® R27 Renocalcin trovano principalmente impiego su prescrizione del suo medico in caso di calcolosi renale.

Quali precauzioni sono da osservare durante il trattamento?

Nel caso in cui il medico le avesse già prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se è possibile associare ad essi le gocce Dr. Reckeweg® R27 Renocalcin.

Quando non si possono usare le gocce Dr. Reckeweg® R27 Renocalcin e quando la loro somministrazione richiede prudenza?

In caso di accesso acuto, si prega di consultare il medico.

Informi il suo medico o il suo farmacista se:

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie,
- assume altri medicinali o fa uso di medicinali per uso esterno (anche acquistati di propria iniziativa).

Si possono somministrare le gocce Dr. Reckeweg® R27 Renocalcin durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia non sono mai stati effettuati studi scientifici sistematici. Per precauzione dovrebbe rinunciare, nella misura del possibile, ad assumere medicinali durante la gravidanza e l'allattamento o chiedere consiglio al suo medico o al suo farmacista.

Come usare le gocce Dr. Reckeweg® R27 Renocalcin?

Salvo diversa prescrizione medica, assumere 10-15 gocce, in poca acqua, 3 volte al dì prima dei pasti. A miglioramento ottenuto portare la posologia a 5-10 gocce 2 volte al giorno. Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali possono avere le gocce Dr. Reckeweg® R27 Renocalcin?

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto delle gocce Dr. Reckeweg® R27 Renocalcin. Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista. Nel corso dell'assunzione di medicinali omeopatici si può verificare un aggravamento temporaneo dei sintomi (aggravamento iniziale). In caso di aggravamento persistente interrompa il trattamento con le gocce Dr. Reckeweg® R27 Renocalcin e informi il medico o il farmacista.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicinale può essere utilizzato solamente fino alla data indicata con «EXP» sul contenitore. Conservare a temperatura ambiente (15-25° C). Conservare fuori della portata dei bambini. Altre informazioni possono essere fornite dal suo medico o farmacista. Le gocce contengono alcool 36 % Vol.

Cosa contengono le gocce Dr. Reckeweg® R27 Renocalcin?

10 ml contengono: Acidum nitricum D6 1 ml, Berberis vulgaris D3 1 ml, Lycopodium clavatum D5 1 ml, Sarsaparilla D3 1 ml e come eccipienti alcool e acqua. Contiene alcool 36 % Vol.



Numero dell'omologazione

45056

Dove sono ottenibili le gocce Dr. Reckeweg® R27 Renocalcin? Quali confezioni sono disponibili?

In vendita in farmacia su ricetta medica. Flaconi di gocce da 50 ml.

Numero dell'omologazione

Rubrica del capitolo: (Arial dimensione carattere 11 grassetto) Testo: Arial dimensione carattere 11, interlinea 1.5, margine sinistro / destro / superiore / inferiore 2.5, eventualmente inserire tabelle/grafici

Dove è ottenibile ...? Quali confezioni sono disponibili?

Rubrica del capitolo: (Arial dimensione carattere 11 grassetto) Testo: Arial dimensione carattere 11, interlinea 1.5, margine sinistro / destro / superiore / inferiore 2.5, eventualmente inserire tabelle/grafici

Titolare dell'omologazione

Laboratoire Jacques Reboh et fils SA

Route de la Glâne 4

CH-1680 Romont

Fabbricante

Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH

D - 64625 Bensheim

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel 07/2004 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

