

▼ Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Dies ermöglicht eine schnelle Identifizierung neuer Erkenntnisse über die Sicherheit. Sie können dabei helfen, indem Sie Nebenwirkungen melden. Hinweise zur Meldung von Nebenwirkungen, siehe Ende Kapitel «Welche Nebenwirkungen kann Alhemo haben?».

Information für Patientinnen und Patienten

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, bevor Sie das Arzneimittel einnehmen bzw. anwenden. Dieses Arzneimittel ist Ihnen persönlich verschrieben worden und Sie dürfen es nicht an andere Personen weitergeben. Auch wenn diese die gleichen Krankheitssymptome haben wie Sie, könnte ihnen das Arzneimittel schaden.

Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

Alhemo[®], Injektionslösung im Fertigpen

Novo Nordisk Pharma AG

Was ist Alhemo und wann wird es angewendet?

Alhemo enthält den Wirkstoff Concizumab, der zu einer Gruppe von Arzneimitteln gehört, die als «monoklonale Antikörper» bezeichnet werden. Der monoklonale Antikörper in Alhemo ist ein Protein, das ein am Blutgerinnungsprozess beteiligtes Zielmolekül erkennt und bindet.

Alhemo wird bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren mit

- Hämophilie A mit Inhibitoren
- schwerer Hämophilie A (wenn der Faktor VIII-Blutspiegel kleiner 1 % ist) ohne Inhibitoren
- Hämophilie B mit Inhibitoren
- mittelschwerer/schwerer Hämophilie B (wenn der Faktor IX-Blutspiegel kleiner oder gleich 2 % ist) ohne Inhibitoren

verwendet, um Blutungen zu verhindern oder die Anzahl der Blutungen zu reduzieren.

Hämophilie A ist ein angeborener Mangel an Blutgerinnungsfaktor VIII und Hämophilie B ein angeborener Mangel an Blutgerinnungsfaktor IX.

Wie wirkt Alhemo?

Alhemo enthält den Wirkstoff Concizumab, der das Gleichgewicht zwischen den Faktoren, die zur Blutgerinnung beitragen, und den Faktoren, welche die Blutgerinnung verhindern, wiederherstellt. Dies erfolgt durch die Hemmung eines natürlichen Faktors, der die Blutgerinnung verhindert (Tissue factor pathway inhibitor (TFPI)). Die Hemmung von TFPI durch Concizumab macht die Blutgerinnung effizienter und trägt so dazu bei, Blutungen zu verhindern, wenn Ihnen ein Gerinnungsfaktor fehlt.

Alhemo wirkt unabhängig von Faktor FIX.

Auf Verschreibung des Arztes oder der Ärztin.

Wann darf Alhemo nicht angewendet werden?

Alhemo darf nicht angewendet werden:

- wenn Sie allergisch gegen den Wirkstoff oder einen der übrigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind (aufgeführt unter «Was ist in Alhemo enthalten?»).

Wenn Sie nicht sicher sind, sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker bzw. Ihrer Ärztin, Apothekerin oder dem medizinischen Fachpersonal, bevor Sie Alhemo anwenden.

Wann ist bei der Anwendung von Alhemo Vorsicht geboten?

Möglicherweise schwerwiegende Nebenwirkungen von Alhemo



Allergische Reaktionen (Überempfindlichkeitsreaktionen)

Allergische Reaktionen sind in Patienten, welche mit Alhemo behandelt wurden, aufgetreten. Brechen Sie die Behandlung ab und wenden Sie sich an Ihren Arzt bzw. Ihre Ärztin, falls bei Ihnen Anzeichen oder Symptome einer allergischen Reaktion wie Ausschlag, Rötung, Nesselsucht und Jucken auftreten. Bei Ihnen könnten auch schwerwiegendere Anzeichen für allergische Reaktionen (z.B. anaphylaktische Reaktion) wie grossflächiges Jucken, Rötung und/oder Schwellung der Lippen, der Zunge, des Gesichts oder der Hände, Schwierigkeiten beim Schlucken, Kurzatmigkeit, Giemen (Keuchen), Engegefühl in der Brust, blasse und kalte Haut, schneller Herzschlag oder ein Schwindelgefühl (niedriger Blutdruck) auftreten, die sofort medizinisch behandelt werden müssen.

Wenn bei Ihnen Anzeichen einer schwerwiegenden allergischen Reaktion auftreten: Brechen Sie die Einnahme von Alhemo ab und suchen Sie sofort einen Notfalldienst auf.

Blutgerinnsel (thromboembolische Ereignisse)

Blutgerinnsel sind in Patienten, welche mit Alhemo behandelt wurden, aufgetreten und können sich überall im Körper bilden, unter anderem in den Beinen, Armen, Lungen und Nieren.

Falls bei Ihnen Anzeichen oder Symptome für Blutgerinnsel auftreten, sollten Sie die Einnahme von Alhemo abbrechen und sich sofort an Ihren Arzt oder Ihre Ärztin wenden.

Zu solchen Anzeichen und Symptome gehören unter anderem:

- Schwellung, Wärme, Schmerzen oder Rötung der Haut – dabei könnte es sich um Symptome eines Blutgerinnsels in Ihren Beinen oder Armen handeln.
- Kurzatmigkeit, starker Brustkorbschmerz – dabei könnte es sich um Symptome von Blutgerinnseln in Ihrer Brust (Herz und Lungen) handeln.
- Kopfschmerzen, Verwirrtheit, Sprach- oder Bewegungsstörungen, ein taubes Gefühl im Gesicht, Augenschmerzen, Schwellung der Augen oder Sehschwierigkeiten – dabei könnte es sich um Symptome eines Blutgerinnsels in Ihrem Gehirn oder Ihren Augen handeln.
- plötzliche Schmerzen im Magen oder im Lendenwirbelbereich – dabei könnte es sich um Symptome von Blutgerinnseln in Ihrem Darm oder Ihren Nieren handeln.

Wenn bei Ihnen Anzeichen von Blutgerinnsel auftreten: Brechen Sie die Einnahme von Alhemo ab und suchen Sie sofort einen Notfalldienst auf.

Andere Vorsichtsmassnahmen

Immunogenität

Ihr Körper kann Proteine (Antikörper) bilden, die die Wirkung von Alhemo beeinträchtigen können. Wenden Sie sich an Ihren Arzt / Ihre Ärztin, wenn Sie bemerken, dass Alhemo bei Ihnen nicht mehr wirkt (z.B. Zunahme der Blutungen).

Fahrtüchtigkeit und die Fähigkeit, Werkzeuge oder Maschinen zu bedienen

Es ist unwahrscheinlich, dass Alhemo Auswirkungen auf Ihre Fahrtüchtigkeit und Ihre Fähigkeit, Werkzeuge oder Maschinen zu bedienen, hat.

Natriumgehalt

Dieses Arzneimittel enthält weniger als 1 mmol (23 mg) Natrium pro Dosis. Damit ist es nahezu «natriumfrei».

Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin, wenn Sie

- an anderen Krankheiten leiden,
- Allergien haben oder
- andere Arzneimittel (auch selbst gekaufte!) einnehmen!

Darf Alhemo während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit angewendet werden?



Sie sollten während Ihrer Behandlung mit Alhemo und bis sieben Wochen nach Ihrer letzten Injektion mit Alhemo eine zuverlässige Verhütungsmethode anwenden. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt bzw. Ihrer Ärztin darüber, welche Verhütungsmethoden geeignet sind.

Wenn Sie schwanger sind oder stillen bzw. vermuten, dass Sie schwanger sind oder eine Schwangerschaft planen, fragen Sie Ihren Arzt bzw. Ihre Ärztin um Rat, bevor Sie dieses Arzneimittel anwenden.

Wie verwenden Sie Alhemo?

Beenden Sie die Einnahme anderer Therapien zur Verhinderung von Blutungen, bevor Sie mit Alhemo beginnen.

Beachten Sie die ausführliche Gebrauchsanweisung, bevor Sie Ihren Alhemo-Pen verwenden. Alhemo wird als Injektion unter die Haut verabreicht (subkutan). Wenden Sie Alhemo bezüglich Dosierung und Verabreichungshäufigkeit genau nach den Anweisungen Ihres Arztes oder Apothekers bzw. Ihrer Ärztin oder Apothekerin an.

Ihr medizinisches Fachpersonal und/oder Arzt bzw. Ihre Ärztin wird Ihnen zeigen, an welchen Körperstellen Alhemo injiziert werden sollte. Sie sollten Alhemo unter die Haut des Bauches oder der Oberschenkel geben.

Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin oder das medizinische Fachpersonal, wenn Sie sich nicht sicher sind oder Sie eine alternative Injektionstechnik benötigen (z.B. sollten schlanke Personen und Kinder möglicherweise in eine locker gehaltene Hautfalte injizieren, um eine zu tiefe Injektion in den Muskel zu vermeiden).

Jedes Mal, wenn Sie eine Injektion verabreichen, sollte eine andere Körperstelle als die zuvor verwendete verwendet werden, und zwar an einer der empfohlenen Stellen (Bauch oder Oberschenkel).

Umgang mit Spontanblutungen

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt bzw. Ihrer Ärztin, wie Sie mit einer potenziellen Blutung umgehen, bevor Sie Alhemo anwenden.

Anwendung bei Kindern und Jugendlichen

Alhemo kann bei Jugendlichen (ab 12 Jahren) angewendet werden. Die Dosis für Jugendliche wird ebenfalls anhand des Körpergewichts berechnet und entspricht derselben Dosis wie für Erwachsene.

Die Anwendung und Sicherheit von Alhemo bei Kindern unter 12 Jahren ist bisher nicht geprüft worden.

Wenn Sie eine grössere Menge Alhemo angewendet haben, als Sie sollten

Wenn Sie eine grössere Menge Alhemo angewendet haben, als Sie sollten, wenden Sie sich unmittelbar an Ihren Arzt bzw. Ihre Ärztin.

Wenn Sie die Anwendung von Alhemo vergessen

Alhemo kann zu jeder Tageszeit verabreicht werden.

Eine oder mehrere vergessene Dosen von Alhemo wirkt darauf aus, wie gut das Arzneimittel wirkt. Es ist wichtig, dass Sie Alhemo jeden Tag verabreichen. Wenn Sie das Arzneimittel nicht jeden Tag verabreichen können oder es nicht täglich verabreicht werden kann, sehen Sie nach, ob es ein anderes Arzneimittel zur Behandlung oder Prophylaxe der Blutungen gibt. Wenn Sie eine Dosis oder mehrere Dosen hintereinander vergessen haben, befolgen Sie die folgenden Richtlinien:

Wenn Sie in den ersten 4 Wochen der Behandlung eine Dosis vergessen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Ihre Ärztin, um zu besprechen, wie Sie mit der Behandlung fortfahren sollen.

Wenn Sie eine Dosis nach der Ermittlung der Erhaltungsdosis vergessen:

- Eine ausgelassene Tagesdosis: Es ist keine zusätzliche Dosis erforderlich. Verabreichen Sie Ihre normale Dosis am nächsten Tag und holen Sie die versäumte Dosis nicht nach.
-



2 bis 6 vergessene Tagesdosen hintereinander: Wenden Sie sich sofort an Ihren Arzt bzw. Ihre Ärztin. Während Sie Ihre normale Dosis wieder aufnehmen können, kann es sein, dass Sie angewiesen werden, die Tagesdosis zweimal zu nehmen und dann am nächsten Tag mit der normalen Dosis fortzufahren. Holen Sie verpasste Dosen nicht nach.

- 7 oder mehr vergessene Tagesdosen: Wenden Sie sich sofort an Ihren Arzt bzw. Ihre Ärztin. Ihr Arzt / Ihre Ärztin kann Sie über eine neue Initialdosis beraten, bevor Sie am nächsten Tag mit Ihrer Tagesdosis fortfahren. Holen Sie verpasste Dosen nicht nach.
- Grössere Operation: Ihr Arzt / Ihre Ärztin wird Ihnen sagen, dass Sie die Einnahme von Alhemo 4 Tage vor Ihrer Operation beenden sollen. Warten Sie nach der Operation auf Anraten Ihres Arztes / Ihrer Ärztin mindestens 10 Tage, bevor Sie Alhemo in Ihrer normalen Dosis wieder einnehmen. Holen Sie versäumte Dosen nicht nach.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, was zu tun ist, wenn Sie eine oder mehrere Dosen Alhemo vergessen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt bzw. Ihre Ärztin.

Wenn Sie die Anwendung von Alhemo abbrechen

Wenn Sie die Anwendung von Alhemo abbrechen, sind Sie möglicherweise nicht mehr vor Blutungen geschützt. Brechen Sie die Anwendung von Alhemo nicht ab, ohne vorher mit Ihrem Arzt bzw. Ihrer Ärztin gesprochen zu haben.

Ändern Sie nicht von sich aus die verschriebene Dosierung. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker bzw. mit Ihrer Ärztin oder Apothekerin.

Welche Nebenwirkungen kann Alhemo haben?

Wie alle Arzneimittel kann Alhemo Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei Alhemo wurden die folgenden Nebenwirkungen beobachtet:

Schwerwiegende Nebenwirkung bei der Anwendung von Alhemo

- Allergische Reaktionen (Überempfindlichkeitsreaktionen), siehe «Wann ist bei der Anwendung von Alhemo Vorsicht geboten?»
- Blutgerinnsel (thromboembolische Ereignisse), siehe «Wann ist bei der Anwendung von Alhemo Vorsicht geboten?»

Sehr häufig (betrifft mehr als einen von 10 Behandelten)

- Reaktion in dem Bereich, in dem die Injektion verabreicht wird (wie Rötung, Blutung, Jucken, Nesselsucht, Schwellung, Schmerzen, taubes Gefühl)

Häufig (betrifft 1 bis 10 von 100 Behandelten)

- Allergische Reaktionen (Überempfindlichkeitsreaktionen)
- Anstieg einer Blutgerinnungskomponente (Fibrin-D-Dimer)
- Anstieg einer Blutgerinnungskomponente (Prothrombin-Fragment 1.2)
- Juckreiz

Gelegentlich (betrifft 1 bis 10 von 1'000 Anwendern)

- Blutgerinnsel (thromboembolische Ereignisse)

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin. Dies gilt insbesondere auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Was ist ferner zu beachten?

Haltbarkeit



Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit «EXP» bezeichneten Datum verwendet werden.

Aufbrauchfrist nach Anbruch

Bewahren Sie den Alhemo-Pen, den Sie derzeit verwenden, ohne aufgesetzte Nadel bis zu vier Wochen lang entweder im Kühlschrank bei 2–8°C oder bei Raumtemperatur unter 30°C auf.

Für weitere Hinweise zur richtigen Aufbewahrung siehe «Lagerungshinweis».

Lagerungshinweis

Ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.

Bewahren Sie den Pen immer in der Originalverpackung auf, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

Vor Anbruch:

- Lagern Sie noch nicht angebrochene Alhemo Pens bei 2–8°C im Kühlschrank.
- Lagern Sie Ihren neuen, noch nicht angebrochenen Pen mit aufgesetzter Kappe.
- Wenn Sie den Pen im Kühlschrank lagern, legen Sie ihn nicht direkt neben das Kühlelement.
- Verwenden Sie Alhemo nicht, wenn es einmal gefroren war oder bei Temperaturen über 30°C gelagert wurde.

Angebrochener Pen:

- Bewahren Sie den derzeit verwendete Alhemo-Pen ohne aufgesetzte Nadel bis zu vier Wochen lang entweder im Kühlschrank bei 2–8°C oder bei Raumtemperatur unter 30°C auf.
 - Wenn Sie den Pen im Kühlschrank lagern, legen Sie ihn nicht direkt neben das Kühlelement. Verwenden Sie Alhemo nicht, wenn es einmal gefroren war.
 - Wenn der Pen bei Raumtemperatur gelagert wird, verwenden Sie ihn nicht, wenn er bei Temperaturen über 30°C gelagert wurde. Lagern Sie den Pen nicht in direktem Sonnenlicht.
- Lagern Sie Ihren angebrochenen Alhemo-Pen mit aufgesetzter Penkappe.

Weitere Hinweise

Verwenden Sie dieses Arzneimittel nicht, wenn Sie bemerken, dass die Lösung verfärbt ist oder feste Fremdpartikel enthält.

Arzneimittel nicht im Abwasser oder über den Haushaltsmüll entsorgen. Fragen Sie Ihren Apotheker bzw. Ihre Apothekerin, wie Sie Arzneimittel entsorgen können, die Sie nicht mehr verwenden. Diese Massnahmen tragen zum Schutz der Umwelt bei.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin. Diese Personen verfügen über die ausführliche Fachinformation.

Was ist in Alhemo enthalten?

Alhemo ist eine klare bis leicht schimmernde, farblose bis leicht gelbliche Injektionslösung in einem vorgefüllten Einweg-Fertigpen. Durchscheinende bis weisse Proteinpartikel sind akzeptabel. Verwenden Sie das Arzneimittel nicht, wenn die Lösung verfärbt ist oder feste Fremdpartikel enthält.

Wirkstoffe

Der Wirkstoff ist Concizumab (gentechnologisch in Ovarialzellen des «chinesischen Hamsters» (CHO-Zellen) hergestellt). 1 ml Lösung enthält:

- 10 mg Concizumab (15 mg/1.5 ml Lösung)
- 40 mg Concizumab (60 mg/1.5 ml Lösung)
- 100 mg Concizumab (150 mg/1.5 ml Lösung und 300 mg/3 ml Lösung)



Hilfsstoffe

Die weiteren Inhaltsstoffe sind L-Arginin HCl, L-Histidin, Natriumchlorid, Sucrose, Polysorbat 80, Phenol, Salzsäure und Natriumhydroxid (zur Einstellung des pH-Werts) und Wasser für Injektionszwecke.

Zulassungsnummer

68844 (Swissmedic)

Wo erhalten Sie Alhemo? Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken gegen ärztliche Verschreibung, die nur zum einmaligen Bezug berechtigt.

Alhemo 15 mg/1.5 ml (10 mg/ml) Injektionslösung im Fertigpen (blau)

Jeder Fertigpen enthält 15 mg Concizumab in 1.5 ml.

Alhemo 60 mg/1.5 ml (40 mg/ml) Injektionslösung im Fertigpen (braun)

Jeder Fertigpen enthält 60 mg Concizumab in 1.5 ml.

Alhemo 150 mg/1.5 ml (100 mg/ml) Injektionslösung im Fertigpen (goldfarben)

Jeder Fertigpen enthält 150 mg Concizumab in 1.5 ml.

Alhemo 300 mg/3 ml (100 mg/ml) Injektionslösung im Fertigpen (goldfarben)

Jeder Fertigpen enthält 300 mg Concizumab in 3 ml.

Jede Packung enthält 1 Fertigpen. Injektionsnadeln sind nicht enthalten.

ZulassungsinhaberIn

Novo Nordisk Pharma AG, Kloten

Domizil: Zürich

Diese Packungsbeilage wurde im September 2025 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Alhemo 15 mg/1.5 ml (10 mg/ml)

Injektionslösung im Fertigpen

Concizumab

Nur zur subkutanen Verabreichung.





Was ist in der Packung enthalten?

- 1 Alhemo-Pen
- Packungsbeilage

Lesen Sie die Gebrauchsanweisungen und lassen Sie sich von Ihrem Arzt bzw. Ihrer Ärztin oder dem medizinischen Fachpersonal zeigen, wie Sie den Pen verwenden, bevor Sie ihn selbst verwenden.

Befolgen Sie die Anweisungen Ihres Arztes bzw. Ihrer Ärztin oder des medizinischen Fachpersonals, die ihnen mitgeteilt haben, wie Sie Alhemo verwenden und wie oft Sie Alhemo injizieren sollten.

Der Fertigpen enthält 15 mg Alhemo und ist nur zur subkutanen Verabreichung vorgesehen. Der Pen enthält mehrere Dosen Alhemo.

Mit dem Pen können maximal 8 mg pro Injektion verabreicht werden. Ein Schritt auf der Dosisanzeige steht für 0.1 mg. Wenn Sie mehr als 8 mg benötigen, müssen Sie mehrere Injektionen vornehmen. Es gibt auch andere Pens, die Ihre Tagesdosis in einer einzigen Injektion verabreichen können. Fragen Sie Ihren Arzt / Ihre Ärztin oder das medizinische Fachpersonal.

- Nadeln sind nicht enthalten. Verwenden Sie kompatible Injektionsnadeln mit einer **Länge von 4 mm**. Dieser Pen ist für die Anwendung zusammen mit NovoFine® Plus oder NovoFine® 32G x 4 mm Injektionsnadeln vorgesehen.

An welcher Stelle meines Körpers sollte ich meine Dosis injizieren?

Sie können in die Haut der folgenden Körperstellen injizieren:

- in Ihren Bauch ODER
- in Ihren Oberschenkel.

Führen Sie die Injektion in einem 90°-Winkel (Neunzig Grad Winkel) durch. Die grauen Bereiche auf dem Bild rechts markieren die Injektionsstellen. Wählen Sie bei jeder Injektion eine neue Injektionsstelle, die



mindestens 5 cm von der Stelle entfernt ist, an der Sie die letzte Injektion durchgeführt haben.



Pen überprüfen 1

Aufschrift des Pens überprüfen

Überprüfen Sie den Namen und die Farbe, um sicherzustellen, dass es sich um das richtige Arzneimittel handelt.

Verfalldatum überprüfen

Überprüfen Sie das Verfalldatum auf der Aufschrift des Pens, um sicherzustellen, dass es nicht überschritten ist. Wenn das Verfalldatum überschritten ist, verwenden Sie den Pen nicht.

Arzneimittel prüfen

Ziehen Sie die Penkappe ab und überprüfen Sie, ob das Alhemo im Sichtfenster des Pens nahezu klar und farblos bis leicht gelblich ist. Es kann sein, dass weisse oder durchscheinende Partikel zu sehen sind. Verwenden Sie den Pen nicht, wenn Alhemo verfärbt aussieht oder Sie feste Partikel sehen.

Wenn Ihr Pen kalt ist


Sie können Alhemo direkt nach der Entnahme aus dem Kühlschrank injizieren oder es vor der Injektion Raumtemperatur annehmen lassen. Sie können den Pen in Ihren Händen anwärmen. Verwenden Sie keine anderen Wärmequellen.

Eine neue Nadel anbringen 2

Nehmen Sie eine neue Nadel und ziehen Sie die Papierlasche ab.

- Drücken Sie die Nadel gerade auf Ihren Pen. Drehen Sie sie, bis sie fest sitzt. Siehe A.
- Ziehen Sie die äussere Nadelkappe ab und bewahren Sie sie auf. Siehe B.
- Ziehen Sie die innere Nadelkappe ab und entsorgen Sie sie. Siehe B.

Hinweis: Verwenden Sie bei jeder Injektion eine neue Nadel.




«0.1» einstellen und den Durchfluss testen 3

Es kann sein, dass ein Tropfen Alhemo an der Nadelspitze erscheint. Sie sollten den Durchfluss von Alhemo trotzdem immer vor **jeder Injektion** testen, um eine Unterdosierung zu vermeiden:

- Drehen Sie den Dosiseinstellring einen Strich weiter, um 0.1 mg auszuwählen. Siehe A.
- Drücken Sie den Injektionsknopf. Siehe B.
- Beobachten Sie, wie ein Strahl Alhemo aus der Nadelspitze austritt. Siehe B.

Wenn kein Strahl erscheint, lesen Sie unter *Fehlerbehebung, wenn beim Durchflusstest kein Strahl erscheint* nach, was zu tun ist.



Dosis einstellen 4


Drehen Sie den Dosiseinstellring und stellen Sie die verordnete Dosis ein.

Sie können die Dosis anpassen, indem Sie den Dosiseinstellring vor- oder zurückdrehen.

Wenn Sie eine grössere Dosis benötigen als die, die Sie einstellen können, müssen Sie mehrere Injektionen vornehmen, um die Dosis vollständig zu erhalten. Es gibt auch andere Pens, die Ihre Tagesdosis in einer einzigen Injektion verabreichen können. Fragen Sie Ihren Arzt I Ihre Ärztin oder das medizinische Fachpersonal. Mehr Informationen finden Sie bei Schritt 6.

Der Pen enthält 15 mg Alhemo.

Mit dem Pen können maximal 8 mg pro Injektion verabreicht werden.



Dosis injizieren 5


Lesen Sie die Schritte a. bis e. durch, bevor Sie mit der Injektion beginnen.

Dies dient dazu, sicherzustellen, dass Sie Ihre Dosis vollständig erhalten.



- Wählen Sie die Injektionsstelle aus. Siehe *An welcher Stelle meines Körpers sollte ich meine Dosis injizieren?*
- Stechen Sie die Nadel in einem Winkel von 90° (Neunzig Grad) in Ihren Bauch oder Oberschenkel.
- Drücken Sie den Injektionsknopf und halten Sie ihn gedrückt, bis die Dosisanzeige auf «0» zurückgeht.
- Wenn die Dosisanzeige wieder «0» anzeigt, belassen Sie die Nadel in Ihrer Haut und **zählen Sie langsam bis sechs**.
- Ziehen Sie die Nadel aus der Haut.

Der Pen macht während der Dosisabgabe ein Klickgeräusch. Eventuell hören oder spüren Sie auch ein Klicken, wenn die Dosisanzeige auf «0» zurückgeht.




Nadel entfernen 6

Entfernen Sie die Nadel von Ihrem Pen, indem Sie die Spitze der Nadel auf einer ebenen Fläche in die äussere Nadelkappe einführen, ohne die Nadel oder die äussere Nadelkappe zu berühren.

Wenn die Nadel bedeckt ist, drücken Sie die äussere Nadelkappe vorsichtig fest. Schrauben Sie die Nadel ab. Berühren Sie nicht das hintere Ende der Nadel.

Entsorgen Sie die Nadel nach Anweisung Ihres Arztes, Apothekers bzw. Ihrer Ärztin, Apothekerin, des medizinischen Fachpersonals oder der nationalen Behörden.



Sie benötigen eine grössere Dosis als diejenige, die Sie einstellen können?

Ihr Arzt / Ihre Ärztin sollte Ihnen einen Pen geben, mit dem Sie Ihre Tagesdosis in einer einzigen Injektion verabreichen können. Wenn Sie eine grössere Dosis benötigen, als Sie wählen können, müssen Sie sich mehr als einmal spritzen, um die volle Dosis zu erhalten. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 6, bis Sie Ihre Dosis vollständig erhalten haben. Wenn Sie Ihre Dosis vollständig erhalten haben, fahren Sie mit Schritt 7 fort.



- Verwenden Sie bei jeder Injektion eine neue Nadel.
- Überprüfen Sie den Durchfluss von Alhemo vor jeder Injektion.
- Berechnen Sie genau, wie viel Sie bei jeder Injektion injizieren müssen, um Ihre Dosis vollständig zu erhalten.

Abschluss 7

Setzen Sie die Penkappe wieder auf den Pen, um Alhemo vor Licht zu schützen.

Jetzt kann Ihr Pen gelagert werden, bis Sie ihn wieder brauchen.



Wichtige Informationen zu Ihrem Pen

- Stellen Sie sicher, dass der Pen das richtige Arzneimittel enthält.
- Überprüfen Sie das Arzneimittel und stellen Sie sicher, dass es nahezu klar und farblos bis leicht gelblich ist, und dass keine Verfärbungen oder Festpartikel sichtbar sind.
- Verwenden Sie bei jeder Injektion eine neue Nadel.
- Ziehen Sie vor der Injektion sowohl die innere als auch die äussere Nadelkappe ab.
- Überprüfen Sie den Durchfluss von Alhemo vor jeder Injektion.
- Überprüfen Sie, ob Sie die korrekte Dosis ausgewählt haben.
- Stechen Sie die Nadel in einem Winkel von 90° (Neunzig Grad) in die Haut an Ihrem Bauch oder Oberschenkel.
- Vergewissern Sie sich nach der Injektion, dass die Dosisanzeige auf «0» zurückgeht. Wenn die Dosisanzeige wieder «0» anzeigt, zählen Sie langsam bis sechs.
- Wenn Sie eine grössere Dosis benötigen als die, die Sie einstellen können, berechnen Sie genau, wie viel Sie bei jeder Injektion injizieren müssen.
- Entfernen Sie nach der Injektion die Nadel von Ihrem Pen.
- Der Pen ist nur zur Verwendung durch einen einzigen Patienten gedacht und darf nicht für mehr als eine Person verwendet werden. Wenn der Pen für mehr als eine Person verwendet wird, kann dies zu Infektionen und zur Übertragung von Krankheiten führen.
- Befolgen Sie die Anweisungen Ihres Arztes bzw. Ihrer Ärztin oder des medizinischen Fachpersonals, die ihnen mitgeteilt haben, wie Sie Alhemo verwenden und wie oft Sie Alhemo injizieren sollten.
- Verwenden Sie Ihren Pen nach Anbruch nicht länger als 28 Tage.
- Mit dem Pen können Dosen von 0.1 mg bis 8 mg pro Injektion verabreicht werden.

Wichtige Informationen zu den Nadeln



Die Nadeln dürfen nur für jeweils eine Injektion verwendet werden.

Verwenden Sie die Nadeln nicht wieder, da dies zu einer Verstopfung der Nadel, Infektionen oder einer fehlerhaften Dosierung führen kann.

Teilen Sie Nadeln niemals mit anderen Personen.

Der Pen ist für die Anwendung zusammen mit NovoFine® Plus oder NovoFine® 32G x 4 mm Injektionsnadeln vorgesehen. Wenn Sie Nadeln mit einer Länge von mehr als 4 mm verwenden, sprechen Sie mit Ihrem Arzt bzw. Ihrer Ärztin oder dem medizinischen Fachpersonal darüber, wie Sie die Injektion durchführen.

Sie können die äussere Nadelkappe verwenden, um die Nadel von Ihrem Pen zu entfernen. Setzen Sie die äussere Nadelkappe auf die Nadel und entfernen Sie die Nadel vorsichtig.


Verwenden Sie niemals verbogene oder beschädigte Nadeln.

Fehlerbehebung, wenn beim Durchflusstest (Schritt 3) kein Strahl erscheint

- Wenn kein Strahl erscheint, wiederholen Sie Schritt 3 bis zu sechsmal, bis Sie einen Strahl sehen.
- Wenn immer noch kein Strahl erscheint, setzen Sie eine neue Nadel auf (Schritt 2) und führen Sie den Test (Schritt 3) erneut durch.
- Wenn nach Verwendung einer neuen Nadel immer noch kein Strahl erscheint, verwenden Sie den Pen nicht. Verwenden Sie einen neuen Pen.

Wie viel Alhemo verbleibt noch in Ihrem Pen?

Die Skala des Pens zeigt Ihnen ungefähr, wie viel Alhemo noch in Ihrem Pen verbleibt.



Wenn Sie genauer wissen wollen, wie viel Alhemo in Ihrem Pen verbleibt, drehen Sie den Dosiseinstellring, bis er stoppt. Die Dosisanzeige befindet sich auf der Höhe der Anzahl mg, die noch im Pen verbleiben. Die Zahl, die auf der Dosisanzeige angezeigt wird, entspricht der Anzahl mg, die noch in Ihrem Pen verbleiben.

Wenn die Dosisanzeige 8 anzeigt, verbleiben 8 mg oder mehr in Ihrem Pen. Im Beispiel unten wird angezeigt, dass noch 3.4 mg Alhemo im Pen verbleiben.



Lagerung

Wie Sie Ihren Pen lagern, können Sie in der *Patienteninformation* auf der Rückseite dieser Packungsbeilage nachlesen.

Gehen Sie mit Ihrem Pen sorgfältig um

Setzen Sie Ihren Pen nicht Staub, Schmutz oder Flüssigkeiten aus.

Der Pen darf nicht abgespült, in Flüssigkeit eingeweicht oder mit einem Schmiermittel behandelt werden. Sie können ein mit einem milden Reinigungsmittel befeuchtetes Tuch verwenden, um Ihren Pen zu



reinigen.

Bewahren Sie Ihren Pen ausser Sicht- und Reichweite von Dritten und insbesondere von Kindern auf.

Entsorgung von Alhemo-Pens, Nadeln und Verpackungsmaterial

Wenn Ihr Pen leer ist, müssen Sie ihn gemäss den lokalen Bestimmungen entsorgen.

Sie können Ihren Pen nicht wieder befüllen.

Zur Verminderung des Risikos von Nadelstichen entsorgen Sie gebrauchte Nadeln umgehend nach Anweisung Ihres Arztes, Apothekers bzw. Ihrer Ärztin, Apothekerin, des medizinischen Fachpersonals oder der nationalen Behörden.

Das Verpackungsmaterial (Umkarton und Packungsbeilage) ist rezyklierbar.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Alhemo 60 mg/1.5 ml (40 mg/ml)

Injektionslösung im Fertigpen

Concizumab

Nur zur subkutanen Verabreichung.



Was ist in der Packung enthalten?

- 1 Alhemo-Pen
- Packungsbeilage

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung und lassen Sie sich von Ihrem Arzt bzw. Ihrer Ärztin oder dem medizinischen Fachpersonal zeigen, wie Sie den Pen verwenden, bevor Sie ihn selbst verwenden.



Befolgen Sie die Anweisungen Ihres Arztes bzw. Ihrer Ärztin oder des medizinischen Fachpersonals, die ihnen mitgeteilt haben, wie Sie Alhemo verwenden und wie oft Sie Alhemo injizieren sollten.

Der Fertigpen enthält 60 mg Alhemo und ist nur zur subkutanen Verabreichung vorgesehen. Der Pen enthält mehrere Dosen Alhemo.

Mit dem Pen können maximal 32 mg pro Injektion verabreicht werden. Ein Schritt auf der Dosisanzeige steht für 0.4 mg. Wenn Sie mehr als 32 mg benötigen, müssen Sie mehrere Injektionen vornehmen. Es gibt auch andere Pens, die Ihre Tagesdosis in einer einzigen Injektion verabreichen können. Fragen Sie Ihren Arzt / Ihre Ärztin oder das medizinische Fachpersonal.

- Nadeln sind nicht enthalten. Verwenden Sie kompatible Injektionsnadeln mit einer **Länge von 4 mm**. Dieser Pen ist für die Anwendung zusammen mit NovoFine® Plus oder NovoFine® 32G x 4 mm Injektionsnadeln vorgesehen.

An welcher Stelle meines Körpers sollte ich meine Dosis injizieren?

Sie können in die Haut der folgenden Körperstellen injizieren:

- in Ihren Bauch ODER
- in Ihren Oberschenkel.

Führen Sie die Injektion in einem 90°-Winkel (Neunzig Grad Winkel) durch. Die grauen Bereiche auf dem Bild rechts markieren die Injektionsstellen. Wählen Sie bei jeder Injektion eine neue Injektionsstelle, die mindestens 5 cm von der Stelle entfernt ist, an der Sie die letzte Injektion durchgeführt haben.



Pen überprüfen 1

Aufschrift des Pens überprüfen

Überprüfen Sie den Namen und die Farbe, um sicherzustellen, dass es sich um das richtige Arzneimittel handelt.

Verfalldatum überprüfen

Überprüfen Sie das Verfalldatum auf der Aufschrift des Pens, um sicherzustellen, dass es nicht überschritten ist. Wenn das Verfalldatum überschritten ist, verwenden Sie den Pen nicht.

Arzneimittel prüfen

Ziehen Sie die Penkappe ab und überprüfen Sie, ob das Alhemo im Sichtfenster des Pens nahezu klar und farblos bis leicht gelblich ist. Es kann sein, dass weiße oder durchscheinende Partikel zu sehen sind. Verwenden Sie den Pen nicht, wenn Alhemo verfärbt aussieht oder Sie Festpartikel sehen.

Wenn Ihr Pen kalt ist

Sie können Alhemo direkt nach der Entnahme aus dem Kühlschrank injizieren oder es vor der Injektion Raumtemperatur annehmen lassen. Sie können den Pen in Ihren Händen anwärmen. Verwenden Sie keine anderen Wärmequellen.


Eine neue Nadel anbringen 2



Nehmen Sie eine neue Nadel und ziehen Sie die Papierlasche ab.

- Drücken Sie die Nadel gerade auf Ihren Pen. Drehen Sie sie, bis sie festsitzt. Siehe A.
- Ziehen Sie die äussere Nadelkappe ab und bewahren Sie sie auf. Siehe B.
- Ziehen Sie die innere Nadelkappe ab und entsorgen Sie sie. Siehe B.

Hinweis: Verwenden Sie bei jeder Injektion eine neue Nadel.




«0.4» einstellen und den Durchfluss testen 3

Es kann sein, dass ein Tropfen Alhemo an der Nadelspitze erscheint. Sie sollten den Durchfluss von Alhemo trotzdem immer vor **jeder Injektion** testen, um eine Unterdosierung zu vermeiden:

- a. Drehen Sie den Dosiseinstellring einen Strich weiter, um 0.4 mg auszuwählen. Siehe A.
- b. Drücken Sie den Injektionsknopf. Siehe B.
- c. Beobachten Sie, wie ein Strahl Alhemo aus der Nadelspitze austritt. Siehe B.

Wenn kein Strahl erscheint, lesen Sie unter *Fehlerbehebung, wenn beim Durchflusstest kein Strahl erscheint* nach, was zu tun ist.



Dosis einstellen 4

Drehen Sie den Dosiseinstellring und stellen Sie die verordnete Dosis ein.




Sie können die Dosis anpassen, indem Sie den Dosiseinstellring vor- oder zurückdrehen.

Wenn Sie eine grössere Dosis benötigen als die, die Sie einstellen können, müssen Sie mehrere Injektionen vornehmen, um die Dosis vollständig zu erhalten. Es gibt auch andere Pens, die Ihre Tagesdosis in einer einzigen Injektion verabreichen können. Fragen Sie Ihren Arzt / Ihre Ärztin oder das medizinische Fachpersonal. Mehr Informationen finden Sie bei Schritt 6.

Der Pen enthält 60 mg Alhemo.

Mit dem Pen können maximal 32 mg pro Injektion verabreicht werden.




Dosis injizieren 5

Lesen Sie die Schritte a. bis e. durch, bevor Sie mit der Injektion beginnen.

Dies dient dazu, sicherzustellen, dass Sie Ihre Dosis vollständig erhalten.

- Wählen Sie die Injektionsstelle aus. Siehe *An welcher Stelle meines Körpers sollte ich meine Dosis injizieren?*
- Stechen Sie die Nadel in einem Winkel von 90° (Neunzig Grad) in Ihren Bauch oder Oberschenkel.
- Drücken Sie den Injektionsknopf und halten Sie ihn gedrückt, bis die Dosisanzeige auf «0» zurückgeht.
- Wenn die Dosisanzeige wieder «0» anzeigt, belassen Sie die Nadel in Ihrer Haut und **zählen Sie langsam bis sechs**.
- Ziehen Sie die Nadel aus der Haut.

Der Pen macht während der Dosisabgabe ein Klickgeräusch. Eventuell hören oder spüren Sie auch ein Klicken, wenn die Dosisanzeige auf «0» zurückgeht.




Nadel entfernen 6

Entfernen Sie die Nadel von Ihrem Pen, indem Sie die Spitze der Nadel auf einer ebenen Fläche in die äussere Nadelkappe einführen, ohne die Nadel oder die äussere Nadelkappe zu berühren.

Wenn die Nadel bedeckt ist, drücken Sie die äussere Nadelkappe vorsichtig fest. Schrauben Sie die Nadel ab. Berühren Sie nicht das hintere Ende der Nadel.



Entsorgen Sie die Nadel nach Anweisung Ihres Arztes, Apothekers bzw. Ihrer Ärztin, Apothekerin, des medizinischen Fachpersonals oder der nationalen Behörden.



Sie benötigen eine grössere Dosis als diejenige, die Sie einstellen können?

Ihr Arzt / Ihre Ärztin sollte Ihnen einen Pen geben, mit dem Sie Ihre Tagesdosis in einer einzigen Injektion verabreichen können. Wenn Sie eine grössere Dosis benötigen, als Sie wählen können, müssen Sie sich mehr als einmal spritzen, um die volle Dosis zu erhalten. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 6, bis Sie Ihre Dosis vollständig erhalten haben. Wenn Sie Ihre Dosis vollständig erhalten haben, fahren Sie mit Schritt 7 fort.

- Verwenden Sie bei jeder Injektion eine neue Nadel.
- Überprüfen Sie den Durchfluss von Alhemo vor jeder Injektion.
- Berechnen Sie genau, wie viel Sie bei jeder Injektion injizieren müssen, um Ihre Dosis vollständig zu erhalten.

Abschluss 7

Setzen Sie die Penkappe wieder auf den Pen, um Alhemo vor Licht zu schützen.

Jetzt kann Ihr Pen gelagert werden, bis Sie ihn wieder brauchen.



Wichtige Informationen zu Ihrem Pen

- Stellen Sie sicher, dass der Pen das richtige Arzneimittel enthält.
- Überprüfen Sie das Arzneimittel und stellen Sie sicher, dass es nahezu klar und farblos bis leicht gelblich ist, und dass keine Verfärbungen oder Festpartikel sichtbar sind.
- Verwenden Sie bei jeder Injektion eine neue Nadel.
- Ziehen Sie vor der Injektion sowohl die innere als auch die äussere Nadelkappe ab.
- Überprüfen Sie den Durchfluss von Alhemo vor jeder Injektion.



- Überprüfen Sie, ob Sie die korrekte Dosis ausgewählt haben.
- Stechen Sie die Nadel in einem Winkel von 90° (Neunzig Grad) in die Haut an Ihrem Bauch oder Oberschenkel.
- Vergewissern Sie sich nach der Injektion, dass die Dosisanzeige auf «0» zurückgeht. Wenn die Dosisanzeige wieder «0» anzeigt, zählen Sie langsam bis sechs.
- Wenn Sie eine grössere Dosis benötigen als die, die Sie einstellen können, berechnen Sie genau, wie viel Sie bei jeder Injektion injizieren müssen.
- Entfernen Sie nach der Injektion die Nadel von Ihrem Pen.
- Der Pen ist nur zur Verwendung durch einen einzigen Patienten gedacht und darf nicht für mehr als eine Person verwendet werden. Wenn der Pen für mehr als eine Person verwendet wird, kann dies zu Infektionen und zur Übertragung von Krankheiten führen.
- Befolgen Sie die Anweisungen Ihres Arztes bzw. Ihrer Ärztin oder des medizinischen Fachpersonals, die ihnen mitgeteilt haben, wie Sie Alhemo verwenden und wie oft Sie Alhemo injizieren sollten.
- Verwenden Sie Ihren Pen nach Anbruch nicht länger als 28 Tage.
- Mit dem Pen können Dosen von 0.4 mg bis 32 mg in einer Injektion verabreicht werden.

Wichtige Informationen zu den Nadeln

Die Nadeln dürfen nur für jeweils eine Injektion verwendet werden.

Verwenden Sie die Nadeln nicht wieder, da dies zu einer Verstopfung der Nadel, Infektionen oder einer fehlerhaften Dosierung führen kann.

Teilen Sie Nadeln niemals mit anderen Personen.

Der Pen ist für die Anwendung zusammen mit NovoFine® Plus oder NovoFine® 32G x 4 mm Injektionsnadeln vorgesehen. Wenn Sie Nadeln mit einer Länge von mehr als 4 mm verwenden, sprechen Sie mit Ihrem Arzt bzw. Ihrer Ärztin oder dem medizinischen Fachpersonal darüber, wie Sie die Injektion durchführen.

Sie können die äussere Nadelkappe verwenden, um die Nadel von Ihrem Pen zu entfernen. Setzen Sie die äussere Nadelkappe auf die Nadel und entfernen Sie die Nadel vorsichtig.

Verwenden Sie niemals verbogene oder beschädigte Nadeln.

Fehlerbehebung, wenn beim Durchflusstest (Schritt 3) kein Strahl erscheint

- Wenn kein Strahl erscheint, wiederholen Sie Schritt 3 bis zu sechsmal, bis Sie einen Strahl sehen.
- Wenn immer noch kein Strahl erscheint, setzen Sie eine neue Nadel auf (Schritt 2) und führen Sie den Test (Schritt 3) erneut durch.
- Wenn nach Verwendung einer neuen Nadel immer noch kein Strahl erscheint, verwenden Sie den Pen nicht. Verwenden Sie einen neuen Pen.

Wie viel Alhemo verbleibt noch in Ihrem Pen?

Die Skala des Pens zeigt Ihnen ungefähr, wie viel Alhemo noch in Ihrem Pen verbleibt.



Wenn Sie genauer wissen wollen, wie viel Alhemo in Ihrem Pen verbleibt, drehen Sie den Dosiseinstellung, bis er stoppt. Die Dosisanzeige befindet sich auf der Höhe der Anzahl mg, die noch im Pen verbleiben. Die



Zahl, die auf der Dosisanzeige angezeigt wird, entspricht der Anzahl mg, die noch in Ihrem Pen verbleiben.

Wenn die Dosisanzeige 32 anzeigt, verbleiben 32 mg oder mehr in Ihrem Pen. Im Beispiel unten wird angezeigt, dass noch 13.6 mg Alhemo im Pen verbleiben.



Lagerung

Wie Sie Ihren Pen lagern, können Sie in der *Patienteninformation* auf der Rückseite dieser Packungsbeilage nachlesen.

Gehen Sie mit Ihrem Pen sorgfältig um

Setzen Sie Ihren Pen nicht Staub, Schmutz oder Flüssigkeiten aus.

Der Pen darf nicht abgespült, in Flüssigkeit eingeweicht oder mit einem Schmiermittel behandelt werden. Sie können ein mit einem milden Reinigungsmittel befeuchtetes Tuch verwenden, um Ihren Pen zu reinigen.

Bewahren Sie Ihren Pen ausser Sicht- und Reichweite von Dritten und insbesondere von Kindern auf.

Entsorgung von Alhemo-Pens, Nadeln und Verpackungsmaterial

Wenn Ihr Pen leer ist, müssen Sie ihn gemäss den lokalen Bestimmungen entsorgen.

Sie können Ihren Pen nicht wieder befüllen.

Zur Verminderung des Risikos von Nadelstichen entsorgen Sie gebrauchte Nadeln umgehend nach Anweisung Ihres Arztes, Apothekers bzw. Ihrer Ärztin, Apothekerin, des medizinischen Fachpersonals oder der nationalen Behörden.

Das Verpackungsmaterial (Umkarton und Packungsbeilage) ist rezyklierbar.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Alhemo 150 mg/1.5 ml (100 mg/ml)

Injektionslösung im Fertigpen

Concizumab

Nur zur subkutanen Verabreichung.





Was ist in der Packung enthalten?

- 1 Alhemo-Pen
- Packungsbeilage

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung und lassen Sie sich von Ihrem Arzt bzw. Ihrer Ärztin oder dem medizinischen Fachpersonal zeigen, wie Sie den Pen verwenden, bevor Sie ihn selbst verwenden.

Befolgen Sie die Anweisungen Ihres Arztes bzw. Ihrer Ärztin oder des medizinischen Fachpersonals, die ihnen mitgeteilt haben, wie Sie Alhemo verwenden und wie oft Sie Alhemo injizieren sollten.

Der Fertigpen enthält 150 mg Alhemo und ist nur zur subkutanen Verabreichung vorgesehen. Der Pen enthält mehrere Dosen Alhemo.

Mit dem Pen können maximal 80 mg pro Injektion verabreicht werden. Ein Schritt auf der Dosisanzeige steht für 1 mg. Wenn Sie mehr als 80 mg benötigen, müssen Sie mehrere Injektionen vornehmen.

- Nadeln sind nicht enthalten. Verwenden Sie kompatible Injektionsnadeln mit einer **Länge von 4 mm**. Dieser Pen ist für die Anwendung zusammen mit NovoFine® Plus oder NovoFine® 32G x 4 mm Injektionsnadeln vorgesehen.

An welcher Stelle meines Körpers sollte ich meine Dosis injizieren?

Sie können in die Haut der folgenden Körperstellen injizieren:

- in Ihren Bauch ODER
- in Ihren Oberschenkel.

Führen Sie die Injektion in einem 90°-Winkel (Neunzig Grad Winkel) durch. Die grauen Bereiche auf dem Bild rechts markieren die Injektionsstellen. Wählen Sie bei jeder Injektion eine neue Injektionsstelle, die mindestens 5 cm von der Stelle entfernt ist, an der Sie die letzte Injektion durchgeführt haben.





Pen überprüfen 1

Aufschrift des Pens überprüfen

Überprüfen Sie den Namen und die Farbe, um sicherzustellen, dass es sich um das richtige Arzneimittel handelt.

Verfalldatum überprüfen

Überprüfen Sie das Verfalldatum auf der Aufschrift des Pens, um sicherzustellen, dass es nicht überschritten ist. Wenn das Verfalldatum überschritten ist, verwenden Sie den Pen nicht.

Arzneimittel prüfen

Ziehen Sie die Penkappe ab und überprüfen Sie, ob das Alhemo im Sichtfenster des Pens nahezu klar und farblos bis leicht gelblich ist. Es kann sein, dass weisse oder durchscheinende Partikel zu sehen sind. Verwenden Sie den Pen nicht, wenn Alhemo verfärbt aussieht oder Sie Festpartikel sehen.

Wenn Ihr Pen kalt ist


Sie können Alhemo direkt nach der Entnahme aus dem Kühlschrank injizieren oder es vor der Injektion Raumtemperatur annehmen lassen. Sie können den Pen in Ihren Händen anwärmen. Verwenden Sie keine anderen Wärmequellen.

Eine neue Nadel anbringen 2

Nehmen Sie eine neue Nadel und ziehen Sie die Papierlasche ab.

- Drücken Sie die Nadel gerade auf Ihren Pen. Drehen Sie sie, bis sie fest sitzt. Siehe A.
- Ziehen Sie die äussere Nadelkappe ab und bewahren Sie sie auf. Siehe B.
- Ziehen Sie die innere Nadelkappe ab und entsorgen Sie sie. Siehe B.

Hinweis: Verwenden Sie bei jeder Injektion eine neue Nadel.




«1» einstellen und den Durchfluss testen 3



Es kann sein, dass ein Tropfen Alhemo an der Nadelspitze erscheint. Sie sollten den Durchfluss von Alhemo trotzdem immer vor **jeder Injektion** testen, um eine Unterdosierung zu vermeiden:

- Drehen Sie den Dosiseinstellring einen Strich weiter, um 1 mg auszuwählen. Siehe A.
- Drücken Sie den Injektionsknopf. Siehe B.
- Beobachten Sie, wie ein Strahl Alhemo aus der Nadelspitze austritt. Siehe B.

Wenn kein Strahl erscheint, lesen Sie unter *Fehlerbehebung, wenn beim Durchflusstest kein Strahl erscheint* nach, was zu tun ist.



Dosis einstellen 4

Drehen Sie den Dosiseinstellring und stellen Sie die verordnete Dosis ein.

Sie können die Dosis anpassen, indem Sie den Dosiseinstellring vor- oder zurückdrehen.

Wenn Sie eine grössere Dosis benötigen als die, die Sie einstellen können, müssen Sie mehrere Injektionen vornehmen, um die Dosis vollständig zu erhalten. Mehr Informationen finden Sie bei Schritt 6.

Der Pen enthält 150 mg Alhemo.

Mit dem Pen können maximal 80 mg pro Injektion verabreicht werden.



Dosis injizieren 5

Lesen Sie die Schritte a. bis e. durch, bevor Sie mit der Injektion beginnen.


Dies dient dazu, sicherzustellen, dass Sie Ihre Dosis vollständig erhalten.

- Wählen Sie die Injektionsstelle aus. Siehe *An welcher Stelle meines Körpers sollte ich meine Dosis injizieren?*
- Stechen Sie die Nadel in einem Winkel von 90° (Neunzig Grad) in Ihren Bauch oder Oberschenkel.



- c. Drücken Sie den Injektionsknopf und halten Sie ihn gedrückt, bis die Dosisanzeige auf «0» zurückgeht.
- d. Wenn die Dosisanzeige wieder «0» anzeigt, belassen Sie die Nadel in Ihrer Haut und **zählen Sie langsam bis sechs**.
- e. Ziehen Sie die Nadel aus der Haut.

Der Pen macht während der Dosisabgabe ein Klickgeräusch. Eventuell hören oder spüren Sie auch ein Klicken, wenn die Dosisanzeige auf «0» zurückgeht.



Nadel entfernen 6

Entfernen Sie die Nadel von Ihrem Pen, indem Sie die Spitze der Nadel auf einer ebenen Fläche in die äussere Nadelkappe einführen, ohne die Nadel oder die äussere Nadelkappe zu berühren.

Wenn die Nadel bedeckt ist, drücken Sie die äussere Nadelkappe vorsichtig fest. Schrauben Sie die Nadel ab. Berühren Sie nicht das hintere Ende der Nadel.

Entsorgen Sie die Nadel nach Anweisung Ihres Arztes, Apothekers bzw. Ihrer Ärztin, Apothekerin, des medizinischen Fachpersonals oder der nationalen Behörden.



Sie benötigen eine grössere Dosis als diejenige, die Sie einstellen können?

Wenn Sie eine grössere Dosis benötigen, als Sie wählen können, müssen Sie sich mehr als einmal spritzen, um die volle Dosis zu erhalten. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 6, bis Sie Ihre Dosis vollständig erhalten haben. Wenn Sie Ihre Dosis vollständig erhalten haben, fahren Sie mit Schritt 7 fort.

- Verwenden Sie bei jeder Injektion eine neue Nadel.
- Überprüfen Sie den Durchfluss von Alhemo vor jeder Injektion.
- Berechnen Sie genau, wie viel Sie bei jeder Injektion injizieren müssen, um Ihre Dosis vollständig zu erhalten.



Abschluss 7

Setzen Sie die Penkappe wieder auf den Pen, um Alhemo vor Licht zu schützen.

Jetzt kann Ihr Pen gelagert werden, bis Sie ihn wieder brauchen.



Wichtige Informationen zu Ihrem Pen

- Stellen Sie sicher, dass der Pen das richtige Arzneimittel enthält.
- Überprüfen Sie das Arzneimittel und stellen Sie sicher, dass es nahezu klar und farblos bis leicht gelblich ist, und dass keine Verfärbungen oder Festpartikel sichtbar sind.
- Verwenden Sie bei jeder Injektion eine neue Nadel.
- Ziehen Sie vor der Injektion sowohl die innere als auch die äussere Nadelkappe ab.
- Überprüfen Sie den Durchfluss von Alhemo vor jeder Injektion.
- Überprüfen Sie, ob Sie die korrekte Dosis ausgewählt haben.
- Stechen Sie die Nadel in einem Winkel von 90° (Neunzig Grad) in die Haut an Ihrem Bauch oder Oberschenkel.
- Vergewissern Sie sich nach der Injektion, dass die Dosisanzeige auf «0» zurückgeht. Wenn die Dosisanzeige wieder «0» anzeigt, zählen Sie langsam bis sechs.
- Wenn Sie eine grössere Dosis benötigen als die, die Sie einstellen können, berechnen Sie genau, wie viel Sie bei jeder Injektion injizieren müssen.
- Entfernen Sie nach der Injektion die Nadel von Ihrem Pen.
- Der Pen ist nur zur Verwendung durch einen einzigen Patienten gedacht und darf nicht für mehr als eine Person verwendet werden. Wenn der Pen für mehr als eine Person verwendet wird, kann dies zu Infektionen und zur Übertragung von Krankheiten führen.
- Befolgen Sie die Anweisungen Ihres Arztes bzw. Ihrer Ärztin oder des medizinischen Fachpersonals, die ihnen mitgeteilt haben, wie Sie Alhemo verwenden und wie oft Sie Alhemo injizieren sollten.
- Verwenden Sie Ihren Pen nach Anbruch nicht länger als 28 Tage.
- Mit dem Pen können Dosen von 1 mg bis 80 mg in einer Injektion verabreicht werden.

Wichtige Informationen zu den Nadeln

Die Nadeln dürfen nur für jeweils eine Injektion verwendet werden.

Verwenden Sie die Nadeln nicht wieder, da dies zu einer Verstopfung der Nadel, Infektionen oder einer fehlerhaften Dosierung führen kann.

Teilen Sie Nadeln niemals mit anderen Personen.



Der Pen ist für die Anwendung zusammen mit NovoFine® Plus oder NovoFine® 32G x 4 mm Injektionsnadeln vorgesehen. Wenn Sie Nadeln mit einer Länge von mehr als 4 mm verwenden, sprechen Sie mit Ihrem Arzt bzw. Ihrer Ärztin oder dem medizinischen Fachpersonal darüber, wie Sie die Injektion durchführen.

Sie können die äussere Nadelkappe verwenden, um die Nadel von Ihrem Pen zu entfernen. Setzen Sie die äussere Nadelkappe auf die Nadel und entfernen Sie die Nadel vorsichtig.


Verwenden Sie niemals verbogene oder beschädigte Nadeln.

Fehlerbehebung, wenn beim Durchflusstest (Schritt 3) kein Strahl erscheint

- Wenn kein Strahl erscheint, wiederholen Sie Schritt 3 bis zu sechsmal, bis Sie einen Strahl sehen.
- Wenn immer noch kein Strahl erscheint, setzen Sie eine neue Nadel auf (Schritt 2) und führen Sie den Test (Schritt 3) erneut durch.
- Wenn nach Verwendung einer neuen Nadel immer noch kein Strahl erscheint, verwenden Sie den Pen nicht. Verwenden Sie einen neuen Pen.

Wie viel Alhemo verbleibt noch in Ihrem Pen?

Die Skala des Pens zeigt Ihnen ungefähr, wie viel Alhemo noch in Ihrem Pen verbleibt.



Wenn Sie genauer wissen wollen, wie viel Alhemo in Ihrem Pen verbleibt, drehen Sie den Dosiseinstellring, bis er stoppt. Die Dosisanzeige befindet sich auf der Höhe der Anzahl mg, die noch im Pen verbleiben. Die Zahl, die auf der Dosisanzeige angezeigt wird, entspricht der Anzahl mg, die noch in Ihrem Pen verbleiben.

Wenn die Dosisanzeige 80 anzeigt, verbleiben 80 mg oder mehr in Ihrem Pen. Im Beispiel unten wird angezeigt, dass noch 34 mg Alhemo im Pen verbleiben.



Lagerung

Wie Sie Ihren Pen lagern, können Sie in der *Patienteninformation* auf der Rückseite dieser Packungsbeilage nachlesen.

Gehen Sie mit Ihrem Pen sorgfältig um

Setzen Sie Ihren Pen nicht Staub, Schmutz oder Flüssigkeiten aus.

Der Pen darf nicht abgespült, in Flüssigkeit eingeweicht oder mit einem Schmiermittel behandelt werden. Sie können ein mit einem milden Reinigungsmittel befeuchtetes Tuch verwenden, um Ihren Pen zu reinigen.

Bewahren Sie Ihren Pen ausser Sicht- und Reichweite von Dritten und insbesondere von Kindern auf.

Entsorgung von Alhemo-Pens, Nadeln und Verpackungsmaterial

Wenn Ihr Pen leer ist, müssen Sie ihn gemäss den lokalen Bestimmungen entsorgen.

Sie können Ihren Pen nicht wieder befüllen.



Zur Verminderung des Risikos von Nadelstichen entsorgen Sie gebrauchte Nadeln umgehend nach Anweisung Ihres Arztes, Apothekers bzw. Ihrer Ärztin, Apothekerin, des medizinischen Fachpersonals oder der nationalen Behörden.

Das Verpackungsmaterial (Umkarton und Packungsbeilage) ist rezyklierbar.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Alhemo 300 mg/3 ml (100 mg/ml)

Injektionslösung im Fertigpen

Concizumab

Nur zur subkutanen Verabreichung.



Was ist in der Packung enthalten?

- 1 Alhemo-Pen
- Packungsbeilage

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung und lassen Sie sich von Ihrem Arzt bzw. Ihrer Ärztin oder dem medizinischen Fachpersonal zeigen, wie Sie den Pen verwenden, bevor Sie ihn selbst verwenden.

Befolgen Sie die Anweisungen Ihres Arztes bzw. Ihrer Ärztin oder des medizinischen Fachpersonals, die ihnen mitgeteilt haben, wie Sie Alhemo verwenden und wie oft Sie Alhemo injizieren sollten.

Der Fertigpen enthält 300 mg Alhemo und ist nur zur subkutanen Verabreichung vorgesehen. Der Pen enthält mehrere Dosen Alhemo.

Mit dem Pen können maximal 80 mg pro Injektion verabreicht werden. Ein Schritt auf der Dosisanzeige steht für 1 mg. Wenn Sie mehr als 80 mg benötigen, müssen Sie mehrere Injektionen vornehmen.



- Nadeln sind nicht enthalten. Verwenden Sie kompatible Injektionsnadeln mit einer **Länge von 4 mm**. Dieser Pen ist für die Anwendung zusammen mit NovoFine® Plus oder NovoFine® 32G x 4 mm Injektionsnadeln vorgesehen.

An welcher Stelle meines Körpers sollte ich meine Dosis injizieren?

Sie können in die Haut der folgenden Körperstellen injizieren:

- in Ihren Bauch ODER
- in Ihren Oberschenkel.

Führen Sie die Injektion in einem 90°-Winkel (Neunzig Grad Winkel) durch. Die grauen Bereiche auf dem Bild rechts markieren die Injektionsstellen. Wählen Sie bei jeder Injektion eine neue Injektionsstelle, die mindestens 5 cm von der Stelle entfernt ist, an der Sie die letzte Injektion durchgeführt haben.



Pen überprüfen 1

Aufschrift des Pens überprüfen

Überprüfen Sie den Namen und die Farbe, um sicherzustellen, dass es sich um das richtige Arzneimittel handelt.

Verfalldatum überprüfen

Überprüfen Sie das Verfalldatum auf der Aufschrift des Pens, um sicherzustellen, dass es nicht überschritten ist. Wenn das Verfalldatum überschritten ist, verwenden Sie den Pen nicht.

Arzneimittel prüfen

Ziehen Sie die Penkappe ab und überprüfen Sie, ob das Alhemo im Sichtfenster des Pens nahezu klar und farblos bis leicht gelblich ist. Es kann sein, dass weisse oder durchscheinende Partikel zu sehen sind. Verwenden Sie den Pen nicht, wenn Alhemo verfärbt aussieht oder Sie Festpartikel sehen.

Wenn Ihr Pen kalt ist

Sie können Alhemo direkt nach der Entnahme aus dem Kühlschrank injizieren oder es vor der Injektion Raumtemperatur annehmen lassen. Sie können den Pen in Ihren Händen anwärmen. Verwenden Sie keine anderen Wärmequellen.


Eine neue Nadel anbringen 2

Nehmen Sie eine neue Nadel und ziehen Sie die Papierlasche ab.

- Drücken Sie die Nadel gerade auf Ihren Pen. Drehen Sie sie, bis sie fest sitzt. Siehe A.
- Ziehen Sie die äussere Nadelkappe ab und bewahren Sie sie auf. Siehe B.
- Ziehen Sie die innere Nadelkappe ab und entsorgen Sie sie. Siehe B.

Hinweis: Verwenden Sie bei jeder Injektion eine neue Nadel.






«1» einstellen und den Durchfluss testen 3

Es kann sein, dass ein Tropfen Alhemo an der Nadelspitze erscheint. Sie sollten den Durchfluss von Alhemo trotzdem immer vor **jeder Injektion** testen, um eine Unterdosierung zu vermeiden:

- Drehen Sie den Dosiseinstellring einen Strich weiter, um 1 mg auszuwählen. Siehe A.
- Drücken Sie den Injektionsknopf. Siehe B.
- Beobachten Sie, wie ein Strahl Alhemo aus der Nadelspitze austritt. Siehe B.

Wenn kein Strahl erscheint, lesen Sie unter *Fehlerbehebung, wenn beim Durchflusstest kein Strahl erscheint* nach, was zu tun ist.



Dosis einstellen 4

Drehen Sie den Dosiseinstellring und stellen Sie die verordnete Dosis ein.

Sie können die Dosis anpassen, indem Sie den Dosiseinstellring vor- oder zurückdrehen.

Wenn Sie eine grössere Dosis benötigen als die, die Sie einstellen können, müssen Sie mehrere Injektionen vornehmen, um die Dosis vollständig zu erhalten. Mehr Informationen finden Sie bei Schritt 6.

Der Pen enthält 300 mg Alhemo.



Mit dem Pen können maximal 80 mg pro Injektion verabreicht werden.




Dosis injizieren 5

Lesen Sie die Schritte a. bis e. durch, bevor Sie mit der Injektion beginnen.

Dies dient dazu, sicherzustellen, dass Sie Ihre Dosis vollständig erhalten.

- Wählen Sie die Injektionsstelle aus. Siehe *An welcher Stelle meines Körpers sollte ich meine Dosis injizieren?*
- Stechen Sie die Nadel in einem Winkel von 90° (Neunzig Grad) in Ihren Bauch oder Oberschenkel.
- Drücken Sie den Injektionsknopf und halten Sie ihn gedrückt, bis die Dosisanzeige auf «0» zurückgeht.
- Wenn die Dosisanzeige wieder «0» anzeigt, belassen Sie die Nadel in Ihrer Haut und **zählen Sie langsam bis sechs**.
- Ziehen Sie die Nadel aus der Haut.

Der Pen macht während der Dosisabgabe ein Klickgeräusch. Eventuell hören oder spüren Sie auch ein Klicken, wenn die Dosisanzeige auf «0» zurückgeht.




Nadel entfernen 6

Entfernen Sie die Nadel von Ihrem Pen, indem Sie die Spitze der Nadel auf einer ebenen Fläche in die äussere Nadelkappe einführen, ohne die Nadel oder die äussere Nadelkappe zu berühren.

Wenn die Nadel bedeckt ist, drücken Sie die äussere Nadelkappe vorsichtig fest. Schrauben Sie die Nadel ab. Berühren Sie nicht das hintere Ende der Nadel.

Entsorgen Sie die Nadel nach Anweisung Ihres Arztes, Apothekers bzw. Ihrer Ärztin, Apothekerin, des medizinischen Fachpersonals oder der nationalen Behörden.





Sie benötigen eine grössere Dosis als diejenige, die Sie einstellen können?

Wenn Sie eine grössere Dosis benötigen, als Sie wählen können, müssen Sie sich mehr als einmal spritzen, um die volle Dosis zu erhalten. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 6, bis Sie Ihre Dosis vollständig erhalten haben. Wenn Sie Ihre Dosis vollständig erhalten haben, fahren Sie mit Schritt 7 fort.

- Verwenden Sie bei jeder Injektion eine neue Nadel.
- Überprüfen Sie den Durchfluss von Alhemo vor jeder Injektion.
- Berechnen Sie genau, wie viel Sie bei jeder Injektion injizieren müssen, um Ihre Dosis vollständig zu erhalten.

Abschluss 7

Setzen Sie die Penkappe wieder auf den Pen, um Alhemo vor Licht zu schützen.

Jetzt kann Ihr Pen gelagert werden, bis Sie ihn wieder brauchen.



Wichtige Informationen zu Ihrem Pen

- Stellen Sie sicher, dass der Pen das richtige Arzneimittel enthält.
- Überprüfen Sie das Arzneimittel und stellen Sie sicher, dass es nahezu klar und farblos bis leicht gelblich ist, und dass keine Verfärbungen oder Festpartikel sichtbar sind.
- Verwenden Sie bei jeder Injektion eine neue Nadel.
- Ziehen Sie vor der Injektion sowohl die innere als auch die äussere Nadelkappe ab.
- Überprüfen Sie den Durchfluss von Alhemo vor jeder Injektion.
- Überprüfen Sie, ob Sie die korrekte Dosis ausgewählt haben.
- Stechen Sie die Nadel in einem Winkel von 90° (Neunzig Grad) in die Haut an Ihrem Bauch oder Oberschenkel.



- Vergewissern Sie sich nach der Injektion, dass die Dosisanzeige auf «0» zurückgeht. Wenn die Dosisanzeige wieder «0» anzeigt, zählen Sie langsam bis sechs.
- Wenn Sie eine grössere Dosis benötigen als die, die Sie einstellen können, berechnen Sie genau, wie viel Sie bei jeder Injektion injizieren müssen.
- Entfernen Sie nach der Injektion die Nadel von Ihrem Pen.
- Der Pen ist nur zur Verwendung durch einen einzigen Patienten gedacht und darf nicht für mehr als eine Person verwendet werden. Wenn der Pen für mehr als eine Person verwendet wird, kann dies zu Infektionen und zur Übertragung von Krankheiten führen.
- Befolgen Sie die Anweisungen Ihres Arztes bzw. Ihrer Ärztin oder des medizinischen Fachpersonals, die ihnen mitgeteilt haben, wie Sie Alhemo verwenden und wie oft Sie Alhemo injizieren sollten.
- Verwenden Sie Ihren Pen nach Anbruch nicht länger als 28 Tage.
- Mit dem Pen können Dosen von 1 mg bis 80 mg in einer Injektion verabreicht werden.

Wichtige Informationen zu den Nadeln

Die Nadeln dürfen nur für jeweils eine Injektion verwendet werden.

Verwenden Sie die Nadeln nicht wieder, da dies zu einer Verstopfung der Nadel, Infektionen oder einer fehlerhaften Dosierung führen kann.

Teilen Sie Nadeln niemals mit anderen Personen.

Der Pen ist für die Anwendung zusammen mit NovoFine® Plus oder NovoFine® 32G x 4 mm Injektionsnadeln vorgesehen. Wenn Sie Nadeln mit einer Länge von mehr als 4 mm verwenden, sprechen Sie mit Ihrem Arzt bzw. Ihrer Ärztin oder dem medizinischen Fachpersonal darüber, wie Sie die Injektion durchführen.

Sie können die äussere Nadelkappe verwenden, um die Nadel von Ihrem Pen zu entfernen. Setzen Sie die äussere Nadelkappe auf die Nadel und entfernen Sie die Nadel vorsichtig.


Verwenden Sie niemals verbogene oder beschädigte Nadeln.

Fehlerbehebung, wenn beim Durchflusstest (Schritt 3) kein Strahl erscheint

- Wenn kein Strahl erscheint, wiederholen Sie Schritt 3 bis zu sechsmal, bis Sie einen Strahl sehen.
- Wenn immer noch kein Strahl erscheint, setzen Sie eine neue Nadel auf (Schritt 2) und führen Sie den Test (Schritt 3) erneut durch.
- Wenn nach Verwendung einer neuen Nadel immer noch kein Strahl erscheint, verwenden Sie den Pen nicht. Verwenden Sie einen neuen Pen.

Wie viel Alhemo verbleibt noch in Ihrem Pen?

Die Skala des Pens zeigt Ihnen ungefähr, wie viel Alhemo noch in Ihrem Pen verbleibt.



Wenn Sie genauer wissen wollen, wie viel Alhemo in Ihrem Pen verbleibt, drehen Sie den Dosiseinstellring, bis er stoppt. Die Dosisanzeige befindet sich auf der Höhe der Anzahl mg, die noch im Pen verbleiben. Die Zahl, die auf der Dosisanzeige angezeigt wird, entspricht der Anzahl mg, die noch in Ihrem Pen verbleiben.

Wenn die Dosisanzeige 80 anzeigt, verbleiben 80 mg oder mehr in Ihrem Pen. Im Beispiel unten wird angezeigt, dass noch 34 mg Alhemo im Pen verbleiben.





Lagerung

Wie Sie Ihren Pen lagern, können Sie in der *Patienteninformation* auf der Rückseite dieser Packungsbeilage nachlesen.

Gehen Sie mit Ihrem Pen sorgfältig um

Setzen Sie Ihren Pen nicht Staub, Schmutz oder Flüssigkeiten aus.

Der Pen darf nicht abgespült, in Flüssigkeit eingeweicht oder mit einem Schmiermittel behandelt werden. Sie können ein mit einem milden Reinigungsmittel befeuchtetes Tuch verwenden, um Ihren Pen zu reinigen.

Bewahren Sie Ihren Pen ausser Sicht- und Reichweite von Dritten und insbesondere von Kindern auf.

Entsorgung von Alhemo-Pens, Nadeln und Verpackungsmaterial

Wenn Ihr Pen leer ist, müssen Sie ihn gemäss den lokalen Bestimmungen entsorgen.

Sie können Ihren Pen nicht wieder befüllen.

Zur Verminderung des Risikos von Nadelstichen entsorgen Sie gebrauchte Nadeln umgehend nach Anweisung Ihres Arztes, Apothekers bzw. Ihrer Ärztin, Apothekerin, des medizinischen Fachpersonals oder der nationalen Behörden.

Das Verpackungsmaterial (Umkarton und Packungsbeilage) ist rezyklierbar.

