

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage avant de prendre ou d'utiliser ce médicament. Ce médicament vous a été remis personnellement sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Olopatadine Labatec®

Labatec Pharma SA

Qu'est-ce que Olopatadine Labatec et quand doit-il être utilisé?

Olopatadine Labatec est destiné au traitement des symptômes des conjonctivites allergiques saisonnières.

Conjonctivite allergique: la surface de votre œil est constamment exposée à des agents de l'environnement. Le contact avec des agents (allergènes) comme les pollens, la poussière de maison ou les poils d'animaux peut être à l'origine de réactions allergiques se manifestant par des démangeaisons, des rougeurs et des gonflements de la surface de votre œil.

Olopatadine Labatec est un médicament pour le traitement des symptômes d'une allergie oculaire. Olopatadine Labatec diminue l'intensité de la réaction allergique. Olopatadine Labatec collyre ne peut être utilisé que selon prescription du médecin.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez à personne d'autre. Vous risqueriez de causer du tort à cette personne, même si elle présente la même maladie que vous.

Ce médicament contient 3,35 mg de phosphates par millilitre de solution.

Quand Olopatadine Labatec ne doit-il pas être utilisé?

Si vous êtes allergique à l'olopatadine ou à l'un des autres composants du médicament. Demandez l'avis de votre médecin.

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation d'Olopatadine Labatec?

Le chlorure de benzalkonium peut être absorbé par les lentilles de contact souples et changer leur couleur. Retirer les lentilles de contact avant application et attendre au moins 15 minutes avant de les remettre. Le chlorure de benzalkonium peut également provoquer une irritation des yeux, surtout si vous souffrez du syndrome de l'œil sec ou d'une affection de la cornée (couche transparente à l'avant de l'œil). En cas de sensation anormale, de picotements ou de douleur dans les yeux après avoir utilisé ce médicament, contactez votre médecin.

Ce médicament contient 0,10 mg de chlorure de benzalkonium par millilitre de solution.

Aptitude à la conduite et l'utilisation de machines

Vous pouvez trouver que votre vision est légèrement trouble juste après avoir utilisé Olopatadine Labatec. Ne conduisez pas de voiture et n'utilisez pas de machines avant de pouvoir à nouveau voir normalement.

Olopatadine Labatec ne doit pas être utilisé chez les enfants de moins de trois ans. Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments ou appliquez déjà sur vos yeux d'autres médicaments (même en automédication)!

Olopatadine Labatec peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Pour des raisons de sécurité, il est préférable de ne pas utiliser d'olopatadine pendant la grossesse.



Si vous allaitez, n'utilisez pas Olopatadine Labatec, car le médicament peut passer dans votre lait.

Comment utiliser Olopatadine Labatec?

Posologie usuelle

Adultes et enfants à partir de trois ans: une goutte dans l'œil (ou les yeux) atteint(s), deux fois par jour (matin et soir).

Suivez cette recommandation à moins que votre médecin ne vous ait prescrit un autre dosage. Appliquez Olopatadine Labatec sur les deux yeux uniquement si votre médecin vous a dit de le faire. Utilisez Olopatadine Labatec aussi longtemps que votre médecin vous l'a prescrit.


Utilisez Olopatadine Labatec seulement en gouttes dans les yeux.

L'utilisation et la sécurité d'Olopatadine Labatec collyre n'ont pas été établies à ce jour pour les enfants de moins de trois ans.

Comment utiliser Olopatadine Labatec?



1



2

- Prenez le flacon d'Olopatadine Labatec et un miroir.
- Lavez-vous les mains.
- Prenez le flacon et enlevez le bouchon en le dévissant.
- Tenez le flacon tête en bas, entre le pouce et le majeur.
- Penchez la tête en arrière. Avec un doigt propre, tirez doucement votre paupière vers le bas pour créer un sillon entre la paupière et l'œil. La goutte sera déposée à cet endroit (figure 1).
- Rapprochez l'embout du flacon de votre œil. Si besoin, utilisez un miroir.
- Ne touchez pas votre œil ou votre paupière, les surfaces voisines ou d'autres surfaces avec le compte-gouttes. Cela peut infecter le collyre restant dans le flacon.
- Appuyez légèrement sur la base du flacon pour libérer une goutte d'Olopatadine Labatec à la fois.
- Ne comprimez pas le flacon: il a été conçu de manière à ce que seule une légère pression sur la base suffise (figure 2).
- Si vous devez traiter les deux yeux, recommencez ces étapes pour l'autre œil.
- Il est recommandé de fermer le canal lacrymal par une légère compression ou en fermant doucement la paupière pendant deux minutes après l'instillation. Cela peut contribuer à réduire les effets secondaires systémiques et à améliorer l'effet local.
- Bien refermer le flacon immédiatement après usage.

Après la première ouverture du flacon, enlever la bague de protection en plastique avant utilisation.

Si vous en avez mis trop de médicament dans les yeux, rincez-les avec de l'eau tiède. Ne mettez pas d'autres gouttes jusqu'à ce que le moment soit venu de mettre la goutte suivante.

Si vous avez oublié d'utiliser Olopatadine Labatec collyre, instillez une goutte unique dès que vous vous rendez compte de votre omission et reprenez ensuite le rythme normal du traitement. N'utilisez pas une double dose pour compenser la dose manquante.



Si vous utilisez un autre collyre en plus, attendez au moins 5 à 10 minutes entre l'utilisation d'Olopatadine Labatec et celle de l'autre collyre.

Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires Olopatadine Labatec collyre peut-il provoquer?

Certains patients qui utilisent Olopatadine Labatec peuvent présenter des effets secondaires. Ceux-ci peuvent être désagréables mais la plupart disparaissent rapidement.

Vous pouvez continuer normalement à utiliser le collyre, à moins que les réactions ne soient graves. Si vous vous inquiétez, contactez votre médecin ou votre pharmacien.

Occasionnel (concerne jusqu'à 1 utilisateur sur 100)

Effets sur les yeux: kératite, sécheresse des yeux, douleurs oculaires, gonflement de la paupière, écoulement oculaire, sensation de corps étranger, yeux rouges, anomalies de la paupière, rougeurs, gonflement des paupières ou formation de croûtes sur la paupière.

Effets sur le corps: maux de tête, goût désagréable, fatigue, sécheresse de la muqueuse nasale, inflammations, rougeurs et démangeaisons de la peau.

Rare (concerne jusqu'à 1 utilisateur sur 1000)

Effets sur les yeux: vision floue.

Effets sur le corps: vertiges, sécheresse de la bouche, eczéma de contact allergique.

Les autres effets indésirables, parmi ceux qui ont été rapportés, comprennent:

Effet sur les yeux: augmentation du larmoiement.

Si vous souffrez de dommages sévères de la cornée (couche transparente située à l'avant de l'œil), les phosphates peuvent causer, dans de très rares cas, une opacification (nuage) de la cornée en raison de l'accumulation de calcium pendant le traitement.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention?

Stabilité

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Délai d'utilisation après ouverture

Vous devez jeter le flacon vingt-huit jours après l'avoir ouvert pour la première fois, pour éviter les infections. Inscrivez la date à laquelle vous l'avez ouvert dans l'espace sur l'étiquette du flacon et sur la boîte.

Pour éviter une contamination de l'embout compte-gouttes du flacon et de la solution, il est important de ne pas toucher les paupières et le pourtour des yeux avec l'embout du flacon. Il ne faut pas non plus que celui-ci entre en contact avec les mains.

Bien refermer le flacon immédiatement après usage.

Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15-25°C). Conserver hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

À la fin du traitement, rapportez le médicament à votre point de vente (médecin, pharmacien) pour une élimination appropriée.



Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Olopatadine Labatec?

Olopatadine Labatec, collyre en solution est un collyre stérile.

Principes actifs

1 mg/ml d'olopatadine (sous forme de 1.11 mg de chlorhydrate d'olopatadine).

Excipients

Chlorure de benzalkonium, chlorure de sodium, phosphate disodique, hydroxyde de sodium et/ou acide chlorhydrique (pour ajuster le pH) et eau pour préparations injectables.

Numéro d'autorisation

68605 (Swissmedic).

Où obtenez-vous Olopatadine Labatec? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie, sur ordonnance médicale.

Des emballages de 5 ml sont disponibles.

Titulaire de l'autorisation

Labatec Pharma SA, 1217 Meyrin (GE)..

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en janvier 2023 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

