

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage avant de prendre ou d'utiliser ce médicament. Ce médicament vous a été remis personnellement sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Sanukehl Cand D6, gouttes à avaler et à frictionner

Médicament homéopathique

Quand Sanukehl Cand D6 est-il utilisé?

Selon la conception homéopathique, Sanukehl Cand D6 peut être utilisé sur ordonnance médicale en cas de gingivostomatite, d'œsophagogastrite et de vulvovaginite liées à une mycose.

L'utilisation de ce médicament dans le champ d'applications indiqué est basée sur les principes de l'homéopathie.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si Sanukehl Cand D6 peut être pris / utilisé simultanément.

Quand Sanukehl Cand D6 ne doit-il pas être pris/utilisé ou seulement avec précaution?

Sanukehl Cand D6 ne doit pas être utilisé:

- lors d'hypersensibilité connue aux levures (*Candida albicans*)
- lors de maladies auto-immunes
- chez les enfants de moins de 12 ans
- chez les femmes enceintes et allaitantes

Les médicaments ou thérapies à effet immunosuppresseur peuvent altérer l'efficacité de Sanukehl Cand D6. Un intervalle de 4 semaines doit être respecté avant et après le traitement avec des vaccins vivants administrés par voie orale.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage externe (même en automédication !).

Sanukehl Cand D6 peut-il être pris/utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sanukehl Cand D6 ne doit pas être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement.

Comment utiliser Sanukehl Cand D6?

Ne changez pas le dosage prescrit de votre propre chef. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.



Posologie / mode d'emploi chez les adultes et les adolescents de plus de 12 ans: à prendre: Dans les cas aigus, 5–10 gouttes toutes les 12–24 heures avant un repas. Dans les cas chroniques, 10 gouttes toutes les 48 heures avant un repas.

À frictionner: 5–10 gouttes sur la partie atteinte ou dans le pli du coude tous les 1–2 jours.

Sanukehl Cand D6 doit être arrêté après un traitement de maximum 4 semaines.

Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 12 ans.

Quels effets secondaires Sanukehl Cand D6 peut-il provoquer?

La prise / l'utilisation de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec Sanukehl Cand D6 et informez-en votre médecin ou votre pharmacien. En raison de la teneur en composants organiques spécifiques de Sanukehl Cand D6, des réactions d'hypersensibilité, principalement sous forme de réactions cutanées, peuvent apparaître et une allergie au composant *Candida albicans* peut être déclenchée. Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. Ceci en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention?

Stabilité:

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention « à utiliser jusqu'au » sur le récipient.

Délai d'utilisation après ouverture :

Le médicament doit être utilisé dans les 60 jours suivant son ouverture.

Remarques concernant le stockage :

Conserver à température ambiante (15-25 °C).

Conserver hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires :

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Que contient Sanukehl Cand D6?

1 ml de liquide (22 gouttes) contient:

Principes actifs

Candida albicans extractum cellulae (lyophil., steril.) D6 (HAB 5a) 1 ml

Excipients :

eau purifiée

Numéro d'autorisation

53246 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Sanukehl Cand D6? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?



En pharmacie, sur ordonnance médicale.

Emballage de 10 ml.

Titulaire de l'autorisation

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, CH-3038 Kirchlindach

Fabricant

SANUM-Kehlbeck GmbH & Co. KG, D-27316 Hoya

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en mai 2025 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

