

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di fare uso del medicamento.

Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Myocholine-Glenwood

Che cos'è Myocholine-Glenwood e quando si usa?

Myocholine-Glenwood è prescritto dal medico. È un medicamento che attiva la muscolatura liscia, specialmente a livello della vescica urinaria e del tratto gastro-intestinale, e può così eliminare una ritenzione urinaria o un bruciore di stomaco cronico (reflusso esofageo).

Quando non si può usare Myocholine-Glenwood?

Myocholine-Glenwood non deve essere usato in caso di asma manifesta o rischio di attacchi d'asma, ostruzione delle vie urinarie o del tratto gastrointestinale, malattie cardiache e cardiovascolari nonché ipotensione grave (diminuzione della pressione sanguigna) o bradicardia (polso inferiore a 60 battiti al minuto), epilessia o malattia di Parkinson, ipertiroidismo (condizione che si verifica quando la tiroide lavora eccessivamente).

Quando è richiesta prudenza nell'uso di Myocholine-Glenwood?

Questo medicamento può ridurre la capacità di reazione, la capacità di condurre un veicolo e la capacità di utilizzare attrezzi o macchine!

Se a causa di un'ipertonia lo sfintere della vescica non si apre, può verificarsi un ritorno dell'urina nel bacinetto renale. La presenza di batteri nell'urina può favorire un'infezione renale di riflusso.

L'uso nei bambini è sconsigliato, in quanto non sono disponibili sufficienti informazioni relative all'effetto della cura sui bambini.

L'assunzione concomitante di un altro medicamento atto a stimolare la muscolatura può far aumentare l'effetto in modo indesiderato e influire negativamente sulla tollerabilità.

Informi il suo medico o il suo farmacista nel caso in cui soffra di altre malattie, soffra di allergie o assuma altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa) o li applichi esternamente!

Si può assumere Myocholine-Glenwood durante la gravidanza o l'allattamento?

Myocholine-Glenwood non deve essere assunto durante la gravidanza e l'allattamento.

Come usare Myocholine-Glenwood?

Myocholine-Glenwood va assunto di preferenza prima dei pasti per impedire l'insorgenza di nausea. La posologia abituale è di 20–50 mg fino a 4 volte al giorno (da 8 a 20 compresse da 10 mg o da 4 a 8 compresse da 25 mg). Le compresse possono essere divise in corrispondenza della linea di frattura ai fini del dosaggio di una dose parziale.

Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.



Quali effetti collaterali può avere Myocholine-Glenwood?

In seguito all'assunzione di Myocholine-Glenwood possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali:

Molto comune (riguarda più di 1 persona su 10)

Aumento della lacrimazione e della salivazione, sudorazione, arrossamento della pelle, maggiore necessità di urinare

Comune (riguarda da 1 a 10 persone su 100)

Rallentamento della frequenza cardiaca (polso inferiore a 60 battiti al minuto), calo della pressione sanguigna, bassa temperatura corporea (ipotermia), diarrea

Non comune (riguarda da 1 a 10 persone su 1000)

Nausea e vomito, disturbi gastrointestinali

Raro (riguarda da 1 a 10 persone su 10 000)

Specialmente all'inizio della terapia, i cambiamenti improvvisi di postura come il passaggio dalla posizione seduta o sdraiata a quella eretta possono provocare vertigini (ipotensione ortostatica).

Molto raro (riguarda meno di 1 persona su 10 000)

Mal di testa, dolore toracico, calore e sensazione di tensione, aumento della lacrimazione, offuscamento della vista, difficoltà respiratorie, eruttazioni, formazione di ulcere, eruzione cutanea (vescicole da sudore)

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico o farmacista, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con EXP sul contenitore.

Avvertenze per la conservazione

Conservare al riparo dall'umidità e a temperatura ambiente (15-25°C).

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Indicazioni per lo smaltimento

Non gettare i medicinali nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. Restituite i medicinali scaduti o non più necessari, in uso nelle economie domestiche, presso un punto di dispensazione (farmacie, drogherie, studio medico) o nei punti di raccolta. Queste misure aiutano a proteggere l'ambiente.

Ulteriori avvertenze

Il medico o il farmacista, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darne ulteriori informazioni.

Cosa contiene Myocholine-Glenwood?

Una compressa Myocholine-Glenwood contiene:



Principi attivi

10 mg risp. 25 mg di betanecolo cloruro.

Sostanze ausiliarie

Calcio solfato diidrato, amido di mais, talco

Numero dell'omologazione

40087 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Myocholine-Glenwood? Quali confezioni sono disponibili?

Myocholine-Glenwood è in vendita in farmacia dietro presentazione della prescrizione medica.

50 compresse da 10 mg (con linea di frattura, divisibili)

50 compresse da 25 mg (con linea di frattura, divisibili)

Titolare dell'omologazione

CPS Cito Pharma Services GmbH, 8610 Uster

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nell'ottobre 2024 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

