

Information destinée aux patients

Lisez attentivement la notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant le médicament. Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance par le pharmacien. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications du médecin ou du pharmacien. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Albicansan D4, capsules

Médicament homéopathique

Quand Albicansan D4, capsules est-il utilisé?

Selon la conception homéopathique, Albicansan D4, capsules peut être utilisé en cas d'eczémas et de mycoses.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si Albicansan D4, capsules peut être pris simultanément.

Quand Albicansan D4, capsules ne doit-il pas être utilisé ou seulement avec précaution?

Albicansan D4, capsules ne doit pas être utilisé en cas d'hypersensibilité connue au principe actif. Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien, si

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication).

Albicansan D4, capsules peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis du médecin ou du pharmacien.

Comment utiliser Albicansan D4, capsules ?

Sauf prescription contraire du médecin prendre 1-3 capsules une fois par jour, avant le petit déjeuner ou le soir avant le coucher. Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si l'amélioration escomptée de l'enfant en bas âge/de l'enfant ne se produit pas, faites-le examiner par un médecin. Adressez vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires Albicansan D4, capsules peut-il provoquer?

La prise de Albicansan D4, capsules peut provoquer les effets secondaires suivants: dans de rares cas, des réactions d'hypersensibilité (allergie au principe actif) sont possibles. Si vous remarquez des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre



pharmacien. La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec Albicansan D4, capsules et informez-en votre médecin ou votre pharmacien.

A quoi faut-il encore faire attention?

Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «à utiliser jusqu'au» sur le récipient. Garder les médicaments hors de portée des enfants. Conserver à température ambiante (15-25 °C). Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Que contient Albicansan D4, capsules?

1 capsule contient: 330 mg Candida albicans D4 trituration (HAB, 6)

Cette préparation contient en outre du lactose comme excipient. Capsule: hypromellose.

Numéro d'autorisation

51 859 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Albicansan D4, capsules? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie, sans ordonnance médicale.

Emballage de 20 capsules.

Titulaire de l'autorisation

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlintach

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en décembre 2006 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

